

Analüütiline geomeetria

VIII loeng. Üleminek ühelt reeperilt teisele. Baasiteisenduse maatriks. Koordinaatide teisendused.

Sügissemester 2016

Reeper $\mathfrak{R} = \{O; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ määrab ruumis E^3 koordinaadisüsteemi järgmiselt: olgu P ruumi mingi punkt, selle kohavektor on $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$, iga vektor on esitatav kujul $\vec{r} = x \vec{e}_1 + y \vec{e}_2 + z \vec{e}_3$, kus reaalarvud x, y, z on üheselt määratud. Kordajaid x, y, z nimetatakse nii punkti P , kui ka vektori \vec{r} koordinaatideks. Kirjutame $P(x, y, z)$ ja $\vec{r} = (x, y, z)$.

Reeper $\mathfrak{R} = \{O; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ määrab ruumis E^3 koordinaadisüsteemi järgmiselt: olgu P ruumi mingi punkt, selle kohavektor on $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$, iga vektor on esitatav kujul $\vec{r} = x \vec{e}_1 + y \vec{e}_2 + z \vec{e}_3$, kus reaalarvud x, y, z on üheselt määratud. Kordajaid x, y, z nimetatakse nii punkti P , kui ka vektori \vec{r} koordinaatideks. Kirjutame $P(x, y, z)$ ja $\vec{r} = (x, y, z)$.

Reeper \mathfrak{R} peab rahuldama tingimust: **baasivektorid $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ on mittekompanaanarvad** ja see on ainus piirang reeperi moodustamiseks. Seega võime moodustada teise reeperi $\mathfrak{R}' = \{O'; \vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3\}$. Teine reeper tekitab kolmemõõtmelises ruumis teist koordinaadisüsteemi. Olgu x', y', z' punkti P koordinaadid teises koordinaadisüsteemis, st $P(x', y', z')$ ja $\vec{r}' = (x', y', z')$.

Reeper $\mathfrak{R} = \{O; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ määrab ruumis E^3 koordinaadisüsteemi järgmiselt: olgu P ruumi mingi punkt, selle kohavektor on $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$, iga vektor on esitatav kujul $\vec{r} = x \vec{e}_1 + y \vec{e}_2 + z \vec{e}_3$, kus reaalarvud x, y, z on üheselt määratud. Kordajaid x, y, z nimetatakse nii punkti P , kui ka vektori \vec{r} koordinaatideks. Kirjutame $P(x, y, z)$ ja $\vec{r} = (x, y, z)$.

Reeper \mathfrak{R} peab rahuldama tingimust: **baasivektorid $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ on mittekompnaarsed** ja see on ainus piirang reeperi moodustamiseks. Seega võime moodustada teise reeperi $\mathfrak{R}' = \{O'; \vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3\}$. Teine reeper tekitab kolmemõõtmelises ruumis teist koordinaadisüsteemi. Olgu x', y', z' punkti P koordinaadid teises koordinaadisüsteemis, st $P(x', y', z')$ ja $\vec{r}' = (x', y', z')$.

Käesoleva loengu eesmärk on näidata, kuidas saab avaldada punkti P koordinaadid x, y, z koordinaatide x', y', z' kaudu. Selleks oletame, et on antud lähtereeper \mathfrak{R} . Teine reeper \mathfrak{R}' on täielikult määratud, kui lähtekoordinaadisüsteemis on antud alguspunkti O' ja baasivektorite $\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3$ koordinaadid.

Olgu $O'(a_1, a_2, a_3)$ ja

$$\vec{e}'_1 = a_{11} \vec{e}_1 + a_{21} \vec{e}_2 + a_{31} \vec{e}_3,$$

$$\vec{e}'_2 = a_{12} \vec{e}_1 + a_{22} \vec{e}_2 + a_{32} \vec{e}_3,$$

$$\vec{e}'_3 = a_{13} \vec{e}_1 + a_{23} \vec{e}_2 + a_{33} \vec{e}_3.$$

Olgu $O'(a_1, a_2, a_3)$ ja

$$\vec{e}'_1 = a_{11} \vec{e}_1 + a_{21} \vec{e}_2 + a_{31} \vec{e}_3,$$

$$\vec{e}'_2 = a_{12} \vec{e}_1 + a_{22} \vec{e}_2 + a_{32} \vec{e}_3,$$

$$\vec{e}'_3 = a_{13} \vec{e}_1 + a_{23} \vec{e}_2 + a_{33} \vec{e}_3.$$

Moodustame 3-järku ruutmaatriksi

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Olgu $O'(a_1, a_2, a_3)$ ja

$$\vec{e}'_1 = a_{11} \vec{e}_1 + a_{21} \vec{e}_2 + a_{31} \vec{e}_3,$$

$$\vec{e}'_2 = a_{12} \vec{e}_1 + a_{22} \vec{e}_2 + a_{32} \vec{e}_3,$$

$$\vec{e}'_3 = a_{13} \vec{e}_1 + a_{23} \vec{e}_2 + a_{33} \vec{e}_3.$$

Moodustame 3-järku ruutmaatriksi

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Maatriksit A nimetatakse **baasiteisenduse maatriksiks**.

Olgu $O'(a_1, a_2, a_3)$ ja

$$\vec{e}'_1 = a_{11} \vec{e}_1 + a_{21} \vec{e}_2 + a_{31} \vec{e}_3,$$

$$\vec{e}'_2 = a_{12} \vec{e}_1 + a_{22} \vec{e}_2 + a_{32} \vec{e}_3,$$

$$\vec{e}'_3 = a_{13} \vec{e}_1 + a_{23} \vec{e}_2 + a_{33} \vec{e}_3.$$

Moodustame 3-järku ruutmaatriksi

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Maatriksit A nimetatakse **baasiteisenduse maatriksiks**. Baasiteisenduse maatriks määrab üleminekut ühe reeperi baasilt teise reeperi baasile.

Nüüd reeper \mathfrak{R}' on täielikult määratud paariga (\vec{r}_0, A) , kus \vec{r}_0 on alguspunkti O' kohavektor, st $\vec{r}_0 = (a_1, a_2, a_3)$, ja A on baasiteisenduse maatriks.

Järgnevas üleminekut reeperilt \mathfrak{R} reeperile \mathfrak{R}' näitame järgmiselt

$$\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{r}_0, A} \mathfrak{R}'.$$

Nähtavasti baasiteisenduse maatriks ei saa olla suvaline, kuna baasivektorid peavad olema mittekomplanaarsed.

Järgnevas üleminekut reeperilt \mathfrak{R} reeperile \mathfrak{R}' näitame järgmiselt

$$\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{r}_{0,A}} \mathfrak{R}'.$$

Nähtavasti baasiteisenduse maatriks ei saa olla suvaline, kuna baasivektorid peavad olema mittekomplanaarsed.

Teoreem

Maatriks A on baasiteisenduse maatriks parajasti siis, kui $\det A \neq 0$. Kui $\det A > 0$, siis reeperi orientatsioon ei muutu (baasiteisenduse maatriks A säilitab reeperi orientatsiooni) ja kui $\det A < 0$, siis reeperi orientatsioon muutub.

Tõestus.

Järgnevas üleminekut reeperilt \mathfrak{R} reeperile \mathfrak{R}' näitame järgmiselt

$$\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{r}_{0,A}} \mathfrak{R}'.$$

Nähtavasti baasiteisenduse maatriks ei saa olla suvaline, kuna baasivektorid peavad olema mittekomplanaarsed.

Teoreem

Maatriks A on baasiteisenduse maatriks parajasti siis, kui $\det A \neq 0$. Kui $\det A > 0$, siis reeperi orientatsioon ei muutu (baasiteisenduse maatriks A säilitab reeperi orientatsiooni) ja kui $\det A < 0$, siis reeperi orientatsioon muutub.

Tõestus. Kehtib valem (V. loeng)

$$(\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3) = \det A (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3).$$

Tuletame meelde et maatriksarvutus 3-järku maatriksit A nimetatakse **regulaarseks maatriksiks**, kui $\det A \neq 0$. Regulaarsete kolmandat järku maatriksite hulka tähistatakse $GL_3(\mathbb{R})$.

Seega, kui A on baasiteisenduse maatriks, siis $A \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$.

Seega, kui A on baasiteisenduse maatriks, siis $A \in GL_3(\mathbb{R})$.

Olgu $\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{r}_0, A} \mathfrak{R}'$. Olgu P ruumi mingi punkt, x, y, z punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R} ja x', y', z' punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R}' . Leiame, kuidas x, y, z avalduvad x', y', z' kaudu.

Seega, kui A on baasiteisenduse maatriks, siis $A \in GL_3(\mathbb{R})$.

Olgu $\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{r}_0, A} \mathfrak{R}'$. Olgu P ruumi mingi punkt, x, y, z punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R} ja x', y', z' punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R}' . Leiame, kuidas x, y, z avalduvad x', y', z' kaudu.

Teoreem

Kui x, y, z on punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R} , x', y', z' on punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R}' ja $\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{r}_0, A} \mathfrak{R}'$, siis

$$\begin{aligned}x &= a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}z' + a_1, \\y &= a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}z' + a_2, \\z &= a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}z' + a_3.\end{aligned}\tag{1}$$

Seega, kui A on baasiteisenduse maatriks, siis $A \in GL_3(\mathbb{R})$.

Olgu $\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{r}_0, A} \mathfrak{R}'$. Olgu P ruumi mingi punkt, x, y, z punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R} ja x', y', z' punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R}' . Leiame, kuidas x, y, z avalduvad x', y', z' kaudu.

Teoreem

Kui x, y, z on punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R} , x', y', z' on punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R}' ja $\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{r}_0, A} \mathfrak{R}'$, siis

$$\begin{aligned}x &= a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}z' + a_1, \\y &= a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}z' + a_2, \\z &= a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}z' + a_3.\end{aligned}\tag{1}$$

Tasandi korral

$$\begin{aligned}x &= a_{11}x' + a_{12}y' + a_1, \\y &= a_{21}x' + a_{22}y' + a_2.\end{aligned}$$

Seega, kui A on baasiteisenduse maatriks, siis $A \in GL_3(\mathbb{R})$.

Olgu $\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{r}_0, A} \mathfrak{R}'$. Olgu P ruumi mingi punkt, x, y, z punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R} ja x', y', z' punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R}' . Leiame, kuidas x, y, z avalduvad x', y', z' kaudu.

Teoreem

Kui x, y, z on punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R} , x', y', z' on punkti koordinaadid reeperis \mathfrak{R}' ja $\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{r}_0, A} \mathfrak{R}'$, siis

$$\begin{aligned}x &= a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}z' + a_1, \\y &= a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}z' + a_2, \\z &= a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}z' + a_3.\end{aligned}\tag{1}$$

Tasandi korral

$$\begin{aligned}x &= a_{11}x' + a_{12}y' + a_1, \\y &= a_{21}x' + a_{22}y' + a_2.\end{aligned}$$

Valemit (1) nimetatakse **ruumi punkti koordinaatide teisenemise valemiks üleminekul ühelt reeperilt teisele**.

Oletame, et ruumis E on antud kolm reeperit $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}', \mathfrak{R}''$ ja

$$\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{0}, A} \mathfrak{R}',$$

Oletame, et ruumis E on antud kolm reeperit $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}', \mathfrak{R}''$ ja

$$\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{0}, A} \mathfrak{R}', \quad \mathfrak{R}' \xrightarrow{\vec{0}, B} \mathfrak{R}'',$$

Oletame, et ruumis E on antud kolm reeperit $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}', \mathfrak{R}''$ ja

$$\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{0}, A} \mathfrak{R}', \quad \mathfrak{R}' \xrightarrow{\vec{0}, B} \mathfrak{R}'', \quad \mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{0}, C} \mathfrak{R}''.$$

Oletame, et ruumis E on antud kolm reeperit $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}', \mathfrak{R}''$ ja

$$\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{0}, A} \mathfrak{R}', \quad \mathfrak{R}' \xrightarrow{\vec{0}, B} \mathfrak{R}'', \quad \mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{0}, C} \mathfrak{R}''.$$

Juhime tähelepanu sellele, et reeperite alguspunktid ühtivad $O \equiv O' \equiv O''$, st üleminekul ühelt reeperilt teisele muutuvad ainult baasivektorid. Leiame, kuidas baasiteisenduse maatriks C avaldub baasiteisenduste maatriksite A, B kaudu. Teeme seda tasandi korral. Eespool tõestatud teoreemist järeljub

$$x = a_{11}x' + a_{12}y',$$

$$y = a_{21}x' + a_{22}y',$$

Oletame, et ruumis E on antud kolm reeperit $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}', \mathfrak{R}''$ ja

$$\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{0}, A} \mathfrak{R}', \quad \mathfrak{R}' \xrightarrow{\vec{0}, B} \mathfrak{R}'', \quad \mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{0}, C} \mathfrak{R}''.$$

Juhime tähelepanu sellele, et reeperite alguspunktid ühtivad $O \equiv O' \equiv O''$, st üleminekul ühelt reeperilt teisele muutuvad ainult baasivektorid. Leiame, kuidas baasiteisenduse maatriks C avaldub baasiteisenduste maatriksite A, B kaudu. Teeme seda tasandi korral. Eespool tõestatud teoreemist järeldeb

$$x = a_{11}x' + a_{12}y',$$

$$y = a_{21}x' + a_{22}y',$$

$$x' = b_{11}x'' + b_{12}y'',$$

$$y' = b_{21}x'' + b_{22}y'',$$

Oletame, et ruumis E on antud kolm reeperit $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}', \mathfrak{R}''$ ja

$$\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{0}, A} \mathfrak{R}', \quad \mathfrak{R}' \xrightarrow{\vec{0}, B} \mathfrak{R}'', \quad \mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{0}, C} \mathfrak{R}''.$$

Juhime tähelepanu sellele, et reeperite alguspunktid ühtivad $O \equiv O' \equiv O''$, st üleminekul ühelt reeperilt teisele muutuvad ainult baasivektorid. Leiame, kuidas baasiteisenduse maatriks C avaldub baasiteisenduste maatriksite A, B kaudu. Teeme seda tasandi korral. Eespool tõestatud teoreemist järeldeb

$$x = a_{11}x' + a_{12}y',$$

$$y = a_{21}x' + a_{22}y',$$

$$x' = b_{11}x'' + b_{12}y'',$$

$$y' = b_{21}x'' + b_{22}y'',$$

$$x = c_{11}x'' + c_{12}y'',$$

$$y = c_{21}x'' + c_{22}y''.$$

Kehtib

$$c_{11} = a_{11} b_{11} + a_{12} b_{21}$$

Kehtib

$$c_{11} = a_{11} b_{11} + a_{12} b_{21} \implies c_{11} = (a_{11} \ a_{12}) \times \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix}.$$

Kehtib

$$c_{11} = a_{11} b_{11} + a_{12} b_{21} \implies c_{11} = (a_{11} \ a_{12}) \times \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix}.$$

Maatriksi C element c_{11} on moodustatud maatriksi A esimese rea elementide maatriksi B esimese veeru elementidega korrutamise abil.

Kehtib

$$c_{11} = a_{11} b_{11} + a_{12} b_{21} \implies c_{11} = (a_{11} \ a_{12}) \times \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix}.$$

Maatriksi C element c_{11} on moodustatud maatriksi A esimese rea elementide maatriksi B esimese veeru elementidega korrutamise abil.
Kehtib

$$c_{12} = a_{11} b_{12} + a_{12} b_{22}$$

Kehtib

$$c_{11} = a_{11} b_{11} + a_{12} b_{21} \implies c_{11} = (a_{11} \ a_{12}) \times \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix}.$$

Maatriksi C element c_{11} on moodustatud maatriksi A esimese rea elementide maatriksi B esimese veeru elementidega korrutamise abil.
Kehtib

$$c_{12} = a_{11} b_{12} + a_{12} b_{22} \implies c_{12} = (a_{11} \ a_{12}) \times \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \end{pmatrix}.$$

Kehtib

$$c_{11} = a_{11} b_{11} + a_{12} b_{21} \implies c_{11} = (a_{11} \ a_{12}) \times \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix}.$$

Maatriksi C element c_{11} on moodustatud maatriksi A esimese rea elementide maatriksi B esimese veeru elementidega korrutamise abil.
Kehtib

$$c_{12} = a_{11} b_{12} + a_{12} b_{22} \implies c_{12} = (a_{11} \ a_{12}) \times \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \end{pmatrix}.$$

Maatriksi C element c_{12} on moodustatud maatriksi A esimese rea elementide maatriksi B teise veeru elementidega korrutamise abil.
Üldiselt, kui maatriksi C element c_{ij} on moodustatud maatriksi A i -nda rea elementide maatriksi B j -nda veeru elementide korrutamise abil, siis maatriksit C nimetatakse maatriksite A, B korrutiseks ja kirjutatakse $C = A \cdot B$.

Teoreem

Kui

$$\mathfrak{K} \xrightarrow{\vec{0}, A} \mathfrak{K}', \quad \mathfrak{K}' \xrightarrow{\vec{0}, B} \mathfrak{K}'', \quad \mathfrak{K} \xrightarrow{\vec{0}, C} \mathfrak{K}'',$$

siis $C = A \cdot B$.

Teoreem

Kui

$$\mathfrak{K} \xrightarrow{\vec{0}, A} \mathfrak{K}', \quad \mathfrak{K}' \xrightarrow{\vec{0}, B} \mathfrak{K}'', \quad \mathfrak{K} \xrightarrow{\vec{0}, C} \mathfrak{K}'',$$

siis $C = A \cdot B$.

Mainime, et maatriksite korrutamine on mittekommutatiivne $A \cdot B \neq B \cdot A$ ja assotsiatiivne $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.

Teoreem

Kui

$$\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{0}, A} \mathfrak{R}', \quad \mathfrak{R}' \xrightarrow{\vec{0}, B} \mathfrak{R}'', \quad \mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{0}, C} \mathfrak{R}'',$$

siis $C = A \cdot B$.

Mainime, et maatriksite korrutamine on mittekommutatiivne $A \cdot B \neq B \cdot A$ ja assotsiatiivne $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.

Nüüd kitsendame reeperite klassi, st eeldame, et diagrammis $\mathfrak{R} \xrightarrow{\vec{r}_0, A} \mathfrak{R}'$ reeperid on **ristreeperid**. On ilmne, et baasiteisenduse maatriks ei saa enam olla ainult regulaarne maatriks, kuid ta peab rahuldama lisa tingimust. Leiame selle tingimuse. Esiteks esimese reeperi baas $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ on ristbaas, st

$$\langle \vec{e}_1, \vec{e}_1 \rangle = \langle \vec{e}_2, \vec{e}_2 \rangle = \langle \vec{e}_3, \vec{e}_3 \rangle = 1,$$

$$\langle \vec{e}_1, \vec{e}_2 \rangle = \langle \vec{e}_2, \vec{e}_3 \rangle = \langle \vec{e}_1, \vec{e}_3 \rangle = 0.$$

Teiseks arvestame, et teise reeperi baas $\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3$ on ka ristbaas

$$\langle \vec{e}'_1, \vec{e}'_1 \rangle = \langle \vec{e}'_2, \vec{e}'_2 \rangle = \langle \vec{e}'_3, \vec{e}'_3 \rangle = 1,$$

$$\langle \vec{e}'_1, \vec{e}'_2 \rangle = \langle \vec{e}'_2, \vec{e}'_3 \rangle = \langle \vec{e}'_1, \vec{e}'_3 \rangle = 0.$$

Teiseks arvestame, et teise reeperi baas $\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3$ on ka ristbaas

$$\begin{aligned}\langle \vec{e}'_1, \vec{e}'_1 \rangle &= \langle \vec{e}'_2, \vec{e}'_2 \rangle = \langle \vec{e}'_3, \vec{e}'_3 \rangle = 1, \\ \langle \vec{e}'_1, \vec{e}'_2 \rangle &= \langle \vec{e}'_2, \vec{e}'_3 \rangle = \langle \vec{e}'_1, \vec{e}'_3 \rangle = 0.\end{aligned}$$

Kehtib $\vec{e}'_1 = a_{11} \vec{e}_1 + a_{21} \vec{e}_2 + a_{31} \vec{e}_3$, järelikult

$$(a_{11})^2 + (a_{21})^2 + (a_{31})^2 = 1. \quad (2)$$

Teiseks arvestame, et teise reeperi baas $\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3$ on ka ristbaas

$$\begin{aligned}\langle \vec{e}'_1, \vec{e}'_1 \rangle &= \langle \vec{e}'_2, \vec{e}'_2 \rangle = \langle \vec{e}'_3, \vec{e}'_3 \rangle = 1, \\ \langle \vec{e}'_1, \vec{e}'_2 \rangle &= \langle \vec{e}'_2, \vec{e}'_3 \rangle = \langle \vec{e}'_1, \vec{e}'_3 \rangle = 0.\end{aligned}$$

Kehtib $\vec{e}'_1 = a_{11} \vec{e}_1 + a_{21} \vec{e}_2 + a_{31} \vec{e}_3$, järelikult

$$(a_{11})^2 + (a_{21})^2 + (a_{31})^2 = 1. \quad (2)$$

Analoogiliselt

$$(a_{12})^2 + (a_{22})^2 + (a_{32})^2 = 1, \quad (3)$$

$$(a_{13})^2 + (a_{23})^2 + (a_{33})^2 = 1, \quad (4)$$

Teiseks arvestame, et teise reeperi baas $\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3$ on ka ristbaas

$$\langle \vec{e}'_1, \vec{e}'_1 \rangle = \langle \vec{e}'_2, \vec{e}'_2 \rangle = \langle \vec{e}'_3, \vec{e}'_3 \rangle = 1,$$

$$\langle \vec{e}'_1, \vec{e}'_2 \rangle = \langle \vec{e}'_2, \vec{e}'_3 \rangle = \langle \vec{e}'_1, \vec{e}'_3 \rangle = 0.$$

Kehtib $\vec{e}'_1 = a_{11} \vec{e}_1 + a_{21} \vec{e}_2 + a_{31} \vec{e}_3$, järelikult

$$(a_{11})^2 + (a_{21})^2 + (a_{31})^2 = 1. \quad (2)$$

Analoogiliselt

$$(a_{12})^2 + (a_{22})^2 + (a_{32})^2 = 1, \quad (3)$$

$$(a_{13})^2 + (a_{23})^2 + (a_{33})^2 = 1, \quad (4)$$

ja

$$a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} + a_{31}a_{32} = 0, \quad (5)$$

$$a_{12}a_{13} + a_{22}a_{23} + a_{32}a_{33} = 0, \quad (6)$$

$$a_{11}a_{13} + a_{21}a_{32} + a_{31}a_{33} = 0. \quad (7)$$

Definitsioon

Maatriksit A nimetatakse **ortogonaalseks maatriksiks**, kui selle elemendid rahuldavad tingimusi (2) - (7). Teist järku ortogonaalsete maatriksite (tasandi reeperite baasiteisenduste maatriksid) hulka tähistatakse $O(2) \subset GL_2(\mathbb{R})$ ja kolmandat järku ortogonaalsete maatriksite (ruumi reeperite baasiteisenduste maatriksid) hulka tähistatakse $O(3) \subset GL_3(\mathbb{R})$.

Definitsioon

Maatriksit A nimetatakse **ortogonaalseks maatriksiks**, kui selle elemendid rahuldavad tingimusi (2) - (7). Teist järku ortogonaalsete maatriksite (tasandi reeperite baasiteisenduste maatriksid) hulka tähistatakse $O(2) \subset GL_2(\mathbb{R})$ ja kolmandat järku ortogonaalsete maatriksite (ruumi reeperite baasiteisenduste maatriksid) hulka tähistatakse $O(3) \subset GL_3(\mathbb{R})$.

Uurime teist järku ortogonaalse maatriksi struktuuri. Olgu

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

baasiteisenduse maatriks.

Definitsioon

Maatriksit A nimetatakse **ortogonaalseks maatriksiks**, kui selle elemendid rahuldavad tingimusi (2) - (7). Teist järku ortogonaalsete maatriksite (tasandi reeperite baasiteisenduste maatriksid) hulka tähistatakse $O(2) \subset GL_2(\mathbb{R})$ ja kolmandat järku ortogonaalsete maatriksite (ruumi reeperite baasiteisenduste maatriksid) hulka tähistatakse $O(3) \subset GL_3(\mathbb{R})$.

Uurime teist järku ortogonaalse maatriksi struktuuri. Olgu

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

baasiteisenduse maatriks. Seega

$$\begin{aligned}(a_{11})^2 + (a_{21})^2 &= 1, \\ (a_{12})^2 + (a_{22})^2 &= 1, \\ a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} &= 0.\end{aligned}$$

Kehtib kas $a_{11} \neq 0, a_{22} \neq 0$ või $a_{11} = 0, a_{22} = 0$.

Kehtib kas $a_{11} \neq 0, a_{22} \neq 0$ või $a_{11} = 0, a_{22} = 0$. Eeldame
 $a_{11} \neq 0, a_{22} \neq 0$.

Kehtib kas $a_{11} \neq 0, a_{22} \neq 0$ või $a_{11} = 0, a_{22} = 0$. Eeldame $a_{11} \neq 0, a_{22} \neq 0$. Viimase võrrandi kirjutame kujul

$$\frac{a_{21}}{a_{11}} = -\frac{a_{12}}{a_{22}}.$$

Kehtib kas $a_{11} \neq 0, a_{22} \neq 0$ või $a_{11} = 0, a_{22} = 0$. Eeldame $a_{11} \neq 0, a_{22} \neq 0$. Viimase võrrandi kirjutame kujul

$$\frac{a_{21}}{a_{11}} = -\frac{a_{12}}{a_{22}}.$$

Tähistame

$$\frac{a_{21}}{a_{11}} = -\frac{a_{12}}{a_{22}} = \lambda.$$

Kehtib kas $a_{11} \neq 0, a_{22} \neq 0$ või $a_{11} = 0, a_{22} = 0$. Eeldame $a_{11} \neq 0, a_{22} \neq 0$. Viimase võrrandi kirjutame kujul

$$\frac{a_{21}}{a_{11}} = -\frac{a_{12}}{a_{22}}.$$

Tähistame

$$\frac{a_{21}}{a_{11}} = -\frac{a_{12}}{a_{22}} = \lambda.$$

Leiame

$$A = \begin{pmatrix} \pm \frac{1}{\sqrt{1+\lambda^2}} & \mp \frac{\lambda}{\sqrt{1+\lambda^2}} \\ \pm \frac{\lambda}{\sqrt{1+\lambda^2}} & \pm \frac{1}{\sqrt{1+\lambda^2}} \end{pmatrix}.$$

Lisaks, kui $a_{11} = a_{22} = 0$, on meil veel neli maatriksit

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, B_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teoreem

Teist järku ortogonaalse maatriksi determinandi absoluutväärtus võrdub arvuga 1, st $|\det A| = 1$.

Definitsioon

Ortogonaalsed maatriksid A nimetatakse **spetsiaalseks ortogonaalseks maatriksiks**, kui $\det A = 1$. Spetsiaalsete ortogonaalsete maatriksite hulka tähistatakse $SO(2)$

Uurime teist järku spetsiaalse ortogonaalse maatriksi kuju. Eelmise teoreemi tõestusest järeldub, et teist järku spetsiaalse ortogonaalse maatriksi jaoks on kaks võimalust

$$\text{i) } A_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1+\lambda^2}} & -\frac{\lambda}{\sqrt{1+\lambda^2}} \\ \frac{\lambda}{\sqrt{1+\lambda^2}} & \frac{1}{\sqrt{1+\lambda^2}} \end{pmatrix}, \quad \text{ii) } A_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{1+\lambda^2}} & \frac{\lambda}{\sqrt{1+\lambda^2}} \\ -\frac{\lambda}{\sqrt{1+\lambda^2}} & -\frac{1}{\sqrt{1+\lambda^2}} \end{pmatrix}.$$

Võtame kasutusele uue parameetri τ , kus $\lambda = \tan \tau$ ja $-\frac{\pi}{2} < \tau < \frac{\pi}{2}$. Kasutades parameetrit τ ja trigonomeetrilist valemit

$$1 + \tan^2 \tau = \frac{1}{\cos^2 \tau},$$

leiame maatriksite A_1, A_2 kuju

$$A_1 = \begin{pmatrix} \cos \tau & -\sin \tau \\ \sin \tau & \cos \tau \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} -\cos \tau & \sin \tau \\ -\sin \tau & -\cos \tau \end{pmatrix}.$$

Geomeetriliselt baasiteisenduse maatriks A_1 määrab tasandi reeperi $\{O; \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ pööret ümber reeperi alguspunkti (kui $\vec{r}_0 = \vec{0}$) nurga τ võrra kellaosuti liikumise suuna vastupidises suunas, kui $\tau > 0$ ja kellaosuti liikumise suunas, kui $\tau < 0$ (vt joonis). Parameetri τ määramispiirkond on vahemik $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, kuid nüüd võime laiendada parameetri τ määramispiirkonda $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ haarates maatrikseid

$$B_2 \left(\tau = \frac{\pi}{2} \right), \quad B_3 \left(\tau = -\frac{\pi}{2} \right).$$

On lihtne veenduda, et kõik teist järku spetsiaalsed ortogonaalsed maatriksid (A_1, A_2, B_2, B_3) moodustavad maatriksite üheparameetrilise parve

$$A(\tau) = \begin{pmatrix} \cos \tau & -\sin \tau \\ \sin \tau & \cos \tau \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \tau \leq 2\pi.$$

Teoreem

Teist järku spetsiaalsed ortogonaalsed matriksid $SO(2)$ moodustavad ühe parameetrilise parve

$$A(\tau) = \begin{pmatrix} \cos \tau & -\sin \tau \\ \sin \tau & \cos \tau \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \tau \leq 2\pi.$$

Teist järku spetsiaalne ortogonaalne matriks $A(\tau)$ määrab tasandi reeperi pööret nurga τ võrra.

Täiendav materjal. Defineerime kujutust ψ , mis seab igale kompleksarvule $z = a + ib$ vastavusse teist järku matriksi

$$\psi(z) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Kujutusel ψ on järgmised omadused:

$$\psi(z_1 \cdot z_2) = \psi(z_1) \cdot \psi(z_2), \quad |z| = \det \psi(z), \quad \psi(\bar{z}) = (\psi(z))^T.$$

Leidke, millised kompleksarvud kujutuse ψ korral vastavad spetsiaalsetele ortogonaalsetele matriksitele. Kasutades seda, tõestage

$$A(\tau_1 + \tau_2) = A(\tau_1) \cdot A(\tau_2).$$

Järelikult, koordinaadisüsteemi pöördel ümber alguspunkti nurga τ võrra punkti koordinaadid teisenevad järgmiselt

$$\begin{aligned}x &= \cos \tau x' - \sin \tau y', \\y &= \sin \tau x' + \cos \tau y'.$$

Ortogonaalsed matriksid determinandiga -1 on seotud tasandi peegeldustega. Kui tasandil on antud sirge l , siis tasandi peegelduseks nimetatakse kujutust $R : E^2 \rightarrow E^2$, mis seab tasandi igale punktile vastavusse sümmeetrilise punkti antud sirge suhtes (vt [joonis](#)). On ilmne, et sirge l punktid jäävad paigale (peegelduse püsipunktid) ja peegeldus on tasandi vektorite lineaarteisendus.

Peegeldusel on idempotentsuse omadus, st kui peegeldust rakendada kaks korda järjest, siis tulemuseks on tasandi samasusteisendus $\text{id}_{E^2}(P) = P$, st $R^2 = \text{id}_{E^2}$. Märgime, et maatriks B_1 on idempotentne maatriks, st $B_1^2 = I$, kus I on ühikmaatriks. Maatriks B_1 teisendab reeperit \vec{e}_1, \vec{e}_2 reeperiks $\vec{e}'_1 = \vec{e}_2, \vec{e}'_2 = \vec{e}_1$ ja see on lähtereeperi peegeldus esimese veerandi nurgapoolitaja suhtes. On võimalik tõestada, et kahe ristreeperi korral (alguspunktid ühtivad, orientatsioonid võivad olla erinevad) ühte ristreeperit saab teisendada teiseks pöörde ja peegelduse kompositsiooni abil.

Eksami küsimused

- 1 Baasiteisenduse maatriks. Teoreem baasiteisenduse maatriksist. Koordinaatide teisenemise valemid.
- 2 Üleminek ühelt ristreeperilt teisele ristreeperile. Ortogonaalsed maatriksid. Teoreem ortogonaalse maatriksi determinandist.
- 3 Spetsiaalsed ortogonaalsed maatriksid. Teoreem teist järku spetsiaalse ortogonaalse maatriksi struktuurist.