

2018

Kõrgem matemaatika II

MTMM.00.341

LOENGIKONSPEKT

vastutav õppejõud

ELLA PUMAN

ella.puman@ut.ee

EESSÕNA

Käesolev kursus “Kõrgem matemaatika II” algab tutvumisest algebra tähtsamate mõistetega, milleks on vektorruumi mõiste, vektorite lineaarse sõltuvuse ja sõltumatus mõiste, vektorruumi baasi ja vektori koordinaatide mõisted.

Matemaatilisest analüüsist tutvume arvridade ja astmeridade mõistetega, nende koondumiskriteeriumidega. Seejärel tegeleme mitme muutuja funktsioonide piirväärtuse ja pidevusega, osatuletiste mõistetega ning rakendustega, täisdiferentsiaali mõistega, ekstreemumite leidmisega. Lõpuks tutvume kahekordsete ja kolmekordsete integraalide mõistetega ning nende rakendustega.

Viimases osas õpime lahendama erinevaid diferentsiaalvõrrandeid. Alustame eralduvate muutujatega ja lineaarsete diferentsiaalvõrrandite mõistete ja lahendusmeetodite meelde tuletamisest, edasi tutvume selliste esimest järku diferentsiaalvõrrandite liikidega nagu homogeenne, eksaktne ja Bernoulli diferentsiaalvõrrand ja nende võrrandite lahendusmeetoditega. Jätkame teist järku diferentsiaalvõrranditega, kõrgemat järku diferentsiaalvõrranditega, diferentsiaalvõrrandite süsteemidega ning lõpuks uurime kahe muutuja funktsiooni jaoks osatuletistega diferentsiaalvõrrandite lahendamist.

Käesoleva loengukonsepti lõpus on loetelu kirjandusest, kust õppematerjal pärineb ning kust on võimalik huvi korral oma teadmisi täiendada.

Kursuse “Kõrgem matemaatika II” läbinud üliõpilane on ettevalmistatud jätkukursusteks matemaatika, matemaatilise statistika, füüsika, keemia, materjaliteaduse ja informaatika alal, kus võidakse ka antud materjali osaliselt korrata. Kindlasti on kursuse eesmärgiks ka üliõpilaste matemaatilise mõtlemisoscuse arendamine, mis tuleb kasuks igal erialal.

Selle kursuse läbinud üliõpilane on omandanud järgmised oskused.

1. Oskab defineerida vektorruumi ja teab vektorite lineaarse sõltuvuse ja sõltumatus mõisteid.
2. Oskab defineerida ja leida osatuletisi ja täisdiferentsiaali mitme muutuja funktsiooni.

sioonile.

3. Oskab leida funktsiooni ekstreemumeid, tunneb Lagrange'i meetodit.
4. Oskab defineerida ja leida kahe- ja kolmekordseid integraale.
5. Teab hariliku diferentsiaalvõrrandi mõistet, oskab defineerida ja lahendada eralduvate muutujatega, eksaktset, homogeenset, Bernoulli diferentsiaalvõrrandit, lineaarset esimest ja teist järku diferentsiaalvõrrandit.
6. Tunneb numbrilisi meetodeid esimest järku diferentsiaalvõrrandite lahendamiseks.
7. Tunneb osatuletistega diferentsiaalvõrrandeid, oskab lahendada neist lihtsaimaid.

I VEKTORRUUMID. VEKTORITE LINEARNE SÕLTUVUS JA SÕLTUMATUS

SISSEJUHATUS

Selles peatükis tutvume algebra ühe olulise mõistega, milleks on vektorruum. Tegemist on teatava ehitusega mittetühja hulgaga. Vektorruumi mõiste on tegelikult üldisem, kus reaalarvude hulga osas on suvaline korpus. Meie kursuses on korpuse osas konkreetne korpus, milleks on reaalarvude korpus \mathbb{R} . Kuna meie kursuses korpuse mõistet ei vaadelda, siis reaalarvude korpust vaatleme kui reaalarvude hulka. Korpuse mõistet tutvustatakse loengukursuses „Algebra I“.

1.1. VEKTORRUUM ÜLE REAALARVUDE HULGA

Vaatleme mittetühja hulka V , mille elemente nimetame vektoriteks. Vektorid tähistame edaspidi rasvases kirjas, et eristada vektoreid skalaaridest.

Definitsioon 1.1

Mittetühja hulka V nimetatakse **vektorruumiks üle reaalarvude hulga \mathbb{R}** , kui sellel hulgal on defineeritud lineaarsed tehted: hulga V elementide liitmine ja hulga V elementide korrutamine skalaaridega nii, et on täidetud järgmised tingimused:

Hulk V on kinnine elementide **liitmise** suhtes: iga $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ korral kehtib

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} \in V.$$

1. Liitmine on assotsiatiivne: iga $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in V$ korral kehtib

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}). \quad (\text{VR1})$$

2. Leidub **nullelement** $\mathbf{0} \in V$, nii et iga $\mathbf{a} \in V$ korral kehtib

$$\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{a} = \mathbf{a}. \quad (\text{VR2})$$

3. iga $\mathbf{a} \in V$ korral leidub **vastandelement** $-\mathbf{a} \in V$, nii et:

$$\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = -\mathbf{a} + \mathbf{a} = \mathbf{0}. \quad (\text{VR3})$$

4. Liitmine on kommutatiivne: $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ korral kehtib

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}. \quad (\text{VR4})$$

Hulk V on **kinnine skalaariga korrutamise** suhtes: iga $k \in \mathbb{R}$ ja iga $\mathbf{a} \in V$ korral

$$k\mathbf{a} \in V.$$

Kehtivad distributiivsused:

5. iga $k \in \mathbb{R}$ ja iga $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ korral

$$k(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = k\mathbf{a} + k\mathbf{b}. \quad (\text{VR5})$$

6. iga $k, l \in \mathbb{R}$ ja iga $\mathbf{a} \in V$ korral

$$(k + l)\mathbf{a} = k\mathbf{a} + l\mathbf{a}. \quad (\text{VR6})$$

7. Skalaariga korrutamine on assotsiatiivne: iga $k, l \in \mathbb{R}$ ja iga $\mathbf{a} \in V$ korral

$$k(l\mathbf{a}) = (kl)\mathbf{a}. \quad (\text{VR7})$$

8. Unitaarsuse tingimus: iga $\mathbf{a} \in V$

$$1\mathbf{a} = \mathbf{a}. \quad (\text{VR8})$$

Edaspidi nimetame vektorruumi üle reaalarvude hulga \mathbb{R} lühidalt vektorruumiks. Vektorruumi elemente nimetame vektoriteks, nullelementi nimetame nullvektoriks ja vastandelementi nimetame vastandvektoriks.

Vektorruumi definitsioonist saame teha järgmised järeldused.

Järeldus 1.1. *Vektorruumis on ainult üks nullvektor.*

Järeldus 1.2. *Vektorruumis on igal vektoril ainult üks vastandvektor.*

Vektorite $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ **vaheks** $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ nimetatakse vektorit

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{a} + (-\mathbf{b}).$$

Vektorite lahutamisel kehtivad liitmise analoogilised arvuga korrutamise distributiivsuse omadused.

Järeldus 1.3. *Iga $k \in \mathbb{R}$ ja iga $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ korral kehtib*

$$k(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = k\mathbf{a} - k\mathbf{b}.$$

Järeldus 1.4. *Iga $k, l \in \mathbb{R}$ ja iga $\mathbf{a} \in V$ korral kehtib*

$$(k - l)\mathbf{a} = k\mathbf{a} - l\mathbf{a}.$$

Järeldus 1.5. *Iga $\mathbf{a} \in V$ korral kehtib:*

$$0\mathbf{a} = \mathbf{0}.$$

Järeldus 1.6. *Iga $k \in \mathbb{R}$ korral kehtib:*

$$k\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Järeldus 1.7. *Iga $\mathbf{a} \in V$ korral kehtib:*

$$(-1)\mathbf{a} = -\mathbf{a}.$$

Olulisemad vektorruumide tüübid: geomeetrilised ja aritmeetilised. **Geomeetrilisteks vektorruumideks** on tasandi vabavektorite hulk \mathbb{E}_2 ja kolme-mõõtmelise ruumi vabavektorite hulk \mathbb{E}_3 . **Aritmeetilised vektorruumid** on hulgad \mathbb{R}^n , kus $n \in \mathbb{N}$ millel tehted on defineeritud komponenthaaval:

$$\begin{aligned}(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) &:= (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n), \\ k(a_1, \dots, a_n) &:= (ka_1, \dots, ka_n),\end{aligned}$$

kui $k, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$.

Näide 1.1. Kõigi reaalarvude hulk \mathbb{R} on arvude liitmise ja korrutamise suhtes vektorruum.

Näide 1.2. Kompleksarvude hulk \mathbb{C} on vektorruum, kui liitmisena vaadelda kompleksarvude liitmist ning reaalarvu c ja kompleksarvu $a + bi$ korrutis defineeritakse kui $c(a + bi) := ca + cbi$.

Näide 1.3. Kõik $(m \times n)$ maatriksid $\text{Mat}_{m,n}$ on maatriksite liitmise ja reaalarvuga korrutamise suhtes vektorruumid ($m, n \in \mathbb{N}$). Vektorruum \mathbb{R}^n on sisuliselt sama, mis $\text{Mat}_{1,n}$.

1.2. VEKTORRUUMI ALAMRUUM. LINEAARKATE

Olgu U vektorruumi V mittetühi alamhulk.

Definitsioon 1.2

Vektorruumi alamruumiks nimetatakse vektorruumi V mittetüha alamhulka U , kui U on vektorruumi V tehete (liitmise ja arvuga korrutamise) suhtes vektorruum üle reaalarvude hulga \mathbb{R} .

Liitmine ja arvuga korrutamine vektorruumis V on teheteks tema mittetüha alamhulgal U , kui

- 1) iga $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in U$ korral kehtib

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} \in U. \quad (1.1)$$

- 2) iga $k \in \mathbb{R}$ ja iga $\mathbf{a} \in U$ korral kehtib

$$k\mathbf{a} \in U. \quad (1.2)$$

Kuna alamruum $U \subset V$, siis saame mittetüha alamhulga U vektoreid liita ja arvuga korrutada.

Teoreem 1.8. *Vektorruumi V mittetühi alamhulk U on tema alamruum siis ja ainult siis, kui vektorruumi V tehted on alamhulga U teheteks.*

Tingimused (1.1) ja (1.2) on samaväärsed järgmise tingimusega:

- 3) Iga $k, l \in \mathbb{R}$ ja iga $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in U$ korral kehtib

$$k\mathbf{a} + l\mathbf{b} \in U. \quad (1.3)$$

Näide 1.4. Vektorruum on iseenda alamruum, sest $V \subset V$ ja $V \neq \emptyset$ ning alamhulk V on vektorruumi V tehete suhtes vektorruum.

Näide 1.5. Vektorruumi nullvektorist koosnev alamhulk $\{\mathbf{0}\}$ on tema alamruum, sest mistahes kahe arvu $k, l \in \mathbb{R}$ ja mistahes kahe vektori $\mathbf{a} = \mathbf{0}, \mathbf{b} = \mathbf{0}$ korral vaadeldavast alamhulgast kehtib tingimus (1.3), sest

$$k\mathbf{0} + l\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Neid kahte alamruumi nimetatakse **triviaalseteks alamruumideks**. Vektorruumi $\mathbf{0} = \{\mathbf{0}\}$ nimetatakse **triviaalseks vektorruumiks**.

Näide 1.6. Kui vektor $\mathbf{a} \in V$, siis hulk $\{k\mathbf{a}, k \in \mathbb{R}\}$ on vektorruumi V alamruum.

Kuna nullvektor sisaldub igas vektorruumi V alamruumis, siis ei ole vektorruumi kõigi alamruumide ühisosa tühi.

Näide 1.7. Hulk $U = \{(k, 0, l), k, l \in \mathbb{R}\}$ on alamruum vektorruumis \mathbb{R}^3 .

Näide 1.8. Fikseeritud sirgetega paralleelsete vabavektorite hulk on alamruum tasandi vabavektorite vektorruumis \mathbb{E}_2 .

Lause 1.9. Vektorruumi iga alamruum sisaldab nullvektorit.

Lause 1.10. Vektorruumi V iga alamruum on ise ka vektorruum tehete suhtes, mis on defineeritud samamoodi nagu vektorruumi V tehted.

Teoreem 1.11. Vektorruumi V mistahes kahe alamruumi U_1 ja U_2 ühisosa $U_1 \cap U_2$ on sammuti vektorruumi alamruum.

Olgu a_1, a_2, \dots, a_m vektorruumi V elemendid ja $m \in \mathbb{N}$. Mistahes avaldist

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m,$$

kus $k_1, \dots, k_m \in \mathbb{R}$, aga selle avaldise poolr määratud V elementi, nimetatakse vektorite a_1, \dots, a_m **lineaarseks kombinatsiooniks**. Skaalare k_1, \dots, k_m nimetatakse selle lineaarkombinatsiooni **kordajateks**.

Definitsioon 1.3

Vektorruumi V elementide a_1, a_2, \dots, a_m **lineaarkatteks** ehk **lineaarseks katteks** nimetatakse hulka

$$L(a_1, a_2, \dots, a_m) = \{k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m, k_1, k_2, \dots, k_m \in \mathbb{R}\}$$

Teoreem 1.12. Linearkatte (a_1, a_2, \dots, a_m) kus $a_1, a_2, \dots, a_m \in V$, vektorruumi V alamruum.

Näide 1.9. Vektorruumi \mathbb{R}^3 vektorite $u = (1, 0, 0)$ ja $v = (0, 0, 1)$ lineaarne kate on alamruum

$$L(u, v) = \{(k, 0, l), k, l \in \mathbb{R}\}.$$

1.3. VEKTORSÜSTEEMI LINEAARNE SÕLTUVUS JA SÕLTUMATUS

Võtame vektorruumist teatav arv vektoreid, näiteks $n \in \mathbb{N}$ vektorit. Ühte ja sama vektorit võib võtta mitu korda, tähtis on vektorite järjestus.

Vektorsüsteemiks nimetatakse vektorite $a_1, \dots, a_n \in V$ komplekti a_1, \dots, a_n , kus on fikseeritud elementide järjekord.

Kõige lühem vektorsüsteem koosneb ühest vektorist.

Definitsioon 1.4

Vektorsüsteemi a_1, \dots, a_n nimetatakse **lineaarselt sõltumatuks**, kui mistahes $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{R}$ korral võrdust

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n = 0 \quad (1.4)$$

järeldub, et

$$k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0. \quad (1.5)$$

Vektorsüsteemi nimetatakse **lineaarselt sõltuvaks**, kui ta ei ole lineaarselt sõltumatu.

Lineaarkombinatsiooni nimetatakse **triviaalseks**, kui kõik tema kordajad on nullid. Kui vähemalt üks kordaja on nullist erinev, siis öeldakse, et see lineaarkombinatsioon on **mittetriviaalne**.

Teoreem 1.13. Ühest elemendist koosnev vektorsüsteem \mathbf{a} on lineaarselt sõltuv siis ja ainult siis, kui vektor $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ (vektor \mathbf{a} on nullvektor).

Järeldus 1.14. Ühest elemendist koosnev vektorsüsteem \mathbf{a} on lineaarselt sõltumatu siis ja ainult siis, kui vektor $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ (vektor \mathbf{a} ei ole nullvektor). Kui süsteem koosneb ühest vektorist, mis ei ole nullvektor, siis see süsteem on lineaarselt sõltumatu, sest võrdus $k\mathbf{a} = \mathbf{0}$ kehtib vaid juhul, kui $k = 0$.

Kui üks vektoritest, näiteks a_1 on nullvektor, siis süsteem a_1, \dots, a_n on lineaarselt sõltuv, sest (1.4) kehtib juhul, kui võtta näiteks

$$k_1 = 1, k_2 = \dots = k_n = 0.$$

Kui osa vektoritest a_1, \dots, a_m , $m < n$ on lineaarselt sõltuvad, siis on ka kogu süsteem lineaarselt sõltuv, sest kehtib võrdus

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0.$$

Võrduse (1.4) saame, kui võtame

$$k_{m+1} = \dots = k_n = 0$$

Teoreem 1.15

Vektorsüsteem, milles on vähemalt kaks vektorit, on lineaarselt sõltuv siis ja ainult siis, kui selle vektorsüsteemi vähemalt üks vektor avaldub lineaarse kombinatsioonina ülejäänutest.

Tõestus.

Tarvilikkus.

Olgu vektorsüsteem a_1, \dots, a_n lineaarselt sõltuv siis on täidetud tingimus (1.4) kusjuures vähemalt üks kordaja k_m , $m = 1, \dots, n$ on erinev nullist. Oletame, et $k_n \neq 0$. Siis võrdusest (1.4) saab avaldada

$$a_n = -\frac{k_1}{k_n} a_1 - \frac{k_2}{k_n} a_2 - \dots - \frac{k_{n-1}}{k_n} a_{n-1}.$$

See tähendab, et a_n on lineaarne kombinatsioonin ülejäänust.

Piisavus.

Olgu näiteks üks vektor a_n avaldub lineaarse kombinatsioonina ülejäänutest

$$a_n = k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_{n-1} a_{n-1}.$$

Kirjutame võrduse teisiti

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_{n-1} a_{n-1} + (-1) a_n = 0.$$

Siis on täidetud võrdus (1.4) kusjuures $k_n \neq 0$, mis tähendab, et vektorid on lineaarselt sõltuvad.

Järeldus 1.4

Vektorsüsteem, milles on vähemalt kaks vektorit, on lineaarselt sõltumatu siis ja ainult siis, kui sellest vektorsüsteemist ei saa avaldada ühtegi vektorit ülejäänud vektorite lineaarse kombinatsiooni kaudu.

Definitsioon 1.5. Vektorsüsteemi a_1, \dots, a_n alamsüsteemiks nimetatakse vektorsüsteemi a_{i_1}, \dots, a_{i_k} , kui arvud $k, i_1, \dots, i_k \in \mathbb{N}$ selliselt, et $i_1 < \dots < i_k \leq n$.

Teoreem 1.17. Vektorsüsteem, millel on lineaarselt sõltuv alamsüsteem, on lineaarselt sõltuv.

Järeldused:

1. Lineaarselt sõltumatu vektorsüsteemi kõik alamsüsteemid on lineaarselt sõltumatud.
2. Vektorsüsteem, mis sisaldab nullelementi, on lineaarselt sõltuv.
3. Lineaarselt sõltumatu vektorsüsteem ei sisalda nullelementi.

Näide 1.1. Olgu V vektorruum. Kas kehtib järgmine väide: $a, b, c \in V$ on lineaarselt sõltumatud vektorid, siis ka $a + 2b$; $b + 2c$ ja $c + 2a$ on lineaarselt sõltumatud?

Oletame, et

$$k(a + 2b) + l(b + 2c) + m(c + 2a) = 0,$$

kus k, l, m on mingisugused realarvud. Kasutades vektorruumi aksioome, saame, et ka

$$(k + 2m)a + (2k + l)b + (2l + m)c = 0.$$

Kuna Vektorid a, b, c on lineaarselt sõltumatud, siis sellest võrdusest järeldub, et lineaarkombinatsiooni kõik kordajad on võrdsed nulliga:

$$k + 2m = 2k + l = 2l + m = 0.$$

Järelikult

$$4m - l = 0 = 2l + m,$$

kust

$$9m = 0$$

ja seega

$$m = l = k = 0.$$

Oleme näidanud, et lineaarkombinatsioon

$$k(a + 2b) + l(b + 2c) + m(c + 2a)$$

on triviaalne, mis tähendab, et vektord $a + 2b$; $b + 2c$ ja $c + 2a$ on lineaarselt sõltumatud.

Näide 1.2. Näidata vektorite süsteemi $2x + 1$; $x - 2$ lineaarselt sõltumatust.

Oletame, et

$$k(2x + 1) + l(x - 2) = 0.$$

Funktsioonid on võrdsed, kui nende väärtused on kõigi argumenti väärtuste korral võrdsed. Seega iga $x_0 \in \mathbb{R}$ korral

$$k(2x_0 + 1) + l(x_0 - 2) = 0$$

ehk

$$(2k + l)x_0 + k - 2l = 0.$$

Võttes $x_0 = 0$, saame $k = 2l$. Võttes $x_0 = 2$, saame $5k = 0$. Seega $k = l = 0$ ja süsteem on lineaarselt sõltumatu.

Definitsioon 1.6

Vektorruumi V vektorite süsteem M nimetatakse **moodustajate süsteemiks** ehk tekijate süsteemiks, kui vektorruumi V iga vektor avaldub süsteemi M kuuluvate vektorite lineaarkombinatsioonina.

Enamasti on vektorruumil palju moodustajate süsteeme, mõned neist suuremad, mõned väiksemad. Eriti kasulikud on moodustajate süsteemid, mille kaudu iga vektori saab avaldada täpselt ühel viisil.

Vastavalt definitsioonidele võime öelda, et süsteem a_1, \dots, a_s on vektorruumi V **moodustajate süsteem parajasti siis**, kui V on selle süsteemi lineaarne kate:

$$V = L(a_1, \dots, a_s).$$

Lemma 1. *Olgu a_1, \dots, a_s vektorruumi V moodustajate süsteem. Kui selle süsteemi mingi vektor avaldub ülejäänud vektorite lineaarkombinatsioonina, siis selle vektori väljajätmisel süsteemist a_1, \dots, a_s same jällegi vektorruumi V moodustajate süsteemi.*

Kuna süsteem a_1, \dots, a_s on lineaarse katte $L(a_1, \dots, a_n)$ moodustaja süsteem, siis saame lemmast 1.1 teha järelduse.

Järeldus 1.18. Kui vektor a_i , kus $i \in 1, 2, \dots, n$, avaldub süsteemi a_1, \dots, a_n ülejäänud vektorite lineaarkombinatsioonina, siis

$$L(a_1, \dots, a_n) = L(a_1, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n).$$

Näiteks $L(a, b, a, c, b, b) = L(a, b, c)$ mistahes vektorite $a, b, c \in V$ korral.

1.4. VEKTORRUUMI BAAS. VEKTORI KOORDINAADID

Definitsioon 1.7

Vektorruumi V baasiks $\{e_1, \dots, e_n\}$ nimetatakse vektorruumi V lineaarselt sõltumatut moodustajate süsteemi.

Teoreem 1.19. Vektorruumi kõikides baasides on samapalju elemente.

Vektorruumi mõõtmeks ehk **dimensiooniks** nimetatakse elementide arvu vektorruumi baasis. Ainult nullvektorist koosneva vektorruumi mõõtmeks loetakse arv 0. Selles vektorruumis ei ole baasi, sest ei ole lineaarselt sõltumatuid vektorite süsteeme. Vektorruumi V mõõdet tähistatakse $\dim(V)$.

Lause 1.7

n -mõõtmelise vektorruumis on iga n lineaarselt sõltumatust vektorist koosnev süsteem baas.

Näide 1.3. Leidke vektorruumi \mathbb{R}^2 kolm erinevat baasi.

Kuna vektorruumi \mathbb{R}^2 mõõde on 2, siis selle vektorruumi mistahes baasi kuulub kaks vektorit, mis on lineaarselt sõltumatud. Vektorruumi üheks baasiks on vektorite süsteem e_1, e_2 , kus

$$e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1).$$

Teiseks baasiks on vektorite süsteem $\{a_1, a_2\}$, kus $a_1 = (1, 1), a_2 = (0, 1)$.

Kolmandaks baasiks on vektorite süsteem $\{d_1, d_2\}$, kus $d_1 = (0, 1), d_2 = (2, 3)$.

Viimane vektorite süsteem on lineaarselt sõltumatu, kuna lineaarse kombinatsiooni

$$kd_1 + ld_2 = (0, k) + (2l, 3l) = (2l, k + 3l)$$

võrdumisest nullvektoriga saame avaldada kordajad k ja l

$$(2l, k + 3l) = (0, 0)$$

siis $l = 0$ ja $k + 3l = 0$ ehk $k = 0$. Seega süsteem $\{d_1, d_2\}$ on lineaarselt sõltumatu ja vastavalt lausele 1.3 võime öelda, et süsteem on vektorruumi \mathbb{R}^2 baas.

Kui vektorruum V on n -mõõtmeline, siis vektorruumi baasiks on $\{e_1, \dots, e_n\}$ ja baasi definitsiooni kohaselt avaldub vektor $\mathbf{a} \in V$ realarvude $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ kaudu järgmiselt:

$$\mathbf{a} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n.$$

Definitsioon 1.8

Vektori \mathbf{a} kordinaatideks baasil $\{e_1, \dots, e_n\}$ nimetatakse kordajaid x_1, x_2, \dots, x_n avaldises

$$\mathbf{a} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n.$$

Vektorite liitmisel, lahutamisel ja arvuga korrutamisel tuleb vektorite kordinaadid vastavalt liita, lahutada ja arvuga korrutada.

Olgu vektorruumi V kaks erinevat baasi $\{e_1, \dots, e_n\}$ (vana baas) $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ ja (uus baas) ning kuulugu vektor \mathbf{a} vektorruumi V ($\mathbf{a} \in V$). Avaldugu vektor \mathbf{a} uue baasi kaudu järgmiselt:

$$\mathbf{a} = x'_1 e'_1 + x'_2 e'_2 + \dots + x'_n e'_n.$$

Uue baasi elemendid avaldugu vana baasi kaudu järgmiselt

$$\begin{cases} e'_1 = a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + \dots + a_{n1}e_n \\ e'_2 = a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + \dots + a_{n2}e_n \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ e'_n = a_{1n}e_1 + a_{2n}e_2 + \dots + a_{nn}e_n \end{cases}$$

Leiame vektori \mathbf{a} kordinaadid vanal baasil:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= x'_1 e'_1 + x'_2 e'_2 + \dots + x'_n e'_n = \\ &= x'_1 (a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + \dots + a_{n1}e_n) + x'_2 (a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + \dots + a_{n2}e_n) + \dots \\ &\quad + x'_n (a_{1n}e_1 + a_{2n}e_2 + \dots + a_{nn}e_n). \end{aligned}$$

Võtame kokku liikmed vana baasi kaudu, saame:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= (x'_1 a_{11} e_1 + x'_1 a_{21} e_2 + \dots + x'_1 a_{n1} e_n) + (x'_2 a_{12} e_1 + x'_2 a_{22} e_2 + \dots + x'_2 a_{n2} e_n) + \dots \\ &\quad + x'_n a_{1n} e_1 + x'_n a_{2n} e_2 + \dots + x'_n a_{nn} e_n) = \\ &= x'_1 a_{11} + x'_1 a_{21} + \dots + x'_1 a_{n1}) e_1 + (x'_2 a_{12} + x'_2 a_{22} + \dots + x'_2 a_{n2}) e_2 + \dots \\ &\quad + (x'_n a_{1n} + x'_n a_{2n} + \dots + x'_n a_{nn}) e_n. \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix}.$$

Tähistame maatriksi

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Maatriksit A nimetatakse **baasiteisenduse maatriksiks** üleminekul vanalt baasilt uuele baasile. Baasiteisenduse maatriks on regulaarne, see tähendab, et $|A| \neq 0$. Saame **üleminekuvalemid** kirjutada lühemal kujul:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix}.$$

Kehtib ka vastupidine seos:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Näide 1.4. Tõestage, et hulk $U = \{(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, u_n) \mid u_1, u_2, \dots, u_{n-1} \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^n$ on vektorruumi \mathbb{R}^n alamruum ning leidke selle alamruumi baas ja mõõde.

Näitame, et hulk U on vektorruumi \mathbb{R}^n alamruum. Kuna

$(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, u_n) + (v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_n) = (u_1 + v_1, \dots, u_{n-1} + v_{n-1}, u_n + v_n) \in U$, sest viimase vektori esimene ja viimane komponent on võrdsed, siis U on kinnine liitmise suhtes. Kuna

$$k(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, u_n) = (ku_1, ku_2, \dots, ku_{n-1}, ku_n) \in U,$$

siis U on kinnine ka reaalarvuga korrutamise suhtes. Seega U on alamruum. Alamruumi U vektorite süsteem

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0, 0, \dots, 0, 1), \\ e_2 &= (0, 1, 0, \dots, 0, 0), \\ &\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ e_{n-1} &= (0, 0, 0, \dots, 1, 0). \end{aligned}$$

22PEATÜKK 1. VEKTORRUUMID. VEKTORITE LINEAARNE SÕLTUVUS...

on lineaarselt sõltumatu, sest ükski vektor ei avaldu ülejäänute lineaarkombinatsioonina. Ta on ka moodustajate süsteem, sest alamruumi U iga vektor $(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, u_1) \in U$ avaldub kujul

$$(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, u_1) = u_1 e_1 + u_2 e_2 + \dots + u_{n-1} e_{n-1}.$$

Järelikult e_1, e_2, \dots, e_{n-1} on alamruumi U baas. Kuna vektorruumi mõõde on tema baasivektorite arv, siis

$$\dim U = n - 1.$$

II READ

2.1. ARVREAD, REA SUMMA

Definitsioon 2.1

Arvreaks (lühemalt reaks) nimetatakse **lõpmatut summat**, mis avaldub kujul

$$\sum_{k=0}^{\infty} u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_n + \dots \quad (2.1)$$

Rea liikmeteks nimetatakse arve $u_0, u_1, \dots, u_n, \dots$

rea üldliikmeks nimetatakse suvalise indeksiga rea liiget u_n .

Moodustame rea (2.1) osasummad järgmiselt:

$$S_0 = u_0;$$

$$S_1 = u_0 + u_1;$$

...

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

Rea osasummade jadaks nimetatakse jada (S_n) , kus

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

Definitsioon 2.2

Rea summaks nimetatakse piirväärtust (kui see eksisteerib)

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n,$$

kirjutame

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} u_k.$$

Aritmeetilised read. Vaatleme rida, mille liikmed on aritmeetilise jada liikmed. Aritmeetilise jada $a_n = a_1 + d(n - 1)$ esimese n liike summa S_n avaldub kujul

$$S_n = \sum_{k=1}^n (a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + (n - 1)d)).$$

Kirjutame rea liikmete summad tagurpidises järjekorras

$$S_n = (a_1 + (n - 1)d) + (a_1 + (n - 2)d) + \dots + a_1.$$

Liites kokku mõlemad avaldised, saame

$$\begin{aligned} 2S_n &= (2a_1 + (n - 1)d) + (2a_1 + (n - 1)d) + \dots + (2a_1 + (n - 1)d) = \\ &= n(2a_1 + (n - 1)d), \\ S_n &= \frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1)d). \end{aligned}$$

Esimese n naturaalarvu summa saame, kui $a_1 = d = 1$, siis

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n}{2}(n + 1).$$

Geomeetrilised read.

Geomeetrilise jada üldliige on $a_n = a_1 q^{n-1}$ ja esimese n liikme summa S_n avaldub järgmiselt

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_1 x^k = a_1 + a_1 x + a_1 x^2 + \dots + a_1 x^{n-1}.$$

Korrutame saadud summa muutujaga x :

$$x \cdot S_n = a_1 x + a_1 x^2 + \dots + a_1 x^n.$$

Lahutame kaks eelnevat avaldist, saame

$$S_n - x \cdot S_n = a_1 - a_1 x^n = a_1(1 - x^n),$$

$$S_n(1 - x) = a_1(1 - x^n) \Rightarrow S_n = \frac{a_1(1 - x^n)}{1 - x}.$$

Kui $a_1 = 1$, siis

$$\frac{1 - x^n}{1 - x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{n-1}.$$

Geomeetriliseks reaks nimetatakse rida kujul

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = 1 + q + q^2 + \dots + q^n + \dots$$

Harmonilised read.

Harmoniliseks reaks nimetatakse rida kujul

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^a} = 1 + \frac{1}{2^a} + \frac{1}{3^a} + \dots, \quad a > 0.$$

Kui $a = 1$, siis saame järgmise harmonilise rea

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

Selle rea osasumma S_n on järgmine

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \dots + \frac{1}{n}.$$

Näide 2.1. Leida osasummade jada ja summa järgmisele reale

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+1)}.$$

Lahutame kõigepealt murru osamurdude summaks järgmiselt:

$$\frac{2}{n(n+2)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+2}.$$

Määrame kordajad A ja B võrdusest

$$2 = A(n + 2) + Bn.$$

Kui võtame $n = 0$, siis saame $A = 1$ ja kui võtame $n = -2$, siis saame $B = -1$. Seega

$$\frac{2}{n(n+2)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}.$$

Leiame osasumma

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+2)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) = \\ &= \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots \\ &\quad \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right). \end{aligned}$$

Koondame liikmed ja saame

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}.$$

Rea summa saamiseks peame võtma piirväärtuse

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{3}{2}.$$

Seega saime rea summaks

$$S = \frac{3}{2}.$$

2.2. ARVRIDADE KOONDUVUS JA HAJUVUS

Rida (2.1)

$$\sum_{k=0}^{\infty} u_k$$

koondub summaks S , kui rea summa S on **lõplik** (kui eksisteerib **lõplik piirväärtus** $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, ehk kui rea osasummade jada (S_n) koondub summaks S).

Rida (2.1) hajub, kui piirväärtust **ei eksisteeri** või kui piirväärtus on lõpmatu ehk kui rea osasummade jada (S_n) ei koonu. Seega kui

$$\sum_{k=0}^{\infty} u_k = \infty \quad \text{või} \quad \sum_{k=0}^{\infty} u_k = -\infty,$$

siis on tegemist hajuva reaga. Kui **real on lõplik summa**, siis sümboliga

$$\sum_{k=0}^{\infty} u_k$$

tähistatakse nii rida kui ka tema summat.

Tarvilik tingimus rea koonduvuseks (rea hajumise tunnus).

Lause 2.2

Kui rida $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ **koondub**, siis tema üldliige läheneb nullile:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = 0. \quad (2.2)$$

Tõestus.

Kui rida koondub, siis eksisteerib lõplik piirväärtus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S.$$

Samuti kehtib

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S.$$

Kuna kehtib võrdus

$$u_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n - u_0 - u_1 - \dots - u_{n-1} = S_n - S_{n-1},$$

siis võttes mõlemast võrduse poolst piirväärtuse, saame

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0.$$

Tarvilikku tingimust tuleks kõigepealt kontrollida. See tähendab, et tarviliku tingimuse kehtimine ei ole piisav rea koondumise üle otsustamiseks, vaid teame seda, et **kui tingimus ei ole täidetud, võime kindlalt öelda, et rida hajub**. Seetõttu võib tarvilikku tingimust nimetada ka **rea hajumise tunnuseks**.

Näide 2.2. Uurida järgmise rea koonduvust

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k.$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k = -1 + 1 - 1 + 1 - \dots;$$

$$S_1 = -1, \quad S_2 = -1 + 1 = 0, \quad S_3 = -1 + 1 - 1 = -1, \quad \dots$$

Rea osasummad moodustavad jada

$$(-1, 0, -1, 0, \dots),$$

mis on hajuv ja seetõttu ka vastav rida on hajuv.

Näide 2.3. Uurida järgmise rea koonduvust

$$\sum_{k=1}^{\infty} 1^k.$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k = 1 + 1 + 1 + 1 + \dots$$

$$S_1 = -1, \quad S_2 = 1 + 1 = 2, \quad S_3 = 1 + 1 + 1 = 3, \quad \dots, \quad S_n = n, \quad \dots$$

Rea osasummad moodustavad jada

$$(1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots),$$

mis on tõkestamata

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$$

ja seetõttu on tegemist hajuva reaga.

Kirjutame välja arvrea (2.1) järgmise summana

$$\sum_{k=0}^{\infty} u_k = \sum_{k=0}^n u_k + \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k. \quad (2.3)$$

Arvrea **jääkliikmeks** nimetatakse rida

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} u_k. \quad (2.4)$$

Arvrea summa S võime samuti kirjutada järgmisel kujul

$$S = S_n + R_n,$$

kus R_n on rea (2.4) summa.

Koonduva rea (2.1) korral on rea jääkliige samuti koonduv rida ja tema summa R_n on lõpmata väike suurus piirprotsessis $n \rightarrow \infty$ ehk

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0.$$

Tehted koonduvate ridadega.

1. Kui arvreas (2.1) juurde **lisada või ära jätta** lõplik arv liikmeid, siis see **ei mõjuta rea koonduvust**. Koonduv rida jääb koonduvaks ning hajuv rida jääb hajuvaks.
2. Kui arvrida (2.1) koondub, siis koondub ka rida $\sum cu_k$, kus c on reaalarv, kehtib võrdus

$$\sum_{k=0}^{\infty} cu_k = c \sum_{k=0}^{\infty} u_k.$$

3. Kui **kaks erinevat rida** $\sum u_k$ ja $\sum v_k$ **koonduvad**, siis koonduvad ka read, mis on moodustatud nende ridade **summast** $\sum u_k + v_k$ ja **vahest** $\sum u_k - v_k$ ning kehtib võrdus

$$\sum_{k=0}^{\infty} (u_k \pm v_k) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k \pm \sum_{k=0}^{\infty} v_k.$$

Näide 2.4. Uurida järgmise rea koonduvust

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+5}.$$

Kontrollime koonduvuse tarvilikku tingimust (2.2), selleks leiame piirväärtuse.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{5}{n}} = 1.$$

Tarvilik tingimus koondumiseks ei ole täidetud, seega saame öelda, et antud rida hajub.

Lause 2.2**Geomeetriline rida**

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = 1 + q + q^2 + \dots$$

koondub siis ja ainult siis, kui $|q| < 1$. Geomeetrilise rea summa avaldub sel juhul valemiga

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}.$$

Tõestus.

Kasutame seost

$$(1-q)(1+q+q^2+\dots+q^n) = 1-q^{n+1},$$

saame

$$S_n = \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

suvalise $n \in \mathbb{N}_0$ korral. Kui $|q| < 1$, siis $\lim_{n \rightarrow \infty} q^{n+1} = 0$, mistõttu

$$\begin{aligned} S &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-q} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q^{n+1}}{1-q} = \\ &= \frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q} \lim_{n \rightarrow \infty} q^{n+1} = \frac{1}{1-q}. \end{aligned}$$

Seega juhul $|q| < 1$ rida $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$ koondub summaks

$$S = \frac{1}{1-q}.$$

Kui $|q| \geq 1$, siis ei ole tarvilik tingimus koondumiseks täidetud, ehk $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n \neq 0$. Sellest järeldeb, et sel juhul geomeetriline rida hajub.

Lause 2.3. Harmooniline rida

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

hajub.

Harmonilise rea üldliige avaldub valemiga $u_n = 1/n$, koondumise tarvilik tingimus (2.2) on täidetud, sest

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Järeldus.

Tarvilik tingimus $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ ei ole piisav rea koondumiseks.

Lause 2.2

Harmoniline rida

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^a} = 1 + \frac{1}{2^a} + \frac{1}{3^a} + \frac{1}{4^a} + \dots$$

koondub parajasti siis, kui $a > 1$.

2.3. POSITIIVSED JA VAHELDUVATE MÄRKIDEGA ARVREAD

Definitsioon 2.3

Positiivseks arvreaks nimetatakse rida

$$\sum_{k=0}^{\infty} u_k, \quad \text{kus } u_k \geq 0 \text{ iga } k = 0, 1, 2, \dots \text{ korral.} \quad (2.5)$$

Lause 2.5. Positiivne rida (2.5) **koondub** siis ja ainult siis, kui tema osasummade jada on tõkestatud, ehk kui leidub arv $M > 0$, nii et

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k \leq M \quad \text{iga } n = 0, 1, \dots \text{ korral.} \quad (2.6)$$

Järelikult positiivsete ridade korral rida koondub, kui

$$\sum_{k=0}^{\infty} u_k < \infty,$$

rida hajub, kui

$$\sum_{k=0}^{\infty} u_k = \infty.$$

Positiivsete arvridade võrdluslaused.

Lause 2.3

Olgu $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ ja $\sum_{k=0}^{\infty} v_k$ sellised read, et

$$0 \leq u_k \leq v_k, \quad \text{iga } k \in \mathbb{N} \text{ korral.}$$

- a. Kui rida $\sum_{k=0}^{\infty} v_k$ **koondub**, siis koondub ka rida $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$.
- b. Kui rida $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ **hajub**, siis hajub ka rida $\sum_{k=0}^{\infty} v_k$.

Järeldus. Lause 2.6 väited a ja b kehtivad, kui mingist indeksist n alates kehtib võrratus $u_k \leq v_k$ iga $k \geq n$ korral.

2. Lause 2.7. (teine võrdluslause)

Kui $k \rightarrow \infty$ korral on

$$u_k \sim c v_k$$

mingi konstandi $c > 0$ korral, siis mõlemad positiivsed read $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ ja $\sum_{k=0}^{\infty} v_k$ kas koonduvad või hajuvad üheaegselt.

Tähistus $u_k \sim c v_k$ tähistab suuruste **ekvivalentsust**. Suurused on ekvivalentsed, kui piirväärtus nende suhtest on võrdne arvuga 1 ehk

$$\lim \frac{u_k}{v_k} = 1.$$

Seega, kui eksisteerib lõplik piirväärtus

$$\lim \frac{u_k}{v_k} = L \neq 0,$$

siis positiivsed arvread $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ ja $\sum_{k=0}^{\infty} v_k$ kas koonduvad või hajuvad üheaegselt. See tähendab, et rida $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ koondub parajasti siis, kui koondub rida $\sum_{k=0}^{\infty} v_k$.

Näide 2.5. Uurida järgmise rea koonduvust

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}.$$

Kuna $2k-1 = k + (k-1) \geq k$, siis

$$\frac{1}{2k-1} \leq \frac{1}{k}$$

ning

$$\frac{1}{(2k-1)^2} \leq \frac{1}{k^2}$$

iga $k \in \mathbb{N}$ puhul. Olgu

$$u_k = \frac{1}{(2k-1)^2}, v_k = \frac{1}{k^2}.$$

Siis harmooniline rida $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ koondub lause 2.4 põhjal ja võrdluslause 2.6 a kohaselt koondub ka rida $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$, järelikult on tegemist koonduva reaga.

Näide 2.6. Uurida järgmise rea koonduvust

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{1+3^n}.$$

Rea üldliikme kohta kehtib hinnang

$$\frac{2^n}{1+3^n} < \frac{2^n}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Saime geomeetrilise rea üldliikme kui $q = 2/3$. Kuna $q < 1$, siis geomeetriline rida koondub ja esimese võrdluslause (lause 2.6 a) põhjal võime järeldada, et ka temast väiksem rida koondub.

Näide 2.7. Uurida järgmise rea koonduvust

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n^2 + 1}}$$

Kui $n \rightarrow \infty$, siis rea üldliikme kohta kehtib järgmine hinnang

$$\frac{1}{\sqrt{3n^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{n^2 \left(3 + \frac{1}{n^2}\right)}} = \frac{1}{n\sqrt{3 + o(1)}} \sim \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{n}$$

Saime harmoonilise rea üldliikme $1/n$. Kuna harmooniline rida hajub, kui $a = 1$ siis teise võrdluse (lause 2.7) põhjal hajub ka antud rida.

2.4. POSITIIVSETE RIDADE KOONDUVUSTUNNUSED

D'Alembert'i koonduvustunnus. Kui leidub piirväärtus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} \begin{cases} < 1, \text{ siis rida (2.5) koondub,} \\ > 1, \text{ siis rida (2.5) hajub,} \\ = 1, \text{ siis ei saa otsustada.} \end{cases}$$

Cauchy koonduvustunnus. Kui leidub piirväärtus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} \begin{cases} < 1, \text{ siis rida (2.5) koondub,} \\ > 1, \text{ siis rida (2.5) hajub,} \\ = 1, \text{ siis ei saa otsustada.} \end{cases}$$

Raabe koonduvustunnus. Kui leidub piirväärtus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{u_{n+1}}{u_n}\right) \begin{cases} > 1, \text{ siis rida (2.5) koondub,} \\ < 1, \text{ siis rida (2.5) hajub,} \\ = 1, \text{ siis ei saa otsustada.} \end{cases}$$

Logaritmiline koonduvustunnus. Kui leidub piirväärtus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} \begin{cases} > 1, \text{ siis rida (2.5) koondub,} \\ < 1, \text{ siis rida (2.5) hajub,} \\ = 1, \text{ siis ei saa otsustada.} \end{cases}$$

Integraaltunnus. Olgu funktsioon $f(x)$ pidev monotoonselt kahanev piirkonnas $[a, \infty)$ ja olgu $u_n = f(n)$. Rida (2.5) koondub siis ja ainult siis, kui päratu integraal

$$\int_a^{\infty} f(x) dx$$

koondub, kusjuures tema jääkliikme jaoks kehtib hinnang

$$R_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx.$$

Cauchy tunnus on võimsam kui d'Alembert'i tunnus. Kui d'Alembert'i tunnus võimaldab otsustada rea koonduvust või hajuvust, siis võimaldab seda ka Cauchy tunnus, kuid mitte

vastupidi. Raabe tunnus on võimsam kui d'Alembert'i tunnus. Logaritmiline tunnus on omakorda võimsam Cauchy ja Raabe tunnusest. Rea koonduvuse uurimist alustatakse tavaliselt nõrgemate koonduvustunnuste rakendamisega, sest nad on lihtsamad. Võimsamaid tunnuseid kasutatakse siis, kui nõrgemad tunnused ei anna vastust.

Näide 2.8. Uurida järgmise rea koonduvust olenevalt parameetri $a > 0$ väärtustest

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{an}{n+1}\right)^n.$$

Kasutame **Cauchy tunnust**, saame

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{1 + \frac{1}{n}} = a.$$

Rida koondub, kui $a < 1$ ja hajub kui $a > 1$. Kui $a = 1$, siis koondumise tarvilikust tingimusest saame

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{n}}\right)^n = \\ &= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^{-1} = e^{-1} \neq 0. \end{aligned}$$

Seega rida hajub ka $a = 1$ korral.

Näide 2.9. Uurida järgmise rea koonduvust

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(2n+1)!}.$$

Kasutame **d'Alembert'i tunnust**, saame

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)!}{n(2(n+1)+1)!} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)!}{n(2n+3)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{n(2n+3)(2n+2)} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{n(2n+3)2(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n(2n+3)} = 0 < 1. \end{aligned}$$

Seega d'Alembert'i tunnuse põhjal rida koondub.

Näide 2.10. Näidata, et järgmine harmooniline rida koondub, kui $a > 1$ ja hajub kui $a \leq 1$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}.$$

Kui $a \leq 0$, siis rida hajub, sest

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^a} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^a = \infty.$$

Vaatame juhtu, kus $a > 0$. Kasutame **integraaltunnust**, funktsiooniks $f(x) = 1/x^a$.

$$a = 1: \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{c \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^c = \lim_{c \rightarrow +\infty} (\ln c - \ln 1) = \lim_{c \rightarrow +\infty} \ln c = \infty.$$


$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^a} = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{dx}{x^a} = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{x^{-a+1}}{-a+1} \Big|_1^c = \frac{1}{1-a} \lim_{c \rightarrow \infty} (c^{1-a} - 1).$$

$a > 1 \Rightarrow 1 - a < 0$:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^a} = \frac{1}{1-a} \lim_{c \rightarrow \infty} (c^{1-a} - 1) = \frac{1}{1-a} \lim_{c \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{c^{a-1}} - 1 \right) = \frac{1}{1-a} \cdot (-1) = \frac{1}{a-1}.$$

$a < 1 \Rightarrow 1 - a > 0$: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^a} = \frac{1}{1-a} \lim_{c \rightarrow \infty} (c^{1-a} - 1) = \infty.$

Seega oleme näidanud, et integraal koondub juhul, kui $a > 1$, ülejäänud juhtudel integraal hajub. Integraaltunnuse põhjal võime järeldada sellest, et ka harmooniline rida koondub juhul $a > 1$.



Definitsioon 2.3. Vahelduvate märkidega reaks nimetatakse rida kujul

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n, \text{ kus } a_n > 0. \tag{2.7}$$

Vahelduvate märkidega arvrea koonduvuse uurimiseks kasutatakse Leibnizi tunnust.

Leibnizi koonduvustunnus. Kui

a) $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq \dots,$

b) $\lim a_n = 0,$

siis rida (2.7)

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n, \text{ kus } a_n > 0$$

koondub ja tema jääkliikme

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k a_k$$

jaoks kehtib hinnang:

$$|R_n| < a_{n+1}.$$

Näide 2.11. Uurida järgmise rea koonduvust

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}.$$

Rea üldliige avaldub järgmiselt

$$a_n = \frac{1}{n \ln n}.$$

Kontrollime Leibnizi koonduvustunnuse tingimusi.

$$a_2 = \frac{1}{2 \ln 2} > a_3 = \frac{1}{3 \ln 3} > \dots > a_n > \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\ln n} = 0.$$

Leibnizi tunnuse põhjal rida koondub ja tema jääkliikme jaoks kehtib hinnang:

$$|R_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k \ln k} \right| \leq \frac{1}{(n+1) \ln(n+1)}.$$

2.5. RIDADE KOONDUVUSTUNNUSED

Definitsioon 2.4.

Rida (2.1)

$$\sum_{k=0}^{\infty} u_k$$

nimetatakse **absoluutselt koonduvaks**, kui rea liikmete absoluutväärtustest moodustatud rida (2.8) on koonduv

$$\sum_{n=0}^{\infty} |u_n|. \quad (2.8)$$

Kui rida (2.1) koondub aga ei koondub absoluutselt, siis sellist rida nimetatakse **tingimisi koonduvaks**.

Iga absoluutselt koonduv rida on koonduv. Kui koondub rida (2.8), siis sellest järeldeb, et koondub ka rida (2.1). Vastupidi tuleb alati kontrollida, sest tegemist võib olla tingimisi koonduva reaga.

Rea absoluutse koondumise uurimiseks on kaks põhilist koonduvustunnust.

D'Alembert'i koonduvustunnus.

Kui leidub piirväärtus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \begin{cases} < 1, \text{ siis rida (2.1) koondub absoluutselt,} \\ > 1, \text{ siis rida (2.1) hajub,} \\ = 1, \text{ siis ei saa otsustada.} \end{cases}$$

Cauchy koonduvustunnus.

Kui leidub piirväärtus

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|u_k|} \begin{cases} < 1, \text{ siis rida (2.1) koondub absoluutselt,} \\ > 1, \text{ siis rida (2.1) hajub,} \\ = 1, \text{ siis ei saa otsustada.} \end{cases}$$

Näide 2.12. Uurime järgmise rea koonduvust

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}.$$

Leibnizi tunnuse põhjal vahelduvate märkidega rida koondub (näide 2.11). Jääb üle uurida, kas rida koondub absoluutselt. Absoluutset koonduvust uurime **integraaltunnuse** abil, kust näeme, et rida hajub, sest päratu integraal hajub:

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_2^c \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_2^c \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \lim_{c \rightarrow \infty} (\ln \ln x) \Big|_2^c = \lim_{c \rightarrow \infty} (\ln \ln c - \ln \ln 2) = \infty.$$

Kuna vaadeldav rida koondub aga ei koonu absoluutselt, siis tegemist on tingimisi koonduva reaga.

Näide 2.13. Uurime järgmise rea koonduvust

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n}{5^n}.$$

Kasutame **d'Alembert'i** tunnust.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)2^{n+1}}{5^{n+1}} \cdot \frac{5^n}{n2^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)}{5n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{5} = \frac{2}{5} < 1.$$

Järelikult rida koondub absoluutselt.

2.4. RIDADE KOONDUVUSTUNNUSED

2.5. ASTMEREAD

Definitsioon 2.4

Astmereaks nimetatakse rida, mille liikmeteks on funktsioonid $f_n(x) = a_n x^n$ kujul

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots \quad (2.7)$$

Astmerea üldisem kuju.

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - a)^k = a_0 + a_1 (x - a) + a_2 (x - a)^2 + \dots + a_n (x - a)^n + \dots, \quad (2.8)$$

kus $a \in \mathbb{R}$ on fikseeritud arv.

Astmerea kordajateks nimetatakse arve a_0, a_1, \dots ,
rea üldliikmeks nimetatakse suvalise indeksiga rea liiget a_n .

Geomeetriline rida on astmerida kujul (2.7), kus $a_k = 1$ iga $k \in \mathbb{N}_0$ korral.

Astmerea üldisemalt kujult (2.8) saame muutuja vahetusega $x - a = t$ üle minna reale (2.7) ja vastupidi. Iga astmerea jaoks on võimalik leida suurus R , mille korral astmerida koondub absoluutselt, kui $|x| < R$ ($|x - a| < R$) ja hajub, kui $|x| > R$ ($|x - a| > R$), kus $0 \leq R \leq \infty$.

Definitsioon 2.5

Astmerea (2.7) koonduvusvahemikuks nimetatakse vahemikku $(-R, R)$, astmerea (2.8) koonduvusvahemikuks vastavalt vahemikku $(a - R, a + R)$.

Suurust R nimetatakse **koonduvusraadiuseks**.

Kui $R = 0$, siis koondub astmerida vaid punktis $x = 0$.

Koonduvusvahemikke otspunktides võib astmerida koonduda kas tingimisi või absoluutselt või hajuda.

Koonduvusraadiuse leidmiseks kasutatakse **valemeid**:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad (2.9)$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}, \quad (2.10)$$

kui $a_n \neq 0$ ja piirväärtused eksisteerivad.

Definitsioon 2.6. Astmerea koonduvuspiirkonnaks nimetatakse hulka X

$$X = \left\{ x \in \mathbb{R} : \text{rida } \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \text{ koondub} \right\}.$$

Definitsioon 2.7. Astmerea absoluutse koonduvuse piirkonnaks nimetatakse hulka A

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} : \text{rida } \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| |x|^k \text{ koondub} \right\}.$$

Näide 2.5. Leida koonduvusraadius R , koonduvuspiirkond ja absoluutse koonduvuse piirkond järgmisele astmereale

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n+1}.$$

Kõigepealt leiame koonduvusraadiuse R kasutades valemit (2.9):

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(1 + \frac{2}{n}\right)}{n \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = 1.$$

Saime $R = 1$ ja seega koonduvusvahemik on $(-1, 1)$. Selles vahemikus vaadeldav astmerida koondub absoluutselt. Vahemiku otspunktides tuleb koonduvust eraldi uurida. Kui $x = -1$, saame

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1)^n}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}.$$

Saime harmoonilise rea, mille koondumist saame uurida integraaltunnuse abil

$$a = 1 : \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x+1} = \lim_{c \rightarrow +\infty} \ln|x+1| \Big|_0^c = \lim_{c \rightarrow +\infty} (\ln c - \ln 1) = \lim_{c \rightarrow +\infty} \ln c = \infty.$$

Integraaltunnuse põhjal saame öelda et $x = -1$ korral rida hajub.

Kui $x = 1$, saame

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 1^n}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}.$$

Saime vahelduvate märkidega rea, mille koondumist saame uurida Leibnizi tunnuse abil. Kuna

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0,$$

saame Leibnizi tunnuse abil öelda, et rida $x = 1$ korral koondub, kuid ei koondu absoluutselt. Seega koonduvuspiirkond $X = (-1, 1]$ ja absoluutse koonduvuse piirkond $A = (-1, 1)$.

Näide 2.6. Leida koonduvusraadius R ja koonduvusvahemik järgmisele astmereale

$$\sum_{n=i}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n}.$$

Kuna argument x on astmes $2n$, teeme kõigepealt muutuja vahetuse $t = 2n$, saame astmerea kujul

$$\sum_{t=1}^{\infty} \frac{x^t}{t}.$$

Kasutame valemit (2.9):

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{t \rightarrow \infty} \left| \frac{t+1}{t} \right| = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t(1 + \frac{1}{t})}{t} = 1.$$

Seega $R = 1$ ja koonduvusvahemik on $(-1, 1)$.

Näide 2.7. Leida koonduvuspiirkond ja absoluutse koonduvuse piirkond järgmisele astmereale

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}.$$

Kõigepealt leiame koonduvusraadiuse R kasutades valemit (2.10):

$$R = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\frac{1}{k}}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} = 1.$$

Saime $R = 1$ ja seega vaadeldav astmerida koondub absoluutselt vahemikus $(-1, 1)$. Vahemiku otspunktides tuleb koonduvust eraldi uurida. Kui $x = -1$, saame arvrea

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k},$$

mis koondub, kuid ei koonu absoluutselt. Kui $x = 1$, saame arvrea

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k},$$

mis on hajuv (harmooniline rida, $\alpha = 1$). Seega koonduvuspiirkond $X = [-1, 1)$ ja absoluutse koonduvuse piirkond $A = (-1, 1)$.

Teoreem 2.7 (Cauchy–Hadamardi teoreem)

Astmerida

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k,$$

koondub

(a) juhul $R = 0$ vaid punktis $x = 0$ ehk

$$A = X = \{0\}.$$

(b) juhul $0 < R < \infty$

- koondub absoluutselt vahemikus $[-R, R]$
- hajub hulgas $(-\infty, -R) \cup (R, \infty)$ ehk

$$(-R, R) \subset A \subset X \subset [-R, R].$$

(c) kui $R = \infty$, siis astmerida koondub absoluutselt igas punktis $x \in \mathbb{R}$, s.t.

$$A = X = \mathbb{R}.$$

Cauchy–Hadamardi teoreem ei väida midagi astmerea koonduvuse kohta **koonduvusvahemiku** $(-R, R)$ **otspunktides**, kui $0 < R < \infty$.

Teoreem 2.8. Astmerida (2.7) võib igas lõigus $[0, x]$, kus $x \in (-R, R)$, *liikmeti integreerida*, kusjuures

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}.$$

Teoreem 2.9. Astmerida (2.7) võib igas punktis $x \in (-R, R)$, *liikmeti diferentseerida*, kusjuures

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}.$$

Teoreemid 2.8–2.9 kehtivad ka astmerea (2.8) korral.

Abeli lemma.

Kui astmerida (2.7) koondub koonduvusvahemikus $(-R, R)$ parempoolses otspunktis R , siis selle astmerea summa $f(x)$ on vasakult pidev punktis R ehk $f(R-) = f(R)$:

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k R^k.$$

Kui astmerida (2.7) koondub punktis $-R$, siis selle astmerea summa $f(x)$ on paremalt pidev punktis $-R$ ehk $f(-R) = f(-R+)$.

Funktsioon f on vahemikus X arendatud astmerekaks (esitatud astmerekana), kui iga $x \in X = (c - R, c + R)$ korral on

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - c)^k.$$

2.6. TAYLORI JA MACLAURINI READ

Olgu funktsioon $f(x)$ määratud punkti $c \in \mathbb{R}$ mingis ümbruses. Öeldaks, et funktsioon $f(x)$ on **arendatav astmeritta punktis** c , kui leidub astmerida, mis punkti c mingis ümbruses on võrdne funktsiooniga (koondub funktsiooniks $f(x)$):

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - c)^k.$$

Õeldakse, et rida on funktsiooni arendus astmeritta (astmereaks).

Definitsioon 2.8

Funktsiooni $f(x)$ **Taylori reaks** nimetatakse astmerida, mille kordajad (**Taylori kordajad**) avalduvad kujul

$$a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(c), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Taylori rida avaldub järgneval kujul

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n = f(c) + \frac{f'(c)}{1!} (x-c) + \frac{f''(c)}{2!} (x-c)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n + \dots$$

Definitsioon 2.9. Maclaurini reaks nimetatakse rida, mis saadakse Taylori reast, võttes $c = 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \dots$$

2.6.1. TAYLORI VALEMI TULETAMINE

Oletame, et funktsioon $y = f(x)$ omab kõiki tuletisi kuni järguni $(n + 1)$ (kaasa arvatud), mingis punktis $x = a$ sisaldavas vahemikus. Leiame hulkliikme $P_n(x)$ nii, et

$$P_n(a) = f(a); \quad P'_n(a) = f'(a); \quad P''_n(a) = f''(a), \dots, P_n^{(n)}(a) = f^{(n)}(a) \quad (2.11)$$

Hulkliiget $p_n(x)$ hakkame otsima kujul

$$P_n(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \dots + c_n(x-a)^n \quad (2.12)$$

Selle hulkliikme kordajad leiame tingimusest (2.11). Selleks leiame enne $P_n(x)$ tuletised:

Sel juhul kujutab avaldis (2.15) endast lihtsalt antud hulkliikme teist kuju. Iga niisuguse hulkliikme võib lahutada $x - a$ astmete järgi.

Näide 2.8. Esitada hulkliige $P_2(x) = -5 + 2x + x^2$ muutuja $x - 3$ astmete järgi.

Selleks asendame

$$x = (3 + (x - 3)),$$

$$P_2(x) = -5 + 2(3 + (x - 3)) + (3 + (x - 3))^2 = 10 + 8(x - 3) + (x - 3)^2.$$

Vahemikus $X = (c - R, c + R)$ piiramata differentseeruv funktsioon f on arendatav Taylori reaks selles vahemikus parajasti siis, kui funktsioon f Taylori valemi jääkliige R_n rahuldab vahemikus X tingimust

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0.$$

Taylori valemi jääkliige Lagrange'i kujul on

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}, \quad a < \xi_x < x,$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(a + \theta_x(x-a))}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}, \quad 0 < \theta_x < 1.$$

Maclaurini valemi jääkliige Lagrange'i kujul

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta_x x)}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad 0 < \theta_x < 1.$$

Kui funktsioon on f on arendatav astmereaks vahemikus X , siis see astmerida on funktsiooni f Taylori rida. Paljude funktsioonide arendused astmereaks saame tuntud astmeridast aritmeetiliste tehete, rea liikmeti integreerimise ja liikmeti diferentseerimise teel.

2.6.2. TUNTUIMAD ASTMEREAD

Tegemist on Maclaurini ridadega mõnedest põhilistest elementaarfunktsioonidest.

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \\
 \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \sin \frac{n\pi}{2} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \cos \frac{n\pi}{2} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \\
 (a+x)^n &= a^n + na^{n-1}x + n\frac{(n-1)}{2!}a^{n-2}x^2 + \dots + \frac{n(n-1)(n-2) \cdot 2}{(n-1)!}ax^{n-1} + x^n, \\
 \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1), \\
 \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-x)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1, 1), \\
 \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in (-1, 1], \\
 \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].
 \end{aligned}$$

Näide 2.9. Leida funktsioon $f(x) = \arcsin x$ Maclaurini rida $n = 3$ korral.

Kui $n = 3$, siis leiame funktsiooni tuletised kolmanda järguni ja vastavate tuletiste väärtused punktis $x = 0$, seejärel asendame leitud väärtused Maclaurini valemisse.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \arcsin x, & f(0) &= 0, \\
 f'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & f'(0) &= 1, \\
 f''(x) &= -\frac{-2x}{2\sqrt{(1-x^2)^3}}, & f''(0) &= 0, \\
 f'''(x) &= \frac{\sqrt{(1-x^2)^3} - x \cdot \frac{3x}{2\sqrt{(1-x^2)}}}{(1-x^2)^3}, & f'''(0) &= 1.
 \end{aligned}$$

Saime Maclaurini rea

$$\arcsin x = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots = x + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Näide 2.10. Leida funktsiooni $f(x) = 1/(1 - 2x)$ Maclaurini rida, määrata rea koonduvusraadius R .

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1 - 2x}, & f(0) &= 1, \\ f'(x) &= \frac{2}{(1 - 2x)^2}, & f'(0) &= 2, \\ f''(x) &= \frac{8}{(1 - 2x)^3}, & f''(0) &= 8, \\ f'''(x) &= \frac{48}{(1 - 2x)^4}, & f'''(0) &= 48. \end{aligned}$$

Saime Maclaurini rea

$$\frac{1}{1 - 2x} = 1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + \dots$$

Sama rea saamiseks võime kasutada ka järgmist funktsiooni arendust astmeritta

$$\frac{1}{1 - x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots$$

Asendades suuruse x suurusega $2x$, saame

$$\frac{1}{1 - 2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n = 1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + \dots$$

Rea koonduvusraadius on

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n}{2^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-1} = \frac{1}{2}.$$

2.7. ORTOGONAALREAD*

Näitena ortogonaalreast võime kirjutada funktsiooni (2.7) Legendre polünoomidena lineaarse kombinatsioonina

$$f(x) = c_0 P_0(x) + c_1 P_1(x) + c_2 P_2(x) + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x). \quad (2.16)$$

Legendre võrrand on teist järku lineaarne diferentsiaalvõrrand kujul

$$1 - x^2 y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0, \text{ kus } l \text{ on reaalarv (vt punkt 5.5.6).}$$

Definitsioon 2.10. Legendre polünoomideks nimetatakse l astme polünoome, mis on Legendre võrrandi erilahenditeks.

$$P_l(x) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2l-1)}{l!} \left\{ x^l - \frac{l(l-1)}{2(2l-1)} x^{l-2} + \frac{l(l-1)(l-2)(l-3)}{2 \cdot 4(2l-1)(2l-3)} x^{l-4} - \dots \right\}$$

Kui $-1 \leq x \leq 1$, siis $P_0(x) = 1, P_1(x) = x$,

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3), \quad P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x).$$

Funktsiooni $P_k(x)$ on k järku muutuja x polünoom. Iga x astet saame näidata Legendre polünoomide lineaarse kombinatsioonina

$$x^0 = P_0, \quad x^1 = P_1, \quad x^2 = \frac{1}{3}(2P_2 + P_0), \quad x^3 = \frac{1}{5}(2P_3 + 3P_1),$$

$$x_4 = \frac{1}{35}(8P_4 + 20P_2 + 7P_0), \quad x^5 = \frac{1}{63}(8P_5 + 28P_3 + 27P_1).$$

Sellisel juhul funktsioon (7) avaldub kujul

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0P_0 + a_1P_1 + \frac{a_2}{3}(2P_2 + P_0) + \frac{a_3}{5}(2P_3 + 3P_1) + \\ &\quad + \frac{a_4}{35}(8P_4 + 20P_2 + 7P_0) + \frac{a_5}{63}(8P_5 + 28P_3 + 27P_1) + \dots = \\ &= \left(a_0 + \frac{a_2}{3} + \frac{a_4}{5} + \dots\right) P_0 + \left(a_1 + \frac{3a_3}{5} + \frac{3a_5}{7} + \dots\right) P_1 + \\ &\quad + \left(\frac{2a_2}{3} + \frac{4a_4}{7} + \dots\right) P_2 + \left(\frac{2a_3}{5} + \frac{4a_5}{9} + \dots\right) P_3 + \left(\frac{8a_4}{35} + \dots\right) P_4 + \\ &\quad + \left(\frac{8a_5}{63} + \dots\right) P_5 + \dots \end{aligned} \quad (2.17)$$

Loodusteadustes kasutatakse lahendeid, mis asuvad lõigus $-1 \leq x \leq 1$, sellel lõigul kehtib

$$\int_{-1}^1 P_k(x)P_m(x) dx = \frac{2}{2m+1}\delta_{k,m} = \begin{cases} 0, & \text{kui } k \neq m, \\ \frac{2}{2m+1}, & \text{kui } k = m \end{cases} \quad (2.18)$$

Seda kasutame võrrandis (7) olevate kordajate c_k leidmiseks. Selleks korrutame võrrandit (7) funktsiooniga $P_m(x)$ ja integreerime

$$\int_{-1}^1 P_m(x)f(x)dx = \int_{-1}^1 P_m(x) \left[\sum_{k=0}^{\infty} c_k P_k(x) \right] dx = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \int_{-1}^1 P_m(x)P_k(x) dx.$$

Kasutades võrrandit (2.18)

$$\int_{-1}^1 P_m(x)f(x) dx = c_m \int_{-1}^1 P_m(x)P_m(x) dx = \frac{2}{2m+1}c_m,$$

$$c_m = \frac{2m+1}{2} \int_{-1}^1 P_m(x)f(x) dx.$$

Kasutades valemit (7), saame kirjutada

$$c_m = \frac{2m+1}{2} \int_{-1}^1 P_m(x) \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k dx = \frac{2m+1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} a_k \int_{-1}^1 P_m(x) x^k dx.$$

Asendades saadud avaldisse polünoomid $P_m(x)$, saame avaldada konstandid c_m konstantide a_k kaudu.

Näide 2.11. Leiame $m = 0$ korral kordaja c_0 .

$$P_0 = 1,$$

$$c_0 = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} a_k \int_{-1}^1 x^k dx, \quad \int_{-1}^1 x^k dx = \frac{x^{k+1}}{k+1} \Big|_{-1}^1 = \begin{cases} \frac{2}{2k+1}, & k \text{ on paaris} \\ 0, & k \text{ on paaritu} \end{cases}$$

$$c_0 = a_0 + \frac{a_2}{3} + \frac{a_4}{5} + \frac{a_6}{7} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{2k}}{2k+1}.$$

Saime sama kordaja P_0 jaoks, kui valemis (2.17).

Üldjuht

Definitsioon 2.11. Integreeruva ruuduga funktsioonide süsteemi $\{g_n(x)\}$ nimetatakse **ortogonaalseks** lõigul $[a, b]$, kui

$$\int_a^b g_n(x) g_m(x) dx = 0, \quad m \neq n$$

ja **ortonormeerituks** lõigul $[a, b]$, kui

$$\int_a^b g_n(x) g_m(x) dx = \delta_{m,n} = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ 1, & m = n \end{cases}.$$

Olgu $\{g_n(x)\}$, $n = 1, 2, 3, \dots$, funktsioonide süsteem, mis on ortogonaalne lõigul $[a, b]$ kaalufunktsiooni $w(x)$ suhtes

$$\int_a^b g_m^*(x) g_n(x) w(x) dx = 0, \quad m \neq n.$$

Olgu $f(x)$ suvaline funktsioon, mis on defineeritud lõigus $[a, b]$, mida saab laiendada hulka $\{g_n(x)\}$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k g_k(x) \quad \left| \cdot g_m^*(x)w(x) \right| \quad \left| \int_a^b \right.$$

Saame, et

$$\int_a^b g_m^*(x) f(x) w(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \int_a^b g_m^*(x) g_k(x) w(x) dx = c_m \int_a^b g_m^*(x) g_m(x) w(x) dx.$$

Asendame m muutujaga n

$$c_n = \frac{\int_a^b g_n^*(x) f(x) w(x) dx}{\int_a^b g_n^*(x) g_n(x) w(x) dx}.$$

Nimetaja on funktsiooni $\{g_n(x)\}$ normeerimisintegraal, ruut normist

$$\|g_n\| = \sqrt{\int_a^b g_n^* g_n(x) w(x) dx}, \quad c_n = \frac{1}{\|g_n\|^2} \int_a^b g_n^*(x) f(x) w(x) dx.$$

Funktsiooni [normeerimiseks](#) tuleb funktsioon jagada tema normiga, tulemuseks saame [ortonormeeritud](#) hulga

$$\bar{g}_n = \frac{1}{\|g_n\|} g_n(x), \quad \int_a^b \bar{g}_n^*(x) \bar{g}_m(x) w(x) dx = \delta_{m,n} = \begin{cases} 0, & \text{kui } m \neq n, \\ 1, & \text{kui } m = n \end{cases}$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \bar{g}_k(x).$$

$$c_n = \frac{1}{\|g_n\|^2} \int_a^b g_n^*(x) f(x) w(x) dx = \int_a^b \bar{g}_n^*(x) f(x) w(x) dx.$$

Ortonormeeritud süsteem $\{g_n(x)\}$ on [täielik](#), kui iga funktsioon $f(x)$ on avaldatav lõigus lineaarkombinatsioonina süsteemi funktsioonidest

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \cdot g_k(x), \quad c_n = \int_a^b g_n^*(x) f(x) w(x) dx.$$

Funktsioonid $f(x)$ võivad olla pidevad ja ka tükiti pidevad, omavad lõpliku arvu lõplikke katkevusi ning lõpliku arvu maksimum- ja miinimumpunkte selles lõigus. Funktsiooni saab arendada ritta

$$f(x) \approx f_k(x) = c_0 g_0(x) + c_1 g_1(x) + \dots + c_k g_k(x),$$

kus

$$\int_a^b [f(x) - f_k(x)]^2 w(x) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty$$

Rida $f_k(x)$ koondub lõigul $[a, b]$ keskmiselt funktsiooniks $f(x)$. See tähendab, et koondumist funktsiooniks $f(x)$ ei pea toimuma iga muutuja x korral.

Loodusteadustes on rakendusteks järgmised näited:

1. Elektrostaatikas ja gravitatsiooniteoorias

$$(1 - 2xt + t^2)^{-1/2} = \sum_{k=0}^{\infty} t^k P_k(x).$$

Rida koondub kui $|x| < 1$ ja $|t| < 1$. Elektrostaatiline potentsiaal.

2. Hajumisteoorias

$$e^{itx} = \sum_{k=0}^{\infty} (2k+1) i^k \cdot j_k(t) \cdot P_k(x),$$

kus $j_k(t)$ on sfäärilised Besseli funktsioonid. Rida koondub kui $|x| < 1$ iga t korral.

2.8. FOURIER' READ

Tuntuim ja kõige enam uuritud ortogonaalrida on trigonomeetriline süsteem $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$. Olgu $f(x)$ lõigus $[-\pi, \pi]$ määratud funktsioon. Teatud tingimustel on funktsioon $f(x)$ esitatav summana

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \quad (2.19)$$

kus $a_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \dots$ on mingid konstandid. Eeldame, et $f(x)$ on lõigus $[-\pi, \pi]$ integreeruv funktsioon ja korrutame võrduse (2.19) mõlemat poolt trigonomeetrilise süsteemi elementidega ja integreerime üle lõigu $[-\pi, \pi]$ (oletame, et see on

võimalik). Kasutades seoseid

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cdot \cos kx \, dx = 0,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 kx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 kx \, dx = \pi,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} dx = 2\pi,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cdot \cos mx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cdot \sin mx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cdot \sin mx \, dx = 0, \quad k \neq m,$$

saame kordajate a_k ja b_k jaoks valemid

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \cos kx \, dx, \quad k = 0, 1, 2, 1 \dots; \quad (2.20)$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \sin kx \, dx, \quad k = 1, 2, \dots; \quad (2.21)$$

Definitsioon 2.12. Funktsiooni $f(x)$ trigonomeetriliseks Fourier' reaks lõigus $[-\pi, \pi]$ nimetatakse rida

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \quad (2.22)$$

kus kordajad a_0 , a_k ja b_k on määratud seostega

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \cos kx \, dx, \quad k = 0, 1, 2, \dots; \quad (2.23)$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \sin kx \, dx, \quad k = 1, 2, \dots \quad (2.24)$$

Valemi (2.22) võime kirjutada ka kujul

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + a_3 \cos 3x + \dots + b_1 \sin x + b_2 \sin 2x + b_3 \sin 3x + \dots$$

Näide 2.12.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi, \\ 0, & -\pi < x < 0. \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx),$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \cos kx \, dx, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \sin kx \, dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

Punktis 0 on katkevuspunkt

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot 1 \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 f(x) \cdot 1 \, dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cdot 1 \, dx = 1,$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \cos kx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \, dx = \frac{1}{\pi} \frac{\sin kx}{k} \Big|_0^{\pi} = 0,$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \sin kx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin kx \, dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\cos kx}{k} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{k\pi} (1 - \cos k\pi),$$


$$\cos kx = \begin{cases} 1, & k \text{ paaris} \\ -1, & k \text{ paaritu} \end{cases} \quad b_k = \frac{2}{k\pi}, \quad k \text{ paaritu},$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + b_1 \sin x + b_3 \sin 3x + b_5 \sin 5x + \dots = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right).$$

Osasummad

$$S_1 = \frac{1}{2}; S_2 = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sin x; S_3 = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} \right);$$

$$S_4 = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} \right).$$



FOURIER' REA KOONDUVUS

Definitsioon 2.13. Funktsiooni nimetatakse **siledaks** vahemikus (a, b) , kui ta on selles vahemikus pidevalt diferentseeruv ehk funktsioon on diferentseeruv ja tema tuletis on pidev funktsioon.

Definitsioon 2.14. Funktsiooni $f(x)$ nimetatakse **tükiti siledaks** vahemikus (a, b) , kui seda vahemikku on võimalik jagada lõplikuks arvuks osavahemikeks punktidega

$$a = c_0 < c_1 < \dots < c_n = b, \quad n \in \mathbb{N},$$

nii, et igas osavahemikus on funktsioon $f(x)$ sile, kusjuures funktsioonidel $f(x)$ ja $f'(x)$ eksisteerivad oma katkevuspunktides lõplikud ühepoolsed piirväärtused.

Sileda funktsiooni graafik on sile joon. Tükiti sileda funktsiooni graafik koosneb lõplikust arvust siledatest osadest.

Teoreem 2.11 (Dirichlet' teoreem). *Kui funktsioon $f(x)$ on tükiti sile vahemikus*

$(-\pi, \pi)$, siis selle funktsiooni Fourier' rida koondub summaks $S = S(x)$,

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

kusjuures

1. Funktsiooni $f(x)$ pidevuspunktides


$$S(x) = f(x)$$

2. Funktsiooni $f(x)$ katkevuspunktides võrdub rea summa funktsiooni $f(x)$ parempoolse ja vasakpoolse piirväärtuse aritmeetilise keskmisega ehk kui $x = c$ on funktsiooni $f(x)$ katkevuspunkt, siis

$$S(c) = \frac{1}{2}[f(c-) + f(c+)].$$

Näide 2.13. Leiame Fourier' rea perioodilisele funktsioonile, mille periood on 2π , mis on määratud järgmiselt:

$$f(x) = \begin{cases} -x, & \text{kui } -\pi \leq x \leq 0, \\ x, & \text{kui } 0 < x \leq \pi. \end{cases}$$



$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-x) dx + \int_0^{\pi} x dx = \pi,$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-x) \cos(kx) dx + \int_0^{\pi} x \cos(kx) dx.$$

Kordajate a_k määramiseks peame integreerima ositi mõlemat integraali, kus määrame

$$u = -x, \quad du = -dx, \quad dv = \cos(kx)dx, \quad v = \frac{1}{k} \sin(kx)$$

esimeses integraalis ja

$$u = x, \quad du = dx, \quad dv = \cos(kx)dx, \quad v = \frac{1}{k} \sin(kx).$$


teises integraalis. Saame


$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \left[-x \frac{\sin(kx)}{k} \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \sin(kx) dx \right] + \frac{1}{\pi} \left[x \frac{\sin(kx)}{k} \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \sin(kx) dx \right] = \\ &= \frac{1}{\pi k} \left[-\frac{\cos(kx)}{k} \Big|_{-\pi}^0 + \frac{\cos(kx)}{k} \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{\pi k^2} (\cos(k\pi) - 1) = \begin{cases} 0, & \text{kui } k \text{ on paaris} \\ -\frac{4}{\pi k^2}, & \text{kui } k \text{ on paaritu} \end{cases} \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 -x \sin(kx) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(kx) dx = 0. \end{aligned}$$

Kordajad b_k on nullid, sest integraalmärgi all on paaritu funktsioon (ka integreerides saame nulli). Saime rea

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos(3x)}{3^2} + \frac{\cos(5x)}{5^2} + \dots + \frac{\cos((2n+1)x)}{(2n+1)^2} + \dots \right] = \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos((2n+1)x)}{(2n+1)^2}. \end{aligned}$$

Rida koondub kõikides punktides ja tema summa on võrdne antud funktsiooniga. Fourier' rea osasummade joonised erinevate n väärtuste korral.





Fourier' rida funktsiooni korral, mille periood on $2l$.

Kui $f(x)$ on perioodiline funktsioon, mille periood on $2l$, mis üldiselt erineb arvust 2π . Sellise funktsiooni arendamisel Fourier' reaks peame tegema muutuja-vahetuse

$$x = \frac{l}{\pi}t.$$

Saime argumendi t funktsiooni, mis on perioodiline funktsioon perioodiga 2π , mille saame arendada Fourier' reaks lõigul $-\pi \leq x \leq \pi$:

$$f\left(\frac{l}{\pi}t\right) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)),$$

kus

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}t\right) dt, \quad a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}t\right) \cos(kt) dt,$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}t\right) \sin(kt) dt.$$

Endisele muutujale x tagasi minnes kehtivad

$$x = \frac{l}{\pi}t, \quad t = x\frac{\pi}{l}, \quad dt = \frac{\pi}{l} dx.$$

Fourier' rida $2l$ -perioodilise funktsiooni jaoks saab kuju

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos\left(\frac{k\pi}{l}x\right) + b_k \sin\left(\frac{k\pi}{l}x\right) \right),$$

kus

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx, \quad a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f\left(\frac{l}{\pi}t\right) \cos\left(\frac{k\pi}{l}x\right) dx,$$

$$b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f\left(\frac{l}{\pi}t\right) \sin\left(\frac{k\pi}{l}x\right) dx.$$

Fourier' integraal.

Fourier' integraali saame, kui teisendame Fourier' rea integraalkujul

$$f(x) = \int_0^{\infty} [u(y) \cos xy + v(y) \sin xy] dy,$$

$$u(y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot \cos xy dx, \quad v(y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot \sin xy dx.$$

Fourier' integraali saab esitada ka eksponentkujul. Kasutades Euleri võrrandeid

$$\cos xy = \frac{1}{2}(e^{ixy} + e^{-ixy}), \quad \sin xy = \frac{1}{2i}(e^{ixy} - e^{-ixy}).$$

Defineerime funktsiooni

$$w(y) = \frac{1}{2}[u(y) - iv(y)].$$

Asendame Fourier' integraali, saame Fourier' rea **eksponentkuju**

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} w(y)e^{ixy} dy, \quad w(y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ixy} dx.$$

Kui teha asendus $g(y) = \sqrt{2\pi}w(y)$, saame

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(y)e^{ixy} dy, \quad g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ixy} dx.$$


Neid valemeid nimetatakse **Fourier' teisendusteks**.

Fourier' teisenduste jaoks on vajalik, et funktsioon oleks määratud vahemikus $(-\infty, \infty)$ ja seal absoluutselt integreeruv, ehk leidub Q :


$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx = Q.$$

Näide 2.14.

$$f(x) = \begin{cases} A, & -a < x < a \\ 0, & \text{mujal} \end{cases}$$




$$g(y) = \frac{2Aa \sin ay}{\sqrt{2\pi} ay}$$



$$f(x) = e^{-ax^2}, \quad a > 0,$$

$$g(y) = \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-\frac{y^2}{4a}},$$



$$f(x) = e^{-ax}, \quad x > 0, a > 0, \quad g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{a - iy}{a^2 + y^2} \right), \quad \operatorname{Re} g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{a}{a^2 + y^2} \right).$$

III MITME MUUTUJA FUNKTSIOONID

3.1. MITME MUUTUJA FUNKTSIOONI MÕISTE

- Kui x ja y on ristküliku külgede pikkused, siis pindala S avaldub valemiga $S = xy$. Igale x ja y väärtuste paarile vastab pindalal üks väärtus, S on kahe muutuja funktsioon.
- Kui risttahuka servade pikkused on x , y , z , siis tema ruumala avaldub kujul $V = xyz$. Ruumala V on kolme muutuja funktsioon.
- Ideaalse gaasi olekuvõrrandist $pV = nRT$ saame avaldada gaasi ruumala

$$V(p, T, n) = \frac{nRT}{p}.$$

Ruumala V on kolme muutuja p , T ja n funktsioon ehk $V = f(p, T, n)$.

- Funktsionaalne sõltuvus R on nelja muutuja funktsioon, mis on antud järgmiselt

$$R(x, y, z, t) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{\sqrt{1 + t^2}}$$

Definitsioon 3.1

Kahe muutuja x ja y funktsioon on z , kui igale muutuvate suurustega x ja y paarile vastab üks ja ainult üks muutuva suuruse z väärtus $z = f(x, y)$.

Võtame argumendi väärtuste paari: $x = x_0$, $y = y_0$. Kui nendele vastav z äärtus on olemas, siis öeldakseet kahe muutuja funktsioon $z = f(x, y)$ on määratud punktis (x_0, y_0) . Kolme või enama arvu muutujate funktsioonid defineeritakse analoogiliselt.

Definitsioon 3.2

Kahe muutuja funktsiooni **määramispiirkonnaks** imetatakse argumentide x ja y väärtuste paaride (x, y) hulka, mille puhul funktsioon $z = f(x, y)$ on määratud.

Funktsiooni määramispiirkonda saab kujutada **geomeetriliselt**. Kui x ja y iga väärtuspaari kujutada xy tasapinna punktidenä, siis funktsiooni määramispiirkond kujutab teatud punktide hulka tasapinnal.

Näide 3.1. Leida määramispiirkond funktsioonile

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

Et funktsioon oleks määratud, peab juuritav olema mittenegatiivne:

$$1 - x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 1.$$

Määramispiirkonnaks on punktid ringjoone sees või ringjoonel.

Näide 3.2. Leida määramispiirkond funktsioonile

$$f(x, y) = \ln(1 - x^2 - y^2) \Rightarrow x^2 + y^2 < 1$$

Määramispiirkonnaks on punktid ringjoone sees, ringjoon ei ole kaasa arvatud.

Näide 3.3. Leida määramispiirkond funktsioonile



$$f(x, y) = \ln(a^2 - x^2) + \ln(b^2 - y^2).$$

$$a^2 - x^2 > 0 \Rightarrow -a < x < a,$$

$$b^2 - y^2 > 0 \Rightarrow -b < y < b,$$


kus a, b on konstandid.

Vaatleme funktsiooni $z = f(x, y)$, mis on määratud xy -tasapinna mingis piirkonnas G . Püstitame piirkonna G igas punktis (x, y) ristsirge ja asetame sellele lõigu, mis võrdub funktsiooni väärtusega $f(x, y)$. Nii saame punkti P kordinaati-



dega (x, y, z) , kus $z = f(x, y)$.

Definitsioon 3.3. Kahe muutu-
ja funktsiooni $f(x, y)$ graafikuks
nimetatakse punktide P hulka,
mille iga punkti koordinaadid rah-
uldavad hulka $z = f(x, y)$.



Järgnevalt defineerime m muutuja funktsiooni, tema määramispiirkonna ja graafiku.

Definitsioon 3.4

Olgu hulk $D \in \mathbb{R}^m$. Kui igale punktile $P = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ hulgast D on eeskirja f abil vastavusse seatud üks ja ainult üks reaalarv u , siis öeldakse et hulgal D on määratud m muutuja funktsioon ja kirjutatakse

$$u = f(x_1, x_2, \dots, x_m), \quad \forall (x_1, x_2, \dots, x_m) \in D$$

või

$$u = f(P), \quad \forall P \in D.$$

Hulka D nimetatakse funktsiooni f määramispiirkonnaks. Funktsiooni f graafikuks nimetatakse hulka

$$Gr(f) = \{Q = (x_1, \dots, x_m): P = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in D, u = f(P)\}.$$

Kaks m muutuja funktsiooni $u = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ ja $u = g(x_1, x_2, \dots, x_m)$ osutuvad samadeks funktsioonideks, kui neil mõlemal on üks ja sama määramispiirkond D ja samad vastavuse eeskirjad.


3.2. KAHE MUUTUJA FUNKTSIOONI PIIRVÄÄRTUS JA PIDEVUS

Olgu antud xy tasapinna mingis piirkonnas D määratud funktsioon $z = f(x, y)$. Vaatleme mingit punkti $M_0(x_0, y_0)$ selles piirkonnas. Tähistame kahe punkti vahelist kaugust $d(A, B)$.

Definitsioon 3.5. Punkti M ümbruseks raadiusega r nimetatakse punktide hulka, mille iga punkti koordinaadid rahuldavad võrratust $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r$, need punktid asetsevad ringi sees, mille raadius on r ja keskpunkt on $M_0(x_0, y_0)$.

Punkti $M_0(x_0, y_0)$ nimetame hulga D **sisepunktiks**, kui punktil M_0 leidub ümbrus, mis tervenisti sisaldub hulgas D .

Punkti $M_0(x_0, y_0)$ nimetame hulga D **rajapunktiks**, kui punkti M_0 iga ümbrus sisaldab nii hulga D punkte kui ka hulga D mittekuuluvaid punkte (vt joonist 3.1).



Joonis 3.1: Sisepunkt ja rajapunkt hulgas R . (Thomas' Calculus [8])

Definitsioon 3.6

Funktsiooni $f(x, y)$ **piirväärtuseks** punkti $M(x, y)$ lähenemisel punktile $M_0(x_0, y_0)$ nimetatakse arvu A , kui argumendi tõkestamatu lähenemine punktile (x_0, y_0) toob kaasa funktsiooni $f(x, y)$ väärtuste tõkestamatu lähenemise arvule A .

Kui arv A on funktsiooni $f(x, y)$ piirväärtuseks punkti $M(x, y)$ lähenemisel punktile M_0 , siis kirjutatakse

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$$

ehk $f(x, y) \rightarrow A$, kui $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$.

Definitsioon 3.7

Funktsiooni $f(x, y)$ **piirväärtuseks** punkti $M(x, y)$ lähenemisel punktile $M_0(x_0, y_0)$ nimetatakse arvu A , kui argumenti tõkestamatu lähenemine punktile (x_0, y_0) toob kaasa funktsiooni $f(x, y)$ väärtuste tõkestamatu lähenemise arvule A .

Kui arv A on funktsiooni $f(x, y)$ piirväärtuseks punkti $M(x, y)$ lähenemisel punktile M_0 , siis kirjutatakse

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$$

ehk $f(x, y) \rightarrow A$, kui $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$.

Kui $A = 0$, siis öeldakse, et funktsioon $f(x, y)$ on punkti $M_0(x_0, y_0)$ **ümbruses lõpmata väike suurus**.

Kui $A = \infty$ või $A = -\infty$, siis öeldakse, et funktsioon $f(x, y)$ on punkti $M_0(x_0, y_0)$ ümbruses **lõpmata suur suurus**. Kahe muutuja funktsiooni piirväärtuse korral kehtivad ühe muutuja funktsiooni piirväärtuste teooria põhilised teoreemid.

Teoreem 3.1

Lõpliku arvu funktsioonide *summa piirväärtus* võrdub nende *piirväärtuste summaga*. Täpsemalt, kui protsessis $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ kehtivad koondumised $f(x, y) \rightarrow A, g(x, y) \rightarrow B$, siis

$$f(x, y) + g(x, y) \rightarrow A + B.$$

Analoogiliselt

$$f(x, y) - g(x, y) \rightarrow A - B.$$

Teoreem 3.2

Funktsioonide *korrutise piirväärtus* võrdub *piirväärtuste korrutisega*. Täpsemalt, kui protsessis $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ kehtivad koondumised $f(x, y) \rightarrow A, g(x, y) \rightarrow B$, siis

$$f(x, y) \cdot g(x, y) \rightarrow A \cdot B.$$

Teoreem 3.3

Kahe funktsiooni *jagatise piirväärtus* võrdub nende funktsioonide *piirväärtuste jagatisega* eeldusel, et nimetaja piirväärtus ei võrdu nulliga. Täpsemalt, kui protsessis $x \rightarrow x_0$, $y \rightarrow y_0$ kehtivad koondumised $f(x, y) \rightarrow A$, $g(x, y) \rightarrow B$, siis

$$\frac{f(x, y)}{g(x, y)} \rightarrow \frac{A}{B}.$$

Teoreem 3.4

Kui punkti $M_0 = (x_0, y_0)$ ümbruses on funktsioonil $f(x, y)$ olemas piirväärtus

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = g(y)$$

ja piirväärtus

$$\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = A,$$

siis arvu A nimetatakse funktsiooni $f(x, y)$ **korduvaks piirväärtuseks** punktis M_0 ja kirjutatakse

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = A.$$

Analoogiliselt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = B.$$

Näide 3.4. Leida järgmised piirväärtused.

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 2}} (2x^2 - y^2) &= -2; & \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{5 - xy}{x^2 + y^2} &= 5; \\ \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{y} &= \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{x \sin xy}{xy} = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} x \cdot \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{y} = a \cdot 1 = a, \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} &= \lim_{z^2 \rightarrow 0} \frac{\sin z^2}{z^2} = 1. \end{aligned}$$

PIIRVÄÄRTUSTE LEIDMINE ÜLEMINEKUL POLAAR- KOORDINAATIDELE

Polaarkoordinaatidele üleminekul kasutame järgmist teisendust:

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi.$$

Kui $(x, y) \rightarrow 0$, siis $r \rightarrow 0$ iga nurga φ korral ja

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

Leiame polaarkoordinaatidele üle minnes järgmise piirväärtuse:

Arv A on funktsiooni $f(x, y)$ piirväärtuseks punktis M_0 siis ja ainult siis, kui piirprotsessi iga lähenemisteed mööda punktile M_0 annab arvu A .

Kui on vaja näidata, et piirväärtust punktis M_0 ei eksisteeri, tuleb leida kaks erinevat lähenemisteed punktile M_0 , mille korral piirväärtused on erinevad.

Näitame, et järgmist piirväärtust ei eksisteeri:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

Läheneme punktile $(0, 0)$ mööda sirget $y = x$, siis

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x^2}{x^2 + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 - 1)}{2x^2} = \frac{0}{2} = 0$$

Läheneme punktile $(0, 0)$ mööda sirget $y = 2x$, siis

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=2x}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - (2x)^2}{x^2 + (2x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3x^2}{5x^2} = -\frac{3}{5}$$

Märkus. Kui argumendid lähenevad punktile (x, y) , kus nad ei ole võrdse väärtusega: $x \neq y$, siis tuleks piirväärtuse leidmisel läheneda punktile mööda sellist sirget, mis läbib antud punkti. Näiteks punkti $(-1, 1)$ korral võib läheneda punktile mööde sirget $y = x + 2$ või $y = -x$.

Kahe muutuja funktsioon piirväärtuse mõistet saab üldistada ka m muutuja funktsioonide jaoks. Olgu hulk $D \subset \mathbb{R}^m$ ja funktsioon $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ning olgu punkt $A = (a_1, a_2, \dots, a_m) \in D$ hulga D kuhjumispunkt (see tähendab, et punkti A igas ümbruses leidub vähemalt üks temast erinev vaadeldavasse hulka kuuluv punkt).

Definitsioon 3.8

Kui argumendi $P = (x_1, \dots, x_m)$ tõkestamata lähenemine punktile $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ toob kaasa funktsiooni f väärtuste $f(P)$ tõkestamata lähenemise arvule c , siis ütleme, et **funktsiooni f piirväärtus protsessis $P \rightarrow A$** on arv c ja kirjutame

$$\lim_{P \rightarrow A} f(P) = c$$

või

$$\lim_{x_1, \dots, x_m \rightarrow a_1, a_2, \dots, a_m} f(x_1, \dots, x_m) = c.$$

PIDEVUS**Definitsioon 3.9**

Funktsiooni $z = f(x, y)$ nimetatakse **pidevaks punktis (x_0, y_0)** , kui ta on selles punktis määratud ning funktsiooni väärtus punktis (x_0, y_0) võrdub tema piirväärtusega lähenemisel sellele punktile

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0).$$

Funktsiooni, mis on pidev mingi piirkonna igas punktis, nimetatakse **pidevaks selles piirkonnas**.

Pidevuse tingimuse võib kirjutada ka kujul

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \Delta z = 0$$

Kõik mitme muutuja elementaarfunktsioonid on pidevad oma määramispiirkonnas. Kui funktsioon $f(x, y)$ ei ole pidev punktis (x_0, y_0) , siis öeldakse, et funktsioon $f(x, y)$ on **katkev** selles punktis. Sellel juhul nimetatakse punkti $f(x_0, y_0)$ funktsiooni $f(x, y)$ **katkevuspunktsiks**.

Teoreem 3.5. *Kõik mitme muutuja elementaarfunktsioonid on pidevad oma määramispiirkonnas.*

Näide 3.5. Näidata, et funktsioon

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & \text{kui } x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & \text{kui } x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

on pidev oma määramispiirkonnas.

Funktsiooni f määramispiirkond on kogu xy -tasand. Igas piirkonnas, kus $x^2 + y^2 \neq 0$, on funktsioon f elementaarfunktsioon ja teoreemi 3.5 põhjal pidev. Kontrollida tuleb funktsiooni f pidevust ainult punktis $(0, 0)$. Selleks kasutame pidevuse definitsiooni ja võtame piirväärtuse

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = 0,$$

siis järelikult funktsioon f on pidev ka punktis $(0, 0)$, sest piirväärtus argumendi lähenemisel arvule 0 on võrdne funktsiooni väärtusega selles punktis. Seega funktsioon f on pidev oma määramispiirkonnas. Kui piirväärtus ei võrdu funktsioon väärtusega antud punktis, siis funktsioon on katkev selles punktis.

Definitsioon 3.10

Funktsiooni $u = f(P)$ nimetatakse **pidevaks punktis A** , kui

$$\lim_{P \rightarrow A} f(P) = f(A).$$

Kui funktsioon ei ole pidev punktis A , siis funktsiooni nimetatakse **katkevaks punktis A** .

3.3. OSATULETISED

Olgu antud kahe muutuja funktsioon $z = f(x, y)$. Anname muutujale x juurdekasvu Δx , jättes y väärtuse muutmata. Siis funktsioon z saab juurdekasvu (osamuudu)

$$\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y).$$

Definitsioon 3.11

Funktsiooni $z = f(x, y)$ esimest järku **osatuletiseks argumenti x järgi** nimetatakse piirväärtust

$$z'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}.$$

Funktsiooni $z = f(x, y)$ esimest järku **osatuletiseks argumenti y järgi** nimetatakse piirväärtust

$$z'_y = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}.$$

Osatuletist argumenti x järgi tähistatakse

$$z'_x, \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \quad f'_x(x, y), \quad z_x, \quad f_x(x, y).$$

Osatuletist argumenti y järgi tähistatakse

$$z'_y, \quad \frac{\partial z}{\partial y}, \quad f'_y(x, y), \quad z_y, \quad f_y(x, y).$$

Osatuletise defineerimisel funktsiooni osamuut $\Delta_x z$ arvutatakse muutumatu y puhul ja funktsiooni osamuut $\Delta_y z$ muutumatu x puhul, võime definitsioonid formuleerida järgnevalt.

Funktsiooni $z = f(x, y)$ osatuletise leidmiseks x järgi võetakse tema **tuletis argumenti x järgi**, mis arvutatakse eeldusel, et y on **konstantne**.

Analoogiliselt: funktsiooni $z = f(x, y)$ osatuletise leidmiseks y järgi võetakse tema **tuletis argumenti y järgi**, mis arvutatakse eeldusel, et x on **konstantne**.

Siit on näha, et osatuletise leidmiseks sobivad ühe muutuva funktsiooni tuletise leidmise eeskirjad, tuleb mees pidada, *millise muutja järgi osatuletist otsitakse*. Tuletame veel meelde reeglid konstandi tuletise leidmiseks: konstandi tuletis on null aga kui konstant on funktsiooni kordajaks, mille järgi osatuletist leiame, siis jääb konstant tuletise ette kordajaks.

$$c' = 0, \quad (cf(x))' = c(f(x))'.$$

Näide 3.6. Leida osatuletised funktsioonile $z = x^2 + 3y^2 + 2xy^2$.

Võttes osatuletise argumendi x järgi, argumendi y tuletist võtame konstandi tuletise reegli järgi, ehk teises liidetavas on ainult argumendist y sõltuv funktsioon, seega

$$(3y^2)'_x = 0.$$

Kolmas liidetav sõltub ka argumendist x , seega tuletise võtmisel jäävad konstandid tuletise ette kordajateks:

$$(2xy^2)'_x = 2y^2(x)'_x = 2y^2.$$

Võttes osatuletise argumendi y järgi, argumendi x tuletist võtame konstandi tuletise reegli järgi, siis esimeses liidetavas on ainult argumendist x sõltuv funktsioon, seega

$$(x^2)'_y = 0.$$

Kolmas liidetav sõltub ka argumendist y , seega tuletise võtmisel jäävad konstandid tuletise ette kordajateks:

$$(2xy^2)'_y = 2x^2(y^2)'_y = 2x2y = 4xy.$$

Osatuletised funktsioonile z on kujul

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 2y^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 6y + 4xy.$$

Näide 3.7. Leida osatuletised funktsioonile $z = x^2 \sin y$.

$$z'_x = 2x \sin y, \quad z'_y = x^2 \cos y.$$

Sarnaselt kahe muutuja funktsiooni osatuletise mõistele defineerime m muutuja funktsiooni osatuletised.

Definitsioon 3.12.

Olgu hulk $D \subset \mathbb{R}^m$, funktsioon $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ning $P = (x_1, \dots, x_m)$ määramispiirkonna D sisepunkt. Piirväärtust

$$\lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + \Delta x_i, x_{i+1}, \dots, x_m) - f(x_1, \dots, x_m)}{\Delta x_i}$$


nimetatakse **funktsiooni f osatuletiseks muutuja x_i järgi** punktis P ja tähistatakse $f_x(x_1, \dots, x_m)$ või

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_m).$$

OSATULETISTE GEOMEETRILINE TÕLGENDUS

Osatuletis $\partial z / \partial y$ võrdub arvuliselt pinna $z = f(x, y)$ ja tasapinna $x = \text{const}$ lõikejoone puutuja tõusunurga tangensiga (joonis).

Osatuletis $\partial z / \partial x$ võrdub arvuliselt pinna $z = f(x, y)$ ja tasapinna $y = \text{const}$ lõikejoone puutuja tõusunurga tangensiga.



Arvutades osatuletised esimest järku osatuletistest, :
Neid tähistatakse järgmiselt

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, & f''_{xx}(x, y), & z''_{xx}, & z_{xx}, & f_{xx}(x, y); \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}, & f''_{xy}(x, y), & z''_{xy}, & z_{xy}, & f_{xy}(x, y); \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, & f''_{yy}(x, y), & z''_{yy}, & z_{yy}, & f_{yy}(x, y). \end{aligned}$$

Näide 3.8. Leida kõik teist järku osatuletised järgmise funktsiooni jaoks

$$z = x^4 - 5x^2y^2 + 6xy + 7.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 4x^3 - 10xy^2 + 6y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -10x^2y + 6x,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 12x^2 - 10y^2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -20xy + 6,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -10x^2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = -20xy + 6.$$

Definitsioon 3.13.

Teist järku **segatuletisteks** nimetatakse osatuletisi

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}.$$

Määratud ja pideva funktsiooni z korral on funktsiooni pidevad segatuletised võrdsed. Kehtib järgmine teoreem.

Teoreem 3.5.

Kui funktsioon $z = f(x, y)$ ning tema osatuletised

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

on punktis $M(x, y)$ ning selle mingis ümbruses määratud ja pidevad, siis selles punktis teist järku segatuletised on võrdsed

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}.$$


Definitsioon 3.14.

Funktsiooni $f(x, y)$ nimetatakse **diferentseeruvaks** punktis $P(a, b)$, kui funktsioonil on selles punktis osatuletised määratud ja pidevad.

Kahe muutuja funktsiooni diferentseeruvus antud punktis tähendab geomeetriliselt selle funktsiooni graafiku puutujatasandi olemasolu vastavas graafiku punktis.

Definitsioon 3.15.

Pinna $z = f(x, y)$ **puutujatasandiks** punktis $Q_0(x_0, y_0)$ nimetatakse tasandit, millel asuvad kõik pinna punkti $Q_0(x_0, y_0)$ läbivate joonte puutujad.



Definitsioon 3.16.

Pinna **normaalsirgeks** (normaaliks) punktis $Q_0(x_0, y_0)$ nimetatakse punkti $Q_0(x_0, y_0)$ läbivat sirget, mis on risti puutujatasandiga punktis $Q_0(x_0, y_0)$.

Teoreem 3.6.

Olgu funktsioon $z = f(x, y)$ pidev punkti $P(a, b)$ mingis ümbruses. Kui funktsioon $f(x, y)$ on diferentseeruv punktis $P(a, b)$, siis tema graafikul eksisteerib puutujatasand punktis $A = (a, b, f(a, b))$. **Puutujatasandi** võrrand on

$$z - f(a, b) = f'_x(a, b)(x - a) + f'_y(a, b)(y - b).$$

Teiselt poolt, kui funktsiooni $f(x, y)$ graafikul eksisteerib punktis A puutujatasand, kusjuures see puutujatasand ei ole paralleelne z -teljega, siis funktsioon $f(x, y)$ on diferentseeruv punktis A .

Pinna $z = f(x, y)$ **normaalsirge** punktis $A = (a, b, f(a, b))$ on esitatav kahe võrrandiga:

1) parameetiline võrrand

$$\begin{cases} x = a + t f'_x(a, b) \\ y = b + t f'_y(a, b) \\ z = f(a, b) - t \end{cases}$$

2) kanooniline võrrand

$$\frac{x - a}{f'_x(a, b)} = \frac{y - b}{f'_y(a, b)} = \frac{z - f(a, b)}{-1}.$$

3.4. TÄISDIFERENTSIAAL

Eeldame, et kahe muutuja funktsioon $f(x, y)$ on pidev. Anname argumentidele x ja y juurdekasvu $\Delta x, \Delta y$. Siis funktsioon saab juurdekasvu

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y).$$

Eeldame lisaks, et funktsioonil on punktis (x, y) pidevad osatuletised. Avaldame Δz osatuletiste kaudu. Selleks liidame ja lahutame võrduse paremast poolst liikme $f(x, y + \Delta y)$

$$\Delta z = [f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)] + [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)].$$

Mõlemates nurksulgudes on ühe muutuja funktsioonid. Rakendame neile Lagrange'i keskväärtusteoreemi

$$[f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)] = \frac{\partial f(\bar{x}, y + \Delta y)}{\partial x} \cdot \Delta x, \quad \bar{x} \in [x, x + \Delta x],$$

$$[f(x, y + \Delta y) - f(x, y)] = \frac{\partial f(x, \bar{y})}{\partial y} \cdot \Delta y, \quad \bar{y} \in [y, y + \Delta y],$$

Asendame

$$\Delta z = \frac{\partial f(\bar{x}, y + \Delta y)}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial f(x, \bar{y})}{\partial y} \cdot \Delta y.$$

Eelduse kohaselt on osatuletised pidevad (pidevuse definitsioonist ja piirväärtuse omadusest saame)

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\partial f(\bar{x}, y + \Delta y)}{\partial x} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial f(\bar{x}, y + \Delta y)}{\partial x} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \varepsilon_1,$$

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\partial f(x, \bar{y})}{\partial y} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial f(x, \bar{y})}{\partial y} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} + \varepsilon_2,$$

Järelikult

$$\Delta z = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \cdot \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y.$$

Kaks viimast liidetavast on kõrgemat järku lõpmata väikesed suurused võrreldes kahe esimesega ja funktsiooni muudu Δz peaosa moodustavad kaks esimest liiget.

Argumendi diferentsiaaliks nimetatakse argumendi muutu

$$dx = \Delta x, dy = \Delta y.$$

Definitsioon 3.17.

Kahe muutuja funktsiooni juurdekasvu peaosas argumentide juurdekasvude tõkestamatul kahanemisel nimetatakse selle funktsiooni **täisdiferentsiaaliks**. Tähistatakse

$$dz = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \cdot \Delta y = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy,$$

$$dz = z'_x dx + z'_y dy.$$

Geomeetriliselt tähendab funktsiooni $z = f(x, y)$ täisdiferentsiaal funktsiooni graafiku puutujatasandi aplikaadi (z -koordinaadi) muutu üleminekul punktist $P(x, y)$ punkti $P_1(x + \Delta x, y + \Delta y)$.

Kahe muutuja funktsiooni täisdiferentsiaali saab kasutada funktsiooni juurdekasvu ligikaudseks arvutamiseks, sellisel juhul loetakse

$$\Delta z \approx dz \text{ ehk } \Delta z \approx z'_x dx + z'_y dy.$$


Selline võrdsustamine on õigustatud, kui argumentide juurdekasvud on väikesed. Samast valemist on võimalik leida ka funktsiooni uus väärtus $f(x + \Delta x, y + \Delta y)$, selleks avaldame funktsiooni muudu avaldisest

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

funktsiooni uue väärtuse täisdiferentsiaali kaudu järgmiselt

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) \approx z'_x dx + z'_y dy,$$

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) \approx f(x, y) + z'_x dx + z'_y dy.$$



Näide 3.9. Leida funktsiooni $z = 3x^2 + \cos y$ täisdiferentsiaal.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 6x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\sin y \Rightarrow dz = 6x dx - \sin y dy.$$

Näide 3.10. Olgu silindri kõrgus 25 cm ja raadius 10 cm. Kui palju muutub silindri ruumala, kui kõrgust suurendada 2 mm ja põhja raadiust vähendada 1 mm võrra?

Silindri ruumala $V = \pi r^2 h \Rightarrow V(10, 25) = \pi \cdot 100 \cdot 25 = 2500\pi$.

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \pi r^2, \quad \frac{\partial V}{\partial r} = 2\pi r h$$

$$dV = \pi r^2 dh + 2\pi r h dr.$$

$$r = 10; \Delta r = -0,1 \text{ (cm)}; \quad h = 25; \Delta h = 0,2 \text{ (cm)}.$$

$$\Delta V \approx dV = \frac{\partial V}{\partial r} \Delta r + \frac{\partial V}{\partial h} \Delta h.$$

$$\Delta V \approx \pi r^2 \Delta h + 2\pi r h \Delta r = \pi [100 \cdot 0,2 - 2 \cdot 10 \cdot 25 \cdot 0,1] = -30\pi.$$

Ruumala väheneb 30π võrra.

$$V_1 = V + \Delta V \approx 2500\pi - 30\pi = 2470\pi.$$

Uue ruumala täpne väärtus on

$$V = \pi r^2 h \quad \Rightarrow \quad V(10 - 0,1; 25 + 0,2) = \pi \cdot 9,9^2 \cdot 25,2 = 2469,85\pi$$

Näide 3.11. Arvutada täisdiferentsiaali abil ligikaudselt avaldise $2,97^3 \cdot 3,01^4$ väärtus.

Kasutame valemit

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) \approx f(x, y) + z'_x dx + z'_y dy$$

Leiame kõigepealt funktsiooni kuju ja osatuletised argumentide järgi, siis argumentide arvulised väärtused ja juurdekasvud.

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^3 y^4, & f'_x &= 3x^2 y^4, & f'_y &= 4x^3 y^3, \\ x &= 3, & \Delta x &= -0,03; & y &= 3, & \Delta y &= 0,01. \\ f(3, 3) &= 2187, & f'_x(3, 3) &= 2187, & f'_y(3, 3) &= 2916. \end{aligned}$$

Funktsiooni uue väärtuse ligikaudne suurus on

$$2,97^3 \cdot 3,01^4 \approx 2187 + 2187(-0,03) + 2916 \cdot 0,01 = 2150,55$$

Täpne väärtus esitatuna tuhandikeni on $2,97^3 \cdot 3,01^4 = 2150,4796 \dots$

Täisdiferentsiaal m muutuja funktsiooni $u = f(x_1, \dots, x_m)$ jaoks punktis P_0 avaldub kujul

$$df(P_0) = f_{x_1}(P_0)dx_1 + f_{x_2}(P_0)dx_2 + \dots + f_{x_m}(P_0)dx_m.$$

3.5. KÕRGEMAT JÄRKU OSATULETISED

Olgu antud kahe muutuja funktsioon $z = f(x, y)$. Leiame esimest järku osatuletised. Osatuletised on argumentide x, y funktsioonid, leiame uuesti osatuletised x ja y järgi, saame teist järku osatuletised.

Teist järku osatuletised

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f''_{xx}(x, y), & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f''_{yy}(x, y), \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f''_{yx}(x, y), & \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= f''_{xy}(x, y). \end{aligned}$$

Teist järku tuletisi võib omakorda diferentseerida x ja y järgi, saame kolmandat järku osatuletised

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3}, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^3}, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y \partial x^2}, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^2 \partial x}, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2}, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y \partial x}, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y \partial x \partial y},$$

3.6. KAHE MUUTUJA FUNKTSIOONI EKSTREEMUMID. OPTIMISEERIMINE


Tuletame kõigepealt meelde ühe muutuja funktsiooni jaoks ekstreemumite tarvilikud tingimused. Funktsioonil $y = f(x)$ on punktis $x = x_0$ maksimum parajasti siis, kui $f'(x_0) = 0$ ja $f''(x_0) < 0$ ja miinimum parajasti siis, kui $f'(x_0) = 0$ ja $f''(x_0) > 0$.

Punkti ümbruse mõistest järeldeb, et punkt $P(x_0 + h, y_0 + k)$ kuulub punkti P_0 r -ümbrusesse siis ja ainult siis, kui $h^2 + k^2 < r^2$.

Tõepoolest, kui leiame punktide $P_0(x_0, y_0)$ ja $P(x_0 + h, y_0 + k)$ vahelise kauguse, saame

$$\sqrt{(x_0 + h - x_0)^2 + (y_0 + k - y_0)^2} < r \quad \sqrt{h^2 + k^2} < r$$

Definitsioon 3.12. Funktsioonil $z = f(x, y)$ on lokaalne maksimum punktis $P_0(x_0, y_0)$, kui leidub selle punkti küllalt väike ümbrus, mille kõikides punktides $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$.



Definitsioon 3.13. Funktsioonil $z = f(x, y)$ on lokaalne miinimum punktis $P_0(x_0, y_0)$, kui leidub selle punkti küllalt väike ümbrus, mille kõikides punktides $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$.

Kui funktsioonil on punktis (x_0, y_0) ekstreemum, siis kehtivad tingimused:


$$f'_x(x_0, y_0) = 0 \quad f'_y(x_0, y_0) = 0$$

Tõepoolest, kui kahe muutuja funktsioonil on punktis (x_0, y_0) ekstreemum, siis ka ühe muutuja funktsioonil $F(x, y_0)$ on punktis $x = x_0$ ekstreemum ja järelikult tema tuletis argumenti x järgi on võrdne nulliga. Samuti peab ekstreemumpunktis $x = x_0$ osatuletis argumenti y järgi olema võrdne nulliga. **Saadud tingimused ei ole piisavad tingimused ekstreemumi olemasoluks.**

Näide 3.12. Leida funktsiooni $z = xy$ statsionaarsed punktid.

Antud funktsiooni korral on punktis $(0, 0)$ tarvili-
kud tingimused täidetud, aga ekstreemumi ei ole:

$$z_0(0, 0) : z'_x(z_0) = 0, z'_y(z_0) = 0$$



Definitsioon 3.14

Statsionaarseks punktiks nimetatakse punkti, mille korral kõik osatuletised on selles punktis võrdsed nulliga.


Definitsioon 3.15

Kriitiliseks punktiks nimetatakse punkti, kui see punkt on statsionaarne punkt või osatuletist selles punktis ei eksisteeri või on osatuletis lõpmatu.

Näiteks funktsioonil $f(x, y) = -\sqrt{x^2 + y^2}$ on kriitiliseks punktiks $(0, 0)$ (joonis).

Funktsiooni kriitiline punkt võib asetseada ka määramispiirkonna rajajoonel.

Funktsioonil võib lokaalne ekstreemum esineda vaid tema kriitilises punktis.



Teoreem 3.6. Kui funktsioonil $z = f(x, y)$ on olemas punkti (x_0, y_0) ümbruses esimest ja teist järku osatuletised, siis punktis (x_0, y_0) , kus

$$f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0) = 0$$

on lokaalne ekstreemum juhul, kui selles punktis on täidetud tingimus

$$W(x, y) = \begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix} = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2 > 0$$

sealjuures on punktis (x_0, y_0)

lokaalne maksimum, kui selles punktis $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$
lokaalne miinimum, kui $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$.

Kui $W(x, y) < 0$, siis funktsioonil $f(x, y)$ selles punktis lokaalset ekstreemumit ei ole. Kui $W(x, y) = 0$, siis tuleb funktsiooni käitumist uurida, kas Δz säilitab märki punkti (x_0, y_0) ümbruses.

$W(x, y)$ nimetatakse funktsiooni **diskriminandiks**.

Sadulpunktiks nimetatakse diferentseeruva funktsiooni $f(x, y)$ kriitilisele punktile (a, b) vastavat punkti $(a, b, f(a, b))$, mille igas ümbruses on punkte, kus $f(x, y) > f(a, b)$ ja punkte, kus $f(x, y) < f(a, b)$.

Näide 3.13. Leida funktsiooni $z = 3x + 24y - x^3 - 2y^3$ lokaalsed ekstreemumid.

Saame, et

$$\begin{aligned} f'_x = 3 - 3x^2, \quad 3x^2 = 3 &\Rightarrow x = \pm 1; \\ f'_y = 24 - 6y^2, \quad 6y^2 = 24 &\Rightarrow y = \pm 2. \end{aligned}$$

Funktsiooni statsionaarsed punktid on: $(1, 2)$; $(1, -2)$; $(-1, 2)$; $(-1, -2)$. Saime neli punkti. Kontrollime nendes punktides diskriminandi W väärtust.

$$f''_{xx} = -6x, \quad f''_{yy} = -12y, \quad f''_{xy} = 0$$

$$W = (-6x)(-12y) - 0^2 = 72xy.$$

$$(1, -2) : 72 \cdot 1 \cdot (-2) < 0; \quad (-1, 2) : 72 \cdot (-1) \cdot 2 < 0$$

$$(1, 2) : 72 \cdot 1 \cdot 2 > 0; \quad f''_{xx} = -6x = -6 < 0$$

6. KAHE MUUTUJA FUNKTSIOONI EKSTREEMUMID. OPTIMISEERIMINE73


Maksimumpunkt: $z(1, 2) = 3 + 48 - 1 - 16 = 34$,

$(-1, -2) : 72 \cdot (-1) \cdot (-2) > 0; f''_{xx} = -6x = 6 > 0$.

Miinumipunkt: $z(-1, -2) = -3 - 48 + 1 + 16 = -34$

Seega funktsiooni lokaalsed ekstreemumid on:

$$z_{\min}(-1, -2) = -34; z_{\max}(1, 2) = 34.$$



Näide 3.14. Leida funktsiooni $z = \cos(y^2 + x^2)$ lokaalsed ekstreemumid.

Saame, et

$$z'_x = -2x \sin(y^2 + x^2), z'_y = -2y \sin(y^2 + x^2)$$


$$\begin{cases} -2x \sin(y^2 + x^2) = 0 \\ -2y \sin(y^2 + x^2) = 0 \end{cases}$$

Ekstreemumpunktiks on punkt koordinaatidega $(0; 0)$.

$$z''_{xx} = -2 \sin(y^2 + x^2) - 4x^2 \cos(y^2 + x^2),$$

$$z''_{yy} = -2 \sin(y^2 + x^2) - 4y^2 \cos(y^2 + x^2),$$

$$z''_{xy} = -4xy \cos(y^2 + x^2).$$



$$W = (-2 \sin(y^2 + x^2) - 4x^2 \cos(y^2 + x^2))(-2 \sin(y^2 + x^2) - 4y^2 \cos(y^2 + x^2)) - (-4xy \cos(y^2 + x^2))^2.$$

$W(0, 0) = 0$. Kuna diskriminant on võrdne nulliga, tuleb funktsiooni täiendavalt uurida, jooniselt on näha, et tegemist on maksimumpunktiga.

Kui kolme muutuja funktsioonil $u = f(x, y, z)$ on olemas punkti (x_0, y_0, z_0) ümbruses esimest ja teist järku osatuletised, siis punktis (x_0, y_0, z_0) , kus

$$f'_x(x_0, y_0, z_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0, z_0) = 0, \quad f'_z(x_0, y_0, z_0) = 0$$

on lokaalne ekstreemum juhul, kui selles punktis on täidetud tingimus

$$W(x, y) = \begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix} = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2 > 0,$$

sealjuures on punktis (x_0, y_0, z_0) **lokaalne maksimum**, kui selles punktis

$$f''_{xx}(x_0, y_0, z_0) < 0, A = \begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} & f''_{xz} \\ f''_{yx} & f''_{yy} & f''_{yz} \\ f''_{zx} & f''_{zy} & f''_{zz} \end{vmatrix} < 0,$$

lokaalne miinimum, kui $f''_{xx}(x_0, y_0, z_0) > 0, A = \begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} & f''_{xz} \\ f''_{yx} & f''_{yy} & f''_{yz} \\ f''_{zx} & f''_{zy} & f''_{zz} \end{vmatrix} > 0.$

Definitsioon 3.21. **Globaalseks ekstreemumiks** nimetatakse funktsiooni suurimat ja vähimat väärtust antud piirkonnas.

Nende leidmiseks peame leidma kõigepealt lokaalsed ekstreemumid, seejärel leiame funktsiooni väärtused rajapunktides, neist suurim on globaalne maksimum ja vähim on globaalne miinimum.

Definitsioon 3.22. Kui funktsioon f on antud piirkonnas D , siis funktsioonil on punktis $P_0 \in D$ **globaalne maksimum**, kui piirkonna D igas punktis P kehtib võrratus

$$f(P) \leq f(P_0)$$

ja **globaalne miinimum**, kui piirkonna D igas punktis kehtib võrratus

$$f(P) \geq f(P_0).$$

Näide 3.15. Leida funktsiooni $z = x^2 + y^2 - x$ globaalsed ekstreemumid piirkonnas $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Saame, et


$$z'_x = 2x - 1, \quad z'_y = 2y, \quad z''_{xx} = 2, \quad z''_{yy} = 2, \quad z''_{xy} = z''_{yx} = 0.$$

Võrdsustades kaks esimest võrrandit nulliga, saame statsionaarseks punktiks

$$x = \frac{1}{2}, \quad y = 0.$$

Funktsiooni väärtus selles punktis on

$$z\left(\frac{1}{2}, 0\right) = -\frac{1}{4}.$$



Piirkonna rajajooneks on ringjoon keskpunktiga koordinaatide alguspunktis ja raadius on 1. Rajajoonel kehtib võrrand $x^2 + y^2 = 1$ ehk $y^2 = 1 - x^2$, asendades funktsiooni z võrrandisse suuruse y^2 , saame rajajoone jaoks seose $z = 1 - x$, kus $x \in [-1, 1]$. Kontrollime rajajoonel olevaid funktsiooni väärtuseid punktides $(-1, 0)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$ ja $(0, 1)$, kust leiame maksimaalse ja minimaalse. Suurim väärtus rajajoonel on $z(-1, 0) = 2$ ja vähim $z(1, 0) = 0$. Lõpuks võrdleme saadud funktsiooni väärtuseid lokaalsete ekstreemumitega ja valime kõige suurema ning kõige väiksema väärtuse, mis on globaalseteks ekstreemumiteks. Seega funktsiooni globaalsed ekstreemumid on

$$z_{\min} \left(\frac{1}{2}, 0 \right) = -\frac{1}{4}; \quad z_{\max}(-1, 0) = 2.$$

Definitsioon 3.23. Funktsiooni $f(x, y)$ optimiseerimiseks nimetatakse funktsiooni maksimumi ja miinimumi (ekstreemumite) leidmist.

Paljudes optimiseerimisülesannetes on vaja rahuldada ka lisatingimused, mis kujutavad endast ühte või mitut muutujate vahelist seost. Lihtsamatel juhtudel saab kasutada muutujate elimineerimise võtet, kus üks või mitu lisatingimust võimaldavad avaldada tundmatu teiste kaudu ja asendada võrranditesse.

3.6.1. TINGLIKUD EKSTREEMUMID. LAGRANGE'I MEETOD

Lagrange'i kordajate meetod on lisakitsendustega optimiseerimisülesande lahendusmeetod. Ülesande lahendamiseks tuleb moodustada Lagrange'i funktsioon (laiendatud funktsioon)

$$J = f + \lambda g,$$

kus f on funktsioon, g lisatingimus kujul $g = 0$ ja λ Lagrange'i kordaja, mille peame leidma. Lahendamiseks leiame osatuletised funktsioonis J kõigi tundmatute järgi, võrdsustame osatuletised nulliga. Saame järgmise süsteemi

$$\begin{cases} \frac{\partial J}{\partial x_i} = 0, & i = 1, 2, \dots, n \\ g = 0. \end{cases}$$

Saadud võrrandisüsteemist leiame tinglikud statsionaarsed punktid. Seejuures eeldame, et nende punktide ümbrustes, mis on saadud süsteemi lahenditeks, on funktsioonide f ja J esimest järku osatuletised pidevad.

Definitsioon 3.24. Tinglikuks kriitiliseks punktiks nimetatakse punkti, kui see punkt on statsionaarne punkt või punkte, mis rahuldavad lisatingimust ja kus funktsioonide f ja J osatuletised ei ole pidevad.

Funktsioonil võib **tinglik lokaalne ekstreemum** esineda vaid tema tinglikus kriitilises punktis. Kui Lagrange'i funktsioonil J on tinglikus statsionaarses punktis vastava $\lambda = \lambda_0$ korral lokaalne või globaalne ekstreemum, siis funktsioonil f on selles punktis P_0 vastav tinglik lokaalne või globaalne ekstreemum.

Vaatame kahe muutuva funktsiooni $f(x, y)$, mille jaoks on vaja leida lokaalne ekstreemum lisakitsenduse $g(x, y) = 0$ korral. Siis Lagrange'i funktsioon on kujul $J = f(x, y) + \lambda g(x, y)$ ja statsionaarsed punktid leiame süsteemist

$$\begin{cases} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial g(x, y)}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} + \frac{\partial g(x, y)}{\partial y} = 0, \\ g(x, y) = 0. \end{cases}$$

Kolme muutuva funktsiooni $u = f(x, y, z)$ ja lisakitsenduste $g(x, y, z) = 0$ jaoks on Lagrange'i funktsioon kujul $J = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z)$ ja statsionaarsete punktide leidmiseks saame süsteemi

$$\begin{cases} \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} + \frac{\partial g(x, y, z)}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} + \frac{\partial g(x, y, z)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} + \frac{\partial g(x, y, z)}{\partial z} = 0, \\ g(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

Saame kolm võrrandit ekstreemumite leidmiseks, **lisaks peab olema rahuldatud lisakitsendus**. Kokku neljast võrrandist leiame ekstreemumpunkti kõik koordinaadid (x, y, z) ja Lagrange'i kordaja λ väärtuse.

Märkus. Kui võtame osatuletise ka Lagrange'i kordaja λ järgi, saame võrrandi $g(x, y, z) = 0$, seega võime lisatingimuse asendada osatuletisega:

$$\frac{\partial J}{\partial \lambda} = 0.$$

Näide 3.16. Leida lokaalsed tinglikud ekstreemumid funktsioonile $f = x^2 + y^2$ lisakitsendusel $x + y = 4$.

6. KAHE MUUTUJA FUNKTSIOONI EKSTREEMUMID. OPTIMISEERIMINE77

Moodustame funktsiooni $J = f + \lambda g$, mis sisaldab summat esialgsest funktsioonis ja Lagrange'i kordajaga läbikorrutatud lisatingimusest

$$J = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 4).$$

Võtame osatuletised tundmatute järgi, saame

$$\begin{cases} \frac{\partial J}{\partial x} = 2x + \lambda, \\ \frac{\partial J}{\partial y} = 2y + \lambda. \end{cases}$$

Võrdsustame saadud osatuletised nulliga, lisakitsendusega koos saame lahendamiseks süsteemi

$$\begin{cases} 2x + \lambda = 0, \\ 2y + \lambda = 0, \\ x + y = 4. \end{cases}$$

Süsteemi lahenditeks on $x = 2$, $y = 2$, $\lambda = -4$. Kuna $f''_{xx} = 2 > 0$, siis leitud punkt võib olla lokaalseks miinimumpunktiks. Kui uurime ekstreemumi piisavaid tingimusi, selgub, et

$$W = 2 \cdot 2 - 0 > 0,$$

seega tegemis on lokaalse ekstreemumiga. Leitud punktile $(2, 2)$ vastav funktsiooni väärtus on 8. Seega funktsioonil on lokaalne tinglik miinimum $f_{\min}(2, 2) = 8$.

Üldjuht. Olgu antud n muutuja funktsioon $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ja m lisatingimust kujul

$$g_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_k, \quad k = 1, 2, \dots, m,$$

kus a_1, a_2, \dots, a_m on konstandid. Tuleb konstrueerida funktsioon

$$J = f + \lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 + \dots + \lambda_m g_m = f + \sum_{k=1}^m \lambda_k g_k.$$

Osatuletised kõigi argumentide järgi

$$\frac{\partial J}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} + \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_i} + \lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x_i} + \dots + \lambda_m \frac{\partial g_m}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{k=1}^m \lambda_k \frac{\partial g_k}{\partial x_i},$$

kus $i = 1, 2, \dots, n$. Osatuletised võrdsustame nullidega ja lisades lisakitsendused, saame lahendamiseks järgmise süsteemi

$$\begin{cases} \frac{\partial J}{\partial x_i} = 0 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{k=1}^m \lambda_k \frac{\partial g_k}{\partial x_i} = 0, & i = 1, 2, \dots, n, \\ g_k = a_k, & k = 1, 2, \dots, m. \end{cases}$$

Tundmatuid on kokku $m + n$: argumente x_i on n ja Lagrange'i kordajaid λ_i on m .

Näide 3.17. Ruutvormid n muutujaga:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_{ij} x_i x_j,$$

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 = 1,$$

kus $C_{ij} = C_{ji}$ on konstandid. Juhul $n = 3$ saame

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 C_{ij} x_i x_j = \\ &= C_{11}x_1^2 + 2C_{12}x_1x_2 + C_{13}x_1x_3 + C_{22}x_2^2 + 2C_{23}x_2x_3 + C_{33}x_3^2, \end{aligned}$$

$$g(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 x_i^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1.$$

Lagrange'i kordajate meetod

$$J = (C_{11} - \lambda)x_1^2 + 2C_{12}x_1x_2 + 2C_{13}x_1x_3 + (C_{22} - \lambda)x_2^2 + 2C_{23}x_2x_3 + (C_{33} - \lambda)x_3^2,$$

$$\begin{cases} (C_{11} - \lambda)x_1 + C_{12}x_2 + C_{13}x_3 = 0 \\ C_{21}x_1 + (C_{22} - \lambda)x_2 + C_{23}x_3 = 0 \\ C_{31}x_1 + C_{32}x_2 + (C_{33} - \lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$

Saime karakteristliku võrrandisüsteemi.

Näide 3.18. Leida punktid ellipsil $17x^2 + 12xy + 8y^2 = 100$, mis on kõige lähemal ja kõige kaugemal koordinaatide alguspunktist.

Tegemist on ellipsiga (vt joonis), mille keskpunkt asub koordinaatide alguspunktis ja me peame leidma punktide koordinaadid ellipsi lühema ja pikema poolteljele jaoks, mis annavadki lühima ja pikima kauguse koordinaatide alguspunktist. Peame leidma ekstreemumid funktsioonile, mis leiab kauguse koordinaatide alguspunkti ja ellipsi suvalise punkti vahel. Tähistame suvalise ellipsi punkti tähega $P(x, y)$, siis kaugus avaldub

$$d = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

6. KAHE MUUTUJA FUNKTSIOONI EKSTREEMUMID. OPTIMISEERIMINE 79

Et ekstreemumi leidmine oleks lihtsam, võtame funktsiooniks kauguse ruudu

$$d^2 = f(x, y) = x^2 + y^2,$$

lisakitsenduseks on ellipsi võrrand


$$17x^2 + 12xy + 8y^2 = 100.$$

Seega funktsioon J saab kuju

$$J = x^2 + y^2 + \lambda(17x^2 + 12xy + 8y^2 - 100).$$

Leiame osatuletise kõigi tundmatute järgi:

$$\begin{cases} \frac{\partial J}{\partial x} = 2x + 34\lambda x + 12\lambda y, \\ \frac{\partial J}{\partial y} = 2y + 12\lambda x + 16\lambda y, \\ \frac{\partial J}{\partial \lambda} = 17x^2 + 12xy + 8y^2 - 100. \end{cases}$$



Joonis 3.2

Saame võrrandisüsteemi

$$\begin{cases} 2x + \lambda(34x + 12y) = 0, \\ 2y + \lambda(12x + 16y) = 0, \\ 17x^2 + 12xy + 8y^2 = 100. \end{cases}$$

Esimesest kahest võrrandist avaldame Lagrange'i kordaja λ ja paneme mõlemad avaldised omavahel võrduma, saame

$$\frac{-2x}{34x + 12y} = \frac{-2y}{12x + 16y} \Rightarrow 12x^2 + 16xy = 34xy + 12y^2.$$

Lihtsustame ja jagame võrrandi arvuga $(-\frac{3}{2})$, saame

$$8x^2 - 12xy - 8y^2 = 0.$$

Liites saadud võrrandi juurde viimasele süsteemi võrrandile, saame

$$25x^2 = 100 \Rightarrow x = \pm 2.$$

Edasi leiame argumenti y väärtused. Kui $x = 2$, siis

$$y^2 + 3y - 4 = 0,$$

kust saame

$$(y + 1)(y - 4) = 0 \text{ ehk } y = -1, y = 4.$$

Kokkuvõttes oleme saanud neli statsionaarset punkti: $(2, 1)$, $(-2, -1)$, $(2, -4)$ ja

$(-2, 4)$. Leiame kõik teist järku osatuletised

$$\begin{cases} J''_{xx} = 2 + 34\lambda, \\ J''_{yy} = 2 + 16\lambda, \\ J''_{xy} = 12\lambda. \end{cases}$$

Kuna $J''_{xx}(2, 1) = J''_{xx}(-2, -1) = 1.2 > 0$, seega leitud punktid võivad olla lokaalsed tinglikud miinimumpunktid, $J''_{xx}(2, -4) = J''_{xx}(-2, 4) = -1.2 < 0$ seega leitud punktid võivad olla lokaalsed tinglikud maksimumpunktid. Kuna $W(2, 1) = W(-2, -1) = W(2, -4) = W(-2, 4)$, siis teoreemi 3.7 põhjal me ei saa otsustada, kas need punktid osutuvad lokaalseteks tinglikeks ekstreemumiteks. Tegemist on tinglike globaalsete maksimumide ja miinimumidega. Seega ellipsil olevad punktid $(2, 1)$ ja $(-2, 1)$ on kõige lähemal koordinaatide alguspunktile, kaugus koordinaatide alguspunktist on $d = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$. Ellipsi punktid $(2, -4)$ ja $(-2, 4)$ on kõige kaugemal koordinaatide alguspunktist, kaugus on $d = \sqrt{2^2 + (-4)^2} = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20}$.

3.7. VÄHIMRUUTUDE MEETOD

Kui ei ole olemas funktsiooni esitust analüütiliselt, vaid on uurimistulemused tabeli kujul (katseandmed)


x	x_1	x_2	\dots	x_n
y	y_1	y_2	\dots	y_n

Tahame saada antud sõltuvuse esitust valemi kujul $y = f(x)$. Saame tulet a ligikaudse valemi. **Vähimruutude meetodi idee** seisneb selles, **et parimaks valemiks, mis esitab katseliselt saadud sõltuvust, peetakse seda, mille puhul katsel saadud väärtuste ja valemi järgi arvutatud väärtuste vahede ruutude summa on vähim.**


Kõigepealt tuleb ette anda funktsioon $x = f(x)$ kuju, mis sisaldab teatava arvu parameetreid. Nende parameetrite leidmiseks kasutame vähimruutude meetodit. Milline funktsioon valida, selleks tuleks katseandmed kanda joonisele. Paarid $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ esitavad punkte xy tasandil. Kui graafikul on näha, et punktid on grupeerunud järgmisel viisil:

1. teatud **sirge** lähedale (joonis 3.3), siis võib eeldada, et x ja y vahel on lineaarne sõltuvus, mis on esitatav valemiga $y = ax + b$, kus a ja b on otsitavad parameetrid.

2. mingi kõvera ümbruses (joonis 3.4), siis on tegevust **ruutsõltuvusega** $y = ax^2 + bx + c$, kus otsitavad a, b ja c leiame vähimruutude meetodil;




Joonis 3.3



Joonis 3.4

3. eksponentsiaalne sõltuvus (joonis 3.5) $y = ab^x$ kus otsitavad on a ja b .



Joonis 3.5

LINEAARNE REGRESSIOON

Olgu antud empiiriline valem kujul

$$y = ax + b$$

Leiame parameetrid a ja b tingimusest, et sirge tuleb tõmmata nii, et **empii-riliselt saadud punktide ordinaatide ja samadele abstsissidele vastavate sirgete punktide ordinaatide vahede ruutude summa on minimaalne**, ehk

$$u = [y_1 - (ax_1 + b)]^2 + [y_2 - (ax_2 + b)]^2 + \dots + [y_n - (ax_n + b)]^2 \rightarrow \min$$

Saadud summat võib vaadelda kui **kahe muutuja funktsiooni** a ja b suhtes ((x_k, y_k) on etteantud). Tuleb leida funktsiooni $u = u(a, b)$ miinimum. Tarvilik tingimus selleks on osatuletiste nulliga võrdumine:

$$\frac{\partial u}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial b} = 0.$$

Leiame vastavad osatuletised

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial a} &= 2[y_1 - (ax_1 + b)] \cdot (-x_1) + 2[y_2 - (ax_2 + b)] \cdot (-x_2) + \dots \\ &\quad \dots + 2[y_n - (ax_n + b)] \cdot (-x_n), \\ \frac{\partial u}{\partial b} &= 2[y_1 - (ax_1 + b)] \cdot (-1) + 2[y_2 - (ax_2 + b)] \cdot (-1) + \dots \\ &\quad \dots + 2[y_n - (ax_n + b)] \cdot (-1).\end{aligned}$$

Võrdsustades osatuletised nulliga, saame otsitavate ja suhtes kaks lineaarset võrrandit kahe tundmatuga

$$\begin{cases} 2[y_1 - (ax_1 + b)] \cdot (-x_1) + 2[y_2 - (ax_2 + b)] \cdot (-x_2) + \dots \\ \quad \dots + 2[y_n - (ax_n + b)] \cdot (-x_n) = 0, \\ 2[y_1 - (ax_1 + b)] \cdot (-1) + 2[y_2 - (ax_2 + b)] \cdot (-1) + \dots \\ \quad \dots + 2[y_n - (ax_n + b)] \cdot (-1) = 0. \end{cases}$$

ehk

$$\begin{cases} (ax_1 + b - y_1) \cdot x_1 + (ax_2 + b - y_2) \cdot x_2 + \dots + (ax_n + b - y_n) \cdot x_n = 0, \\ (ax_1 + b - y_1) + (ax_2 + b - y_2) + \dots + (ax_n + b - y_n) = 0. \end{cases}$$

ehk

$$\begin{cases} a(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) + b(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n, \\ a(x_1 + x_2 + \dots + x_n) + b \cdot n = y_1 + y_2 + \dots + y_n. \end{cases}$$

ehk

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ b \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot n = \sum_{i=1}^n y_i. \end{cases}$$

Saadud süsteemi nimetatakse **normaalvõrrandite süsteemiks**. Leiame siit ja ning asetame empiirilisse valemisse $y = ax + b$. Seda nimetatakse ka **lineaar-seks regressiooniks**. Kontrollime, kas on tegemist miinimumiga ja ka ekstreemumi

piisavaid tingimusi.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial a^2} = 2x_1^2 + 2x_2^2 + \dots + 2x_n^2 = 2 \sum_{i=1}^n x_i^2 > 0 \rightarrow \min,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial b^2} = 2 + 2 + \dots + 2 = 2n,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial a \partial b} = 2(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = 2 \sum_{i=1}^n x_i,$$

$$W = 2 \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot 2n - \left(2 \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = 4n \sum_{i=1}^n x_i^2 - 4 \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 > 0.$$

Schwartz'i Bunjakowski võrratus

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n \mu_i^2 \geq \sum_{i=1}^n (\gamma_i \cdot \mu_i)^2, \quad (\gamma_i = x_i; \mu_i = 1).$$

REGRESSIOONIKÕVER

Olgu x ja y vaheline seos kirjeldatav ruutseosega

$$y = ax^2 + bx + c.$$

Leiame kordajad a , b ja c vähimruutude meetodi abil analoogselt lineaarse regressiooniga

$$u = [y_1 - (ax_1^2 + bx_1 + c)]^2 + [y_2 - (ax_2^2 + bx_2 + c)]^2 + \dots + [y_n - (ax_n^2 + bx_n + c)]^2,$$

$$u = \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)]^2, \quad u = u(a, b, c),$$

$$\frac{\partial u}{\partial a} = 2[y_1 - (ax_1^2 + bx_1 + c)] \cdot (-x_1^2) + 2[y_2 - (ax_2^2 + bx_2 + c)] \cdot (-x_2^2) + \dots \\ + 2[y_n - (ax_n^2 + bx_n + c)] \cdot (-x_n^2),$$

$$\frac{\partial u}{\partial b} = 2[y_1 - (ax_1^2 + bx_1 + c)] \cdot (-x_1) + 2[y_2 - (ax_2^2 + bx_2 + c)] \cdot (-x_2) + \dots \\ + 2[y_n - (ax_n^2 + bx_n + c)] \cdot (-x_n),$$

$$\frac{\partial u}{\partial c} = 2[y_1 - (ax_1^2 + bx_1 + c)] \cdot (-1) + 2[y_2 - (ax_2^2 + bx_2 + c)] \cdot (-1) + \dots \\ + 2[y_n - (ax_n^2 + bx_n + c)] \cdot (-1).$$

Kokkuvõttes saame süsteemi

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial a} = \sum_{i=1}^n 2[y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)] \cdot (-x_i^2), \\ \frac{\partial u}{\partial b} = \sum_{i=1}^n 2[y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)] \cdot (-x_i), \\ \frac{\partial u}{\partial c} = \sum_{i=1}^n 2[y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)] \cdot (-1). \end{cases}$$

Funktsiooni $u = u(a, b, c)$ miinimumi tarvilikud tingimused on:

$$\frac{\partial u}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial b} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial c} = 0.$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n 2[-y_i x_i^2 + ax_i^4 + bx_i^3 + cx_i^2] = 0, \\ \sum_{i=1}^n 2[-y_i x_i + ax_i^3 + bx_i^2 + cx_i] = 0, \\ \sum_{i=1}^n 2[-y_i + ax_i^2 + bx_i + c] = 0. \end{cases}$$

Süsteem kordajate leidmiseks:

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^4 + b \sum_{i=1}^n x_i^3 + c \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i, \\ a \sum_{i=1}^n x_i^3 + b \sum_{i=1}^n x_i^2 + c \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i + c \cdot n = \sum_{i=1}^n y_i. \end{cases}$$

Piisavus

$$\frac{\partial^2 u}{\partial a^2} = 2x_1^4 + 2x_2^4 + \dots + 2x_n^4 = 2 \sum_{i=1}^n x_i^4 > 0 \Rightarrow \min,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial b^2} = 2x_1^2 + 2x_2^2 + \dots + 2x_n^2 = 2 \sum_{i=1}^n x_i^2,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial c^2} = 2 + 2 + \dots + 2 = 2n,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial a \partial b} = 2(x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_n^3) = 2 \sum_{i=1}^n x_i^3,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial a \partial c} = 2(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) = 2 \sum_{i=1}^n x_i^2,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial b \partial c} = 2(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = 2 \sum_{i=1}^n x_i.$$

EKSPONENTSIAALNE SÕLTUVUS

Otsime valemit kujul

$$y = ab^x,$$

otsitavateks on parameetrid a ja b . Logaritmime ja kasutame logaritmi omadusi:

$$\log y = \log(a \cdot b^x),$$

$$\log y = \log a + x \log b.$$

Näeme, et $\log y$ sõltub argumentidest x lineaarselt. Leiame parameetrid kujul $\log a$, $\log b$

$$u = [\log y_1 - (x_1 \log b + \log a)]^2 +$$

$$+ [\log y_2 - (x_2 \log b + \log a)]^2 + \dots + [\log y_n - (x_n \log b + \log a)]^2,$$

$$u = \sum_{i=1}^n [\log y_i - (x_i \log b + \log a)]^2,$$

$$u = u(\log a, \log b).$$

Miinimumi tarvilikud tingimused

$$\frac{\partial u}{\partial(\log a)} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial(\log b)} = 0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial(\log a)} = \sum_{i=1}^n 2[\log y_i - (x_i \log b + \log a)] \cdot (-1),$$

$$\frac{\partial u}{\partial(\log b)} = \sum_{i=1}^n 2[\log y_i - (x_i \log b + \log a)] \cdot (-x_i),$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i \log b + n \cdot \log a & = \sum_{i=1}^n \log y_i, \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 \log b + \sum_{i=1}^n x_i \cdot \log a & = \sum_{i=1}^n x_i \log y_i, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log b \sum_{i=1}^n x_i + n \cdot \log a & = \sum_{i=1}^n \log y_i, \\ \log b \sum_{i=1}^n x_i^2 + \log a \sum_{i=1}^n x_i & = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \log y_i. \end{cases}$$

Siit saab leida **log a** ja **log b**, nendest avaldada otsitavad **a** ja **b**.

Piisavus

$$\frac{\partial^2 u}{\partial(\log a)^2} = 2n, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial(\log b)^2} = 2 \sum_{i=1}^n x_i^2,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial(\log a) \partial(\log b)} = 2 \sum_{i=1}^n x_i,$$

$$W = 2 \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot 2n - \left(2 \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = 4n \sum_{i=1}^n x_i^2 - 4 \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 > 0.$$

Schwartz'i-Bunjakowski võrratus

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n \mu_i^2 \geq \sum_{i=1}^n (\gamma_i \cdot \mu_i)^2, \quad (\gamma_i = x_i; \mu_i = 1).$$

Näide 3.19. Katse tulemusel saadi järgmised x ja y väärtused:

x	-3	-1	1	3
y	1	2	2	3

Leida sirge võrrand, mis väljendaks sõltuvust $y = ax + b$. Saadud seose põhjal prognoosida $y(2)$.


Arvutuste lihtsustamiseks on mõistlik paigutada lähteandmed koos tehetega tabelisse.

	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
	-3	1	9	-3
	-1	2	1	-2
	1	2	1	2
	3	3	9	9
Summa	0	8	20	6
	$\sum_{i=1}^n x_i$	$\sum_{i=1}^n y_i$	$\sum_{i=1}^n x_i^2$	$\sum_{i=1}^n x_i y_i$

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot n = \sum_{i=1}^n y_i. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 20a + 0b = 6, \\ 0a + 4b = 8. \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0,3, \\ b = \frac{8}{4} = 2. \end{cases}$$



Regressioonisirge võrrand on $y = 0,3x + 2$. Argumendi väärtuse 2 korral prognoositav väärtus on

$$y(2) = 0,3 \cdot 2 + 2 = 2,6.$$

Arvutused on lihtsalt teostatavad näiteks Microsoft Exceli tabelarvutusprogrammi kasutades, pannes paika esimesed valemid ja kopeerides valemid kõigi argumendi väärtuste jaoks. Graafikule saab lisada regressioonisirge, kui valida **Scatter** tüüpi graafik (ainult punktid) ja parema hiireklahviga katseandmete peal valides avanevast rippmenüüst **Add Trendline**. Samas on Excelis olemas funktsioonid regressioonisirge kordajate a ja b arvutamiseks, need on vastavalt $slope(x, y)$ ja $intercept(x, y)$, kus argumentide x ja y asemele tuleb märkida piirkond vastavate argumentide arvuliste väärtuste asukohaga.

Täpselt samal kujul on olemas funktsioonid ka näiteks inseneriprogrammis *Mathcad 15.0* või *Mathcad Prime 2.0*, mis lisaks MS Exceli võimalustele lubab teha integraal- ja diferentsiaalarvutust, sümbolarvutust, lahendada võrrandeid, võrrandisüsteeme ja diferentsiaalvõrrandeid, lisaks teha kolmedimensionaalseid graafikuid pindadest ning koostada animatsioone.

3.8. LIITFUNKTSIOONI TULETIS. TÄISTULETIS

Olgu antud funktsioon $z = F(u, v)$, kus u ja v on sõltumatute muutujate x ja y funktsioonid: $u = \varphi(x, y)$, $v = \omega(x, y)$. Sellisel juhul on z argumentide x ja y liitfunktsioon. Funktsiooni z võib avaldada ka vahetult x ja y kaudu

$$z = F(\varphi(x, y), \omega(x, y)) \quad (3.24)$$

Näide 3.20. Näide liitfunktsiooni kohta: $z = u^3 v^3 + u + 1$, $u = x^2 + y^2$, $v = e^{x+y} + 1$.

$$z = (x^2 + y^2)^3 (e^{x+y} + 1)^3 + x^2 + y^2 + 1.$$

Liitfunktsiooni osatuletise valemi tuletamine.

Eeldame, et funktsioonide $z = F(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \omega(x, y)$ osatuletised argumentide järgi on pidevad. Püüame leida osatuletised mitte kasutades võrrandit (3.24). Anname argumentidele x muudu Δx , jättes y väärtuse muutumatuks. Siis funktsioonid u ja v saavad muudu $\Delta_x u$, $\Delta_x v$ ja ka funktsioon $z = F(u, v)$ saab muudu Δz .

$$\Delta z = \frac{\partial F}{\partial u} \Delta_x u + \frac{\partial F}{\partial v} \Delta_x v + \gamma_1 \Delta_x u + \gamma_2 \Delta_x v, \quad | : \Delta x$$

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\Delta_x v}{\Delta x} + \gamma_1 \frac{\Delta_x u}{\Delta x} + \gamma_2 \frac{\Delta_x v}{\Delta x}.$$

Leiame piirväärtuse, kui $\Delta x \rightarrow 0$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial x}, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x v}{\Delta x} = \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \gamma_1 = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \gamma_2 = 0.$$

Järelikult

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}.$$

Andes argumendile y muudu Δy ja jättes x muutumatuks, võib analoogiliselt leida

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}.$$

Näide 3.21. Leida osatuletised funktsioonile $z = \ln(u^2 + v)$, $u = e^{x+y^2}$, $v = x^2 + y$.

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{2u}{u^2 + v}, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = e^{x+y^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2ye^{x+y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{1}{u^2 + v}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 1.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2ue^{x+y^2}}{u^2 + v} + \frac{2x}{u^2 + v} = \frac{2}{u^2 + v}(u^2 + x),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{2u2ye^{x+y^2}}{u^2 + v} + \frac{1}{u^2 + v} = \frac{1}{u^2 + v}(4u^2y + 1).$$

Näide 3.22. Leida osatuletised funktsioonile

$$z = \sin(u^2 + v^3), \quad u = e^{2x}, \quad v = \ln x.$$

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \cos(u^2 + v^3) \cdot 2u, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = 2e^{2x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \cos(u^2 + v^3) \cdot 3v^2, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{x}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \cos(u^2 + v^3) \cdot 2u \cdot 2e^{2x} + \cos(u^2 + v^3) \cdot 3v^2 \cdot \frac{1}{x} = \cos(u^2 + v^3) \left(4u^2 + \frac{3v^2}{x} \right).$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \cos(u^2 + v^3) \cdot 2u \cdot 0 + \cos(u^2 + v^3) \cdot 3v^2 \cdot 0 = 0.$$

Saadud valemeid võib üldistada suurema arvu muutujate juhule. Olgu

$$w = F(z, u, v, s),$$

kus z, u, v ja s on sõltumatute muutujate x ja y funktsioonid

$$z = z(x, y), u = u(x, y), v = v(x, y), s = s(x, y)$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial x} &= \frac{\partial w}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial s} \cdot \frac{\partial s}{\partial x}, \\ \frac{\partial w}{\partial y} &= \frac{\partial w}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial s} \cdot \frac{\partial s}{\partial y}.\end{aligned}$$

Olgu antud funktsioon

$$z = F(x, y, u, v),$$

kus $y = y(x)$, $u = u(x)$, $v = v(x)$, siis z on tegelikult ühe muutuja x funktsioon ja leiame tema tuletise x järgi

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial x}{\partial x} = 1.$$

Saame **liitfunktsiooni täistuletise** valemi

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}.$$

Erijuhul, kui funktsioon $u = f(x, y, z)$ muutub ajas, ehk $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, siis funktsiooni täistuletis avaldub kujul

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dt}.$$

Näide 3.23. Leida osatuletised funktsioonile $z = x^2 + \sqrt{y}$, $y = \sin x$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}}, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = \cos x,$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} = 2x + \frac{1}{2\sqrt{y}} \cos x = 2x + \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}.$$

3.8.1. LIITFUNKTSIOONI TÄISDIFERENTSIAAL

Vaatame funktsiooni $z = F(u, v)$, kus $u = \varphi(x, y)$, $v = \omega(x, y)$. Arvutame täisdiferentsiaali

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

Asendame siia vastavad liitfunktsioonide osatuletised

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial F}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, & \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial F}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}, \\ dz &= \left(\frac{\partial F}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial F}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) dy, \\ dz &= \frac{\partial F}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) + \frac{\partial F}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right), \\ dz &= \frac{\partial F}{\partial u} du + \frac{\partial F}{\partial v} dv, & dz &= \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv.\end{aligned}$$

Mitme muutuja funktsiooni esimest järku täisdiferentsiaali avaldis on invariantne ehk ei olene sellest, kas u ja v on sõltumatud muutujad või funktsioonid.

Näide 3.19. Leida liitfunktsiooni täisdiferentsiaal

$$z = u^2v^3, \quad u = x^2 \sin y, \quad v = x^3e^y.$$

Kuna

$$\frac{\partial z}{\partial u} = 2uv^3, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = u^23v^2,$$

siis

$$dz = 2uv^3 du + 3u^2v^2 dv.$$

Et

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x \sin y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x^2 \cos y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 3x^2e^y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = x^3e^y,$$

siis

$$du = 2x \sin y dx + x^2 \cos y dy,$$

$$dv = 3x^2e^y dx + x^3e^y dy.$$

$$\begin{aligned} dz &= 2uv^3(2x \sin y dx + x^2 \cos y dy) + 3u^2v^2(3x^2e^y dx + x^3e^y dy) = \\ &= (4uv^3x \sin y + 9u^2v^2x^2e^y)dx + (2uv^3x^2 \cos y + 3u^2v^2x^3e^y)dy = \\ &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy. \end{aligned}$$

3.9. ILMUTAMATA FUNKTSIOONI TULETIS

Väljendagu suuruste x ja y vahelist sõltuvust võrrand $F(x, y) = 0$.

Teoreem 3.7. Kui pidev funktsioon y on antud *ilmutamata kujul* võrrandiga

$$F(x, y) = 0$$

ja $F(x, y)$, F'_x , F'_y on pidevad punktis (x, y) ja $F'_y(x, y) \neq 0$, siis funktsiooni y tuletis vaadeldavas punktis on

$$y'_x = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}.$$

Tõestus. Anname sõltumatule muutujale x muudu Δx . Siis funktsioon y saab muudu Δy ehk argumenti väärtusele $x + \Delta x$ vastab funktsiooni väärtus $y + \Delta y$. Seetõttu

$$F(x + \Delta x, y + \Delta y) = 0.$$

Järelikult ka

$$F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) = 0.$$

See on kahe muutuja funktsiooni täismuut

$$F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) = \frac{\partial F}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial F}{\partial y} \Delta y + y_1 \Delta x + y_2 \Delta y.$$

Kuna võrrandi vasak pool võrdub nulliga, järelikult on null ka parem pool

$$\frac{\partial F}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial F}{\partial y} \Delta y + y_1 \Delta x + y_2 \Delta y = 0, \quad | : \Delta x$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\Delta y}{\Delta x} + y_1 + y_2 \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0.$$

Avaldame sellest suhte $\Delta y / \Delta x$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x} + y_1}{\frac{\partial F}{\partial y} + y_2}$$

Leiame piirväärtuse, kui argument $\Delta x \rightarrow 0$. Siis ka $y_1 \rightarrow 0$, $y_2 \rightarrow 0$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} \Rightarrow y'_x = -\frac{F'_x}{F'_y}.$$

Me ei tea funktsiooni ilmutatud kuju $y = f(x)$, aga oskame leida y tuletist. \square

Näide 3.20. Leida funktsiooni $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ tuletis.

Saame, et

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y, \quad y'_x = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}.$$

Teine võimalus tuletise arvutamiseks on arvestada, et funktsioon y sõltub argumentidest x , tuletise leidmiseks kasutame liitfunktsiooni tuletise reeglit.

$$2x + 2y \cdot y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}.$$

Näide 3.21. Leida funktsiooni $e^y - e^x + xy = 0$ tuletis.

Kuna

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -e^x + y, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = e^y + x,$$

siis

$$y'_x = -\frac{-e^x + y}{e^y + x} = \frac{e^x - y}{e^y + x}.$$

Nüüd

$$e^y \cdot y' - e^x + y + xy' = 0,$$

mistõttu

$$y' \cdot (e^y + x) = e^x - y \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{e^x - y}{e^y + x}.$$


3.10. NIVOOJONED, NIVOOPINNAD. TULETIS ANTUD SUUNAS

Kahe muutuja funktsiooni graafiku joonestamisel on abiks selle lõiked tasanditega, mis on risti ühega kolmest koordinaatteljest (paralleelne ühega koordinaattasanditest). Koordinaattasandite võrrandid on järgmised: yz -tasandi võrrand on $x = 0$, xz -tasandi võrrand on $y = 0$, xy -tasandi võrrand on $z = 0$.

Tasand $x = a$ on x -teljega risti, yz -tasandiga paralleelne.


Tasand $y = b$ on y -teljega risti, xz -tasandiga paralleelne.

Tasand $z = c$ on z -teljega risti, xy -tasandiga paralleelne.



Definitsioon 3.25. Pinna $z = f(x, y)$ **nivoojoonteks** (tasandilõigeteks tasanditega $z = C$ erinevate C väärtuste korral) nimetatakse **jooni** $z = f(x, y) = C$.

Näide 3.22. Joonestada pinna $z^2 = x^2 + y^2$ nivoojooned, mis tekivad pinna lõikamisel tasanditega $z = 0$, $z = 1$, $z = -1$ ja $z = 2$, $z = -2$ ning lõiget tasandiga $x = 0$.



Olgu ruumi mingis piirkonnas D defineeritud funktsioon $u = u(x, y, z)$. Sel juhul öeldakse, et piirkonnas D on antud **skalaarne väli**. Kui $u = u(x, y, z)$ tähendab näiteks temperatuuri punktis $M(x, y, z)$, siis öeldakse, et on antud **temperatuuriväli**. Kui piirkond D on täidetud vedeliku või gaasiga ja $u = u(x, y, z)$ tähendab rõhku punktis $M(x, y, z)$, siis on tegemist rõhuväljaga. Vaatleme piirkonna D punkte, kus funktsioonil $u = u(x, y, z)$ on konstantne väärtus C

$$u = u(x, y, z) = C.$$

Need punktid moodustavad mingisuguse pinna. Kui võtame konstandile C teise väärtuse, saame teise pinna. Neid pindu nimetatakse **nivoopindadeks**.

Definitsioon 3.26. **Vektori suunakoosinusteks** nimetatakse nende nurkade koosinusi, mis vektor moodustab koordinaattelgede positiivsete suundadega. Tähistame $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$.


$$\vec{i} = (1, 0, 0), \quad |\vec{i}| = 1, \quad \vec{j} = (0, 1, 0), \quad |\vec{j}| = 1, \quad \vec{k} = (0, 0, 1), \quad |\vec{k}| = 1.$$

Kui leiame skalaarkorrutise vektorist $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ ja ühikvektorist $\vec{i} = (1, 0, 0)$, saame

$$\vec{a} \cdot \vec{i} = x_1 \cdot 1 + y_1 \cdot 0 + z_1 \cdot 0 = x_1.$$

Skalaarkorrutis on avaldatav ka järgmiselt:

$$\vec{a} \cdot \vec{i} = |\vec{a}| |\vec{i}| \cos \alpha, \quad \cos \alpha = \frac{x_1}{|\vec{a}|}.$$



Analoogiliselt saame leida suunakoosinused

$$\cos \beta = \frac{y_1}{|\vec{a}|}, \quad \cos \gamma = \frac{z_1}{|\vec{a}|}.$$

Tõstame kõik suunakoosinused ruutu ja liidame kokku

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{x_1^2}{|\vec{a}|^2} + \frac{y_1^2}{|\vec{a}|^2} + \frac{z_1^2}{|\vec{a}|^2} = \frac{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}{|\vec{a}|^2}.$$

Et

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2},$$

siis

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

Olgu vektor \vec{e} vektoriga \vec{a} kollineaarne ühikvektor, siis $|\vec{e}| = 1$.

$$\vec{e} = \left(\frac{x_1}{|\vec{a}|}, \frac{y_1}{|\vec{a}|}, \frac{z_1}{|\vec{a}|} \right) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

$$\vec{a} = (x_1, y_1, z_1), \quad |\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2},$$

$$\cos \alpha = \frac{x_1}{|\vec{a}|}, \quad \cos \beta = \frac{y_1}{|\vec{a}|}, \quad \cos \gamma = \frac{z_1}{|\vec{a}|}.$$

TULETIS ANTUD SUUNAS

Vaatleme piirkonnas D funktsiooni $u = u(x, y, z)$ ja punkti $M(x, y, z)$. Rakendame punktis M vektori \vec{s} , mille suunakoosinused on $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$. Võtame vektoril \vec{s} punkti $M_1(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z)$, mille kaugus vektori alguspunktist on Δs . Seega

$$\Delta s = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}, \quad \overrightarrow{MM_1} = (\Delta x, \Delta y, \Delta z).$$


Eeldame, et funktsioon u ja tema osatuletised kõikide argumentide järgi on piirkonnas D pidevad. Funktsiooni täismuut esitub kujul

$$\Delta u = \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial u}{\partial z} \Delta z + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y + \varepsilon_3 \Delta z,$$

kus $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rightarrow 0$, kui $\Delta s \rightarrow 0$.

Jagame võrduse kõik liikmed suurusega Δs :

$$\frac{\Delta u}{\Delta s} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\Delta x}{\Delta s} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\Delta y}{\Delta s} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\Delta z}{\Delta s} + \varepsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta s} + \varepsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta s} + \varepsilon_3 \frac{\Delta z}{\Delta s},$$



$$\frac{\Delta x}{\Delta s} = \cos \alpha, \quad \frac{\Delta y}{\Delta s} = \cos \beta, \quad \frac{\Delta z}{\Delta s} = \cos \gamma.$$

Järelikult

$$\frac{\Delta u}{\Delta s} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma + \varepsilon_1 \cos \alpha + \varepsilon_2 \cos \beta + \varepsilon_3 \cos \gamma.$$

Definitsioon 3.27. Funktsiooni $u = (x, y, z)$ tuletiseks punktis (x, y, z) vektori \vec{s} suunas nimetatakse suhte $\Delta u / \Delta s$ piirväärtust, kui $\Delta s \rightarrow 0$ ja tähistatakse $\partial u / \partial s$

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta s}.$$

Leiame piirväärtuse

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta s} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma.$$

Teades osatuletisi, on lihtne leida tuletist suunas \vec{s} .

Näide 3.23. Leida funktsiooni u tuletis suunas s , kui on teada suunavektori nurkad koordinaattelgedega

$$\alpha = 0, \quad \beta = \frac{\pi}{2}, \quad \gamma = \frac{\pi}{2}.$$

Kuna koosinused antud nurkadest on

$$\cos 0 = 1, \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0,$$

siis funktsiooni u tuletis suunas s avaldub

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos 0 + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \frac{\pi}{2} + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \frac{\pi}{2} = \frac{\partial u}{\partial x}.$$

Näide 3.24. Olgu antud funktsioon $u = x^2 + y^2 + z^2$. Leida tuletis $\partial u / \partial s$ punktis $M(1, 1, 1)$ vektori $\vec{s} = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ suunas.

Vektor $\vec{s} = (2; 1; 3)$. Leiame suunakoosinused, siis osatuletised ja asendame

valemisse.

$$\begin{aligned}
 |\vec{s}| &= \sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{14}, \\
 \cos \alpha &= \frac{2}{\sqrt{14}}, \quad \cos \beta = \frac{1}{\sqrt{14}}, \quad \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{14}}. \\
 \frac{\partial u}{\partial s} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{2}{\sqrt{14}} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{1}{\sqrt{14}} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{3}{\sqrt{14}}. \\
 \frac{\partial u}{\partial x} &= 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 2z, \\
 \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_M &= 2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_M = 2, \quad \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_M = 2. \\
 \frac{\partial u}{\partial s} &= 2 \frac{2}{\sqrt{14}} + 2 \frac{1}{\sqrt{14}} + 2 \frac{3}{\sqrt{14}} = \frac{12}{\sqrt{14}}.
 \end{aligned}$$

3.11. GRADIENT

Vaatleme funktsiooni $u = u(x, y, z)$ määramispiirkonna D igas punktis vektorit, mille projektsioonideks koordinaattelgedel on selle funktsiooni osatuletiste $\partial u / \partial x, \partial u / \partial y, \partial u / \partial z$ väärtused selles punktis.


Definitsioon 3.28. **Gradiendiks** nimetatakse vektorit

$$\text{grad } u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}.$$

Gradiendi tähistatakse ka $\nabla f(x, y)$. Ütleme, et piirkonnas D on määratud gradiendi vektorväli.

Omadused.

1. Gradient on igas punktis risti pinna nivoojoontega.
2. Gradient on vektor, mis näitab pinna kiireima tõusu suunda, gradiendi vastandvektor näitab kiireima languse suunda.
3. Gradiendiks oleva vektori pikkus näitab suurimat tõusu.



$$\begin{aligned} \theta &= 1.57 & f(a) &= 6.01 & D_u f(a) &= 0 \\ \vec{u} &= (-0.08, 1.00) & \nabla f(a) &= (-2.25, 0.17) \\ \vec{a} &= (6.4, -0.3) & \|\nabla f(a)\| &= 2.26 \end{aligned}$$

Algmaterjal: https://mathinsight.org/applet/gradient_directional_derivative_mountain

Teoreem 3.8. Kui on antud skalaarne väli $u = u(x, y, z)$ ja selle skalaarse välja gradientväli

$$\text{grad } u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k},$$


siis tuletis $\partial u / \partial s$ vektori \vec{s} suunas võrdub vektori $\text{grad } u$ projektsiooniga vektoril \vec{s} :

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \vec{s}_0 \cdot \text{grad } u, \quad \text{pr}_{\vec{s}} \text{grad } u = \frac{\partial u}{\partial s} \vec{s}.$$

Piltlikult saame esitada nii: vaatame sfääri, millele $\text{grad } u$ on diameetrik. Raken-dame vektori \vec{s} punktis M .

$$MP = |\text{grad } u| \cdot \cos \varphi \implies MP = \frac{\partial u}{\partial s}.$$

Omadused. Tuletis antud punktis vektori \vec{s} suunas on maksimaalne siis, kui vektor \vec{s} on gradiendisuunaline, tuletise maksimaalne väärtus on $|\text{grad } u|$. Tuletis nivoopinna puutuja sihilise vektori suunas võrdub nulliga.



3.12. KÕRGEMAT JÄRKU TÄISDIFERENTSIAAL

Olgu meil funktsioon $z = f(x, y)$. Mitme muutuja funktsiooni täisdiferentsiaali nimetatakse ka esimeseks täisdiferentsiaaliks. Olgu funktsioonid f'_x ja f'_y diferentseeruvad punktis $M(x, y)$. Järelikult f''_{xy}, f''_{yx} on pidevad ja $f''_{xy} = f''_{yx}$. Esimest järku täisdiferentsiaalil on kuju

$$dz = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy,$$

kus dx ja dy vaatleme kui konstantseid kordajaid. Suurus dz on kahe muutuja funktsioon. Leiame tema täisdiferentsiaali.

$$\begin{aligned} d(dz) &= d(f'_x dx + f'_y dy) = (f'_x dx + f'_y dy)'_x + (f'_x dx + f'_y dy)'_y = \\ &= (f''_{xx} dx + f''_{yx} dy) dx + (f''_{xy} dx + f''_{yy} dy) dy = f''_{xx} dx^2 + 2f''_{xy} dx dy + f''_{yy} dy^2. \end{aligned}$$

Saime valemi **teist järku täisdiferentsiaali** jaoks

$$d(dz) = f''_{xx} dx^2 + 2f''_{xy} dx dy + f''_{yy} dy^2.$$

Kolmandat järku täisdiferentsiaali valem

3.13. TAYLORI VALEM MITME MUUTUJA FUNKTSIOONIDE JAOKS

Taylori valem ühe muutuja funktsiooni jaoks on kujul

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x).$$

Olgu antud funktsioon

$$z = f(x, y),$$

mis on määratud mingis piirkonnas S . Eeldame, et punkti $M_0(a, b)$ ümbruses on funktsioonil z pidevad osatuletised kuni järguni $n+1$. Toome sisse abifunktsiooni

$$\varphi(t) = f(x, y),$$

kus

$$x = a + t\Delta x, \quad y = b + t\Delta y, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Kui $t = 0$, siis saame punkti $M_0(a, b)$. Kui $t = 1$, siis saame punkti $M(a + \Delta x, b + \Delta y)$. Asendame ühe muutuja Taylori valemisse funktsiooni $\varphi(t)$ jaoks $a = 0$ korral:

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \frac{\varphi'(0)}{1!}t + \frac{\varphi''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!}t^n + R_n. \quad (3.1)$$

Leiame tuletised

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= f(x, y) = f(a + t\Delta x, b + t\Delta y), \\ \varphi'(t) &= f'_x x'_t + f'_y y'_t = f'_x \Delta x + f'_y \Delta y = df(x, y), \\ \varphi''(t) &= (f'_x x'_t + f'_y y'_t)'_x x'_t + (f'_x x'_t + f'_y y'_t)'_y y'_t = \\ &= f''_{xx} (\Delta x)^2 + f''_{xy} \Delta x \Delta y + f''_{xy} \Delta y \Delta x + f''_{yy} (\Delta y)^2 = \\ &= f''_{xx} (\Delta x)^2 + 2f''_{xy} \Delta x \Delta y + f''_{yy} (\Delta y)^2 = d^2 f(x, y).\end{aligned}$$

Analoogiliselt

$$\varphi'''(t) = d^3 f(x, y), \dots, \varphi^{(n)}(t) = d^n f(x, y).$$

Seega

$$\begin{aligned}\varphi(0) &= f(a, b), \\ \varphi'(0) &= df(a, b), \\ \varphi''(0) &= d^2 f(a, b), \\ &\dots \\ \varphi^{(n)}(0) &= d^n f(a, b).\end{aligned}$$

Asendame võrrandisse (3.1) $t = 1$ korral

$$\begin{aligned}f(x, y) &= f(a, b) + \frac{df(a, b)}{1!} + \frac{d^2 f(a, b)}{2!} + \dots + \frac{d^{(n)} f(a, b)}{n!} + R_n = \\ &= f(a, b) + f'_x(a, b)\Delta x + f'_y(a, b)\Delta y + \frac{1}{2}f''_{xx}(a, b)(\Delta x)^2 + f''_{xy}(a, b)\Delta x\Delta y + \\ &\quad + \frac{1}{2}f''_{yy}(a, b)(\Delta y)^2 + \dots\end{aligned}$$

IV KORDSED INTEGRAALID

4.1. KAHEKORDNE INTEGRAAL


Olgu funktsioon $f(x, y)$ määratud kinnises tõkestatud piirkonnas D . Olgu piirkond D jaotatud n osapiirkonnaks D_i pindaladega ΔS_i ning olgu igas piirkonnas D_i valitud punkt (x_i, y_i) . Moodustame summa

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta S_i.$$

Definitsioon 4.1. Summat I_n nimetatakse funktsiooni $f(x, y)$ integraalsummaks piirkonnas D .

Kui piirkonna igas punktis $f(x, y) \geq 0$, siis integraalsumma kujutab selliste kõversilindrite ruumalade summat, mille põhjapindala on ΔS_i ja kõrgus on funktsiooni väärtus punktis (x_i, y_i) ehk $f(x_i, y_i)$. Osapiirkondadeks jaotamine toimub suvalisel viisil, see tähendab, et igal osapiirkonnal on erinev diameeter d_i . Osapiirkonna diameeter on selle piirkonna suurim punktide vaheline kaugus. Tähistame suurima osapiirkondade diameetri tähega

$$\lambda = \max(d_i).$$



Definitsioon 4.2. Funktsiooni $f(x, y)$ kahekordseks integraaliks üle piirkonna D nimetatakse tema integraalsumma piirväärtust, kui suurim osapiirkondade diameeter $\lambda \rightarrow 0$, kui see piirväärtus eksisteerib ja ei sõltu piirkonna D osadeks jaotamise viisist ega punktide (x_i, y_i) valikust.

$$\iint_D f(x, y) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta S_i$$

Kui eksisteerib lõplik piirväärtus, siis funktsiooni nimetatakse **integreeruvaks** piirkonnas D . Kui funktsioon $f(x, y)$ on pidev kinnises piirkonnas, siis piirväärtus eksisteerib. Piirkonda D nimetatakse integreeruvuspiirkonnaks.


Kõversilinder on ruumiline kujund, mis alt on piiratud piirkonnaga D , ülalt pinnaga $z = f(x, y)$ ja külgedelt püstsilindrilise pinnaga.

Kahekordse integraali geomeetriline tõlgendus. Kahekordne integraal funktsioonist $f(x, y) \geq 0$ üle piirkonna D on võrdne kõverjooonelise silindri ruumalaga, kui silinder on pealt piiratud pinnaga $z = f(x, y)$ ja alt pinnaga D .

$$V = \iint_D f(x, y) \, dx dy$$

Integreerimispiirkonna D pindala avaldub valemiga

$$S = \iint_D dx dy.$$



4.2. KAHEKORDSE INTEGRAALI OMADUSED JA ARVUTAMINE

Kahekordse integraali omadused on analoogilised määratud integraali omadustega.

1. Kui funktsioonid $f(x, y)$ ja $g(x, y)$ on integreeruvad piirkonnas D , siis on integreeruv ka nende summa ja vahe.

$$\iint_D [f(x, y) \pm g(x, y)] \, dS = \iint_D f(x, y) \, dS \pm \iint_D g(x, y) \, dS.$$

Tõestus. Definiitsiooni kohaselt kirjutame.

$$\iint_D [f(x, y) \pm g(x, y)] \, dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [f(x_i, y_i) \pm g(x_i, y_i)] \Delta S_i =$$

Kõigepealt kasutame summa omadust, mille põhjal moodustame summad mõlemast liikmest ja hiljem piirväärtuse omaduse põhjal kirjutame piirväärtuse

summast piirväärtuste summana lahti.

$$\begin{aligned} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \left[\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta S_i \pm \sum_{i=1}^n g(x_i, y_i) \Delta S_i \right] = \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta S_i \pm \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n g(x_i, y_i) \Delta S_i = \end{aligned}$$

Selle tulemusena saime kahekordse integraali definitsiooni põhjal kahe integraali summa (vahe).

$$= \iint_D f(x, y) dS \pm \iint_D g(x, y) dS. \quad \square$$

2. Konstantse kordaja võib tuua integraali märgi ette.

$$\iint_D c \cdot f(x, y) dS = c \iint_D f(x, y) dS$$

Tõestus on sarnane eelmisega.

3. **Adiitiivsus.** Integreerimispiirkonda D võib jaotada osadeks D_1 ja D_2 , millel pole ühiseid sisepunkte: $D = D_1 \cup D_2$.

$$\iint_D f(x, y) dS = \iint_{D_1} f(x, y) dS + \iint_{D_2} f(x, y) dS$$

Tõestus. Definitsiooni kohaselt ei tohi piirväärtus sõltuda osapiirkondadeks jaotamise viisist, seega võime valida üheks jaotuseks piirkondade D_1 ja D_2 ühise rajajoone. Jaotades piirkonda D edasi suvalisel viisil, tekivad piirkondade D_1 ja D_2 suvalised jaotused osapiirkondadeks. Jaotame integraalsumma kaheks liidetavaks. Esimesse liidetavasse võtame need korrutised, mis sisaldavad piirkonna D_1 osapiirkondi, ja teise liidetavasse need korrutised, mis sisaldavad piirkonna D_2 osapiirkondi, tähistame need vastavalt

$$\sum_{D_1} f(x_i, y_i) \Delta S_i, \quad \sum_{D_2} f(x_i, y_i) \Delta S_i.$$

Kui λ on piirkonna D kõigi osapiirkondade suurim diameeter, siis sellest, et $\lambda \rightarrow 0$ järeldeb, et ka piirkondade D_1 ja D_2 osapiirkondade suurimad diameetrid lähenevad nullile. Järelikult, kui võtame võrduse

$$\sum_D f(x_i, y_i) \Delta S_i = \sum_{D_1} f(x_i, y_i) \Delta S_i + \sum_{D_2} f(x_i, y_i) \Delta S_i$$

mõlemalt poolt piirväärtuse suurima diameetri lähenemisel nullile, saame omaduse väite

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_D f(x_i, y_i) \Delta S_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{D_1} f(x_i, y_i) \Delta S_i + \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{D_2} f(x_i, y_i) \Delta S_i,$$

$$\iint_D f(x, y) dS = \iint_{D_1} f(x, y) dS + \iint_{D_2} f(x, y) dS. \quad \square$$

4. **Monotoonsus.** Kui funktsioonid $f(x, y)$ ja $g(x, y)$ on integreeruvad piirkonnas D ja kehtib $f(x, y) \leq g(x, y)$ iga $(x, y) \in D$ korral, siis


$$\iint_D f(x, y) dS \leq \iint_D g(x, y) dS.$$

Kahekordse integraali **arvutamine** lihtsamatel juhtudel taandub kahe määratud integraali arvutamisele. Kui integreerimispiirkond on antud võrratustega

$$D = \{a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\},$$

siis

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right] dx.$$



Kõigepealt leiame sisemise integraali algfunktsiooni

$$F(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy,$$

kus integreerimisel argumenti y järgi käsitletakse argumenti x konstandina. Edasi leiame saadud algfunktsioonist integraali argumenti x järgi


$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b F(x) dx.$$

Kui $D = \{c \leq y \leq d, \varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y)\}$, siis

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left[\int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx \right] dy.$$

Kui integreerimispiirkond D on keerulisema kujuga, kui ülaltoodud lihtsamatel juhtudel, siis jagatakse piirkond lihtsamateks osadeks

$$D = \sum_{k=1}^n D_k.$$




Integraal on sel juhul summa integraalidest üle osapiirkondade

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \sum_{k=1}^n \iint_{D_k} f(x, y) dx dy.$$

Näide 4.1. Arvutada

$$\iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy,$$

kus D on piiratud sirgetega $x = 0, x = 1, y = 0, y = 3/2$.




Saame, et

$$\begin{aligned} \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy &= \int_0^1 \left[\int_0^{\frac{3}{2}} (4 - x^2 - y^2) dy \right] dx = \\ &= \int_0^1 \left[\left(4y - x^2 y - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^{\frac{3}{2}} \right] dx = \\ &= \int_0^1 \left[\left(4 \cdot \frac{3}{2} - x^2 \cdot \frac{3}{2} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3}{2} \right)^3 \right) \right] dx = \\ &= \int_0^1 \left[\left(6 - \frac{3}{2} x^2 - \frac{9}{8} \right) \right] dx = \\ &= \left(\frac{39}{8} x - \frac{3}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{35}{8}. \end{aligned}$$

Näide 4.2. Leida xy -tasandil asetseva kujundi pindala, kui kujund on piiratud joontega $y = x$ ja $y = x^2$.

Saame, et


$$\begin{aligned} S &= \iint_D dx dy = \int_0^1 \left[\int_{x^2}^x dy \right] dx = \int_0^1 y \Big|_{x^2}^x dx = \\ &= \int_0^1 [x - x^2] dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$



Näide 4.3. Vahetada integreerimisjärjekord integraalis

$$\int_0^3 dy \int_y^{6-y} f(x, y) dx.$$

Integreerimispiirkond on määratud järgmiselt: $D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 3, y \leq x \leq 6 - y\}$. Kanname joonisele vastavad sirged. Integreerimisjärjekorra muutmiseks on vaja esitada argument x piirkonnas $[a, b]$ ja argument y funktsioonina argumentidest x . Jooniselt näeme, et argument x muutub lõigus $[0, 6]$ aga argumenti y jaoks saame $0 \leq y \leq \varphi(x)$, kusjuures



$$\varphi(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 3 \\ 6 - x, & 3 < x \leq 6 \end{cases}.$$

Seega peame integreerimispiirkonna jagama kaheks osaks sirgega $x = 3$

$$\int_0^3 dy \int_y^{6-y} f(x, y) dx = \int_0^3 f(x, y) dy + \int_3^6 dx \int_0^{6-x} f(x, y) dy.$$

4.3. MUUTUJA VAHETUS KAHEKORDSES INTEGRAALIS

Kui funktsioonid $x = x(u, v)$ ja $y = y(u, v)$ koos oma esimest järku osatuletistega on mingis uv -tasandi lõplikus kinnises piirkonnas D' pidevad ja määravad

üksühesse vastavuse piirkonna D' ja xy -tasandi piirkonna D punktide vahel ning kui [jakobiaan](#)

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0, \text{ kui } (u, v) \in D'.$$

Siis [muutuja vahetuse valem](#) on

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| du dv.$$

$$|J(u, v)| \cdot |J(x, y)| = 1, \quad |J(u, v)| = \frac{1}{|J(x, y)|}.$$

Näide 4.4. Leida kahekordne integraal funktsioonist

$$f(x, y) = (2x + y - 2)^2,$$

kui integreerimispiirkond on antud valemiga

$$D = \{(x, y) : -1 \leq x - y \leq 1, -1 \leq 2x + y \leq 2\}.$$

Arvutuste lihtsustamiseks teeme järgmise muutuja vahetuse

$$u = x - y, \quad v = 2x + y, \quad (u, v) \in D'.$$

Integreerimispiirkond D' on ristkülik

$$D' = \{(u, v) : -1 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 2\}.$$

Jakobiaan on kujul

$$J(x, y) = \begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3.$$

Järelikult


$$J(u, v) = \frac{1}{J(x, y)} = \frac{1}{3}.$$

Integreeritav funktsioon uutes muutujates on

$$(2x + y - 2)^2 = (v - 2)^2.$$

Oleme saanud kahekordse integraali

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^2 (v - 2)^2 \frac{1}{3} dv du = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 \left. \frac{(v - 2)^3}{3} \right|_{-1}^2 du = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 9 du = \frac{1}{3} (9u) \Big|_{-1}^1 = 6.$$



4.4. KAHEKORDNE INTEGRAAL POLAARKOORDINAATIDES

Polaarkoordinaatide kasutamine on õigustatud siis, kui integreerimispiirkonnaks on ring või selle osa, samuti on teatud joonte (ellips, lemniskaat, kardioid, astroid jne) esitus polaarkoordinaatides lihtsam kui ristkoordinaatides. Üleminekul polaarkoordinaatidele kasutame seoseid

$$\begin{cases} x = \varrho \cos \varphi, \\ y = \varrho \sin \varphi, \end{cases}$$

kus ϱ on polaarraadius ja φ polaarnurk. Muutuja vahetusele vastav jakobiaan on kujul



$$|J(\varrho, \varphi)| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \varrho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial \varrho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\varrho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \varrho \cos \varphi \end{vmatrix} = \varrho \cos^2 \varphi + \varrho \sin^2 \varphi = \varrho.$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} f(\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi) \varrho d\varrho d\varphi.$$

Kui piirkond Δ on antud võrratustega $\Delta = \{(\varphi, \varrho) : \alpha \leq \varphi \leq \beta; \varrho_1(\varphi) \leq \varrho \leq \varrho_2(\varphi)\}$, siis

$$\iint_{\Delta} f(\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi) \varrho d\varrho d\varphi = \int_{\alpha}^{\beta} \left[\int_{\varrho_1(\varphi)}^{\varrho_2(\varphi)} f(\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi) \varrho d\varrho \right] d\varphi.$$

Kui piirkond Δ on antud võrratusega $\Delta = \{(\varphi, \varrho) : a \leq \varrho \leq b; \varphi_1(\varrho) \leq \varphi \leq \varphi_2(\varrho)\}$, siis



$$\iint_{\Delta} f(\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi) \varrho d\varrho d\varphi = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(\varrho)}^{\varphi_2(\varrho)} f(\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi) \varrho d\varphi \right] d\varrho.$$

Näide 4.5. Arvutada kahekordne integraal

$$\iint_D \sqrt[3]{x^2 + y^2} dx dy$$

üleminekuga polaarkoordinaatidele, kui integreerimispiirkond D on antud võrratusega

$$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 1; -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2}\}.$$

Integreerimispiirkonnaks on pool ringi. Polaarkoordinaatides


$$\begin{aligned} x &= \varrho \cos \varphi, \\ y &= \varrho \sin \varphi \end{aligned}$$

ja

$$x^2 + y^2 = \varrho^2 \cos^2 \varphi + \varrho^2 \sin^2 \varphi = \varrho^2.$$

Uueks integreerimispiirkonnaks on $\Delta = \{(\varphi, \varrho) : 0 \leq \varrho \leq 1; 0 \leq \varphi \leq \pi\}$.

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt[3]{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^\pi \left[\int_0^1 \sqrt[3]{\varrho^2} \varrho d\varrho \right] d\varphi = \int_0^\pi \left[\int_0^1 \varrho^{5/3} d\varrho \right] d\varphi = \\ &= \int_0^\pi \left[\frac{\varrho^{8/3}}{8/3} \right]_0^1 d\varphi = \int_0^\pi \frac{3}{8} d\varphi = \frac{3\pi}{8}. \end{aligned}$$



Näide 4.6. Arvutada kahekordne integraal

$$\iint_D (x^2 + 2xy) dx dy$$

üleminekuga polaarkoordinaatidele, kui integreerimispiirkond D on antud võrratusega

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\}.$$

Integreerimispiirkonnaks on veerand ringi. Polaarkoordinaatides

$$x^2 + 2xy = \varrho^2 \cos^2 \varphi + 2\varrho^2 \sin \varphi \cos \varphi.$$

Uueks integreerimispiirkonnaks on

$$\Delta = \{(\varphi, \varrho) : 0 \leq \varrho \leq 1; 0 \leq \varphi \leq \pi/2\}.$$

Polaarkoordinaatides saame integraali arvutada järgmiselt


$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + 2xy) dx dy &= \int_0^1 \left[\int_0^{\pi/2} (\varrho^2 \cos^2 \varphi + 2\varrho^2 \sin \varphi \cos \varphi) \varrho d\varphi \right] d\varrho = \\ &= \int_0^1 \left[\int_0^{\pi/2} \varrho^3 (\cos^2 \varphi + 2 \sin \varphi \cos \varphi) d\varphi \right] d\varrho = \\ &= \int_0^1 \left[\int_0^{\pi/2} \varrho^3 \left(\frac{1}{2}(1 + \cos 2\varphi) + \sin 2\varphi \right) d\varphi \right] d\varrho = \\ &= \int_0^1 \varrho^3 \left(\frac{1}{2}(\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi) - \frac{1}{2} \cos 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi/2} d\varrho = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \varrho^3 \left(\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi - \cos 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi/2} d\varrho = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \varrho^3 \left(\frac{\pi}{2} + 2 \right) d\varrho = \frac{\varrho^4}{4} \left(\frac{\pi}{4} + 1 \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi + 4}{16}. \end{aligned}$$

Vaatame nüüd polaarkoordinaatidele üleminekut natuke keerukama integreerimispiirkonna jaoks. Kui integreerimispiirkond asub väljaspool ringi raadiusega

$$\varrho = 1$$

ja seespool kardioidi

$$\varrho = 1 + \cos \varphi$$



(joonis), siis integreerimispiirkonna sisemine polaarraadius on ringjoon raadiusega 1. Välimine raadius on aga antud seosega $1 + \cos \varphi$, kokkuvõttes raadius muutub piirkonnas

$$1 \leq \varrho \leq 1 + \cos \varphi.$$

Polaarnurga jaoks vaatame piirkonna alumist punkti, kus nurk on võrdne $-\pi/2$ ja ülemist punkti, kus nurk on võrdne $\pi/2$. Seega muutub polaarnurk piirkonnas

$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$

Integreerimisrajad kahekordses integraalis on

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_1^{1+\cos\varphi} f(\varrho, \varphi) \varrho d\varrho.$$

Kui funktsioon $f(\varrho, \varphi) = 1$, siis kahekordne integraal annab integreerimispiirkonna pindala.

4.5. KAHEKORDSE INTEGRAALI RAKENDUSED

Tasandilise kujundi mass.

Olgu aine mass Δm piirkonna D osapiirkonnas ΔS . See tähendab, et piirkond D on kaetud mingi ainega nii, et piirkonna iga osapiirkonna pindala ΔS jaoks tuleb teatud hulk Δm seda ainet. Suhet $\Delta m/\Delta S$ nimetatakse aine keskmiseks pindtiheduseks (mass pindalaühiku kohta). Osapiirkonna suuruse vähendamisel punktiks piirväärtuse kaudu, saame defineerida aine pindtiheduse.

Aine pindtihedus punktis $P(x, y)$ on piirväärtus keskmisest pindtihedusest

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta S} = \varrho(x, y).$$

Olgu tasandilise kujundi pindtihedus antud pideva funktsiooniga $\varrho(x, y)$, kus $(x, y) \in D$. **Tasandilise kujundi** D mass avaldub siis kahekordse integraalina üle piirkonnas D :

$$m_D = \iint_D \varrho(x, y) dx dy.$$

Näide 4.7. Määrata ümmarguse plaadi mass, kui plaadi raadius on 4 ja aine pindtihedus plaadi igas punktis on võrdne selle punkti kaugusega plaadi keskpunktist.

Pindtihedus kauguse kaudu ja integreerimispiirkond avalduvad järgmiselt

$$\varrho(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4^2\}.$$

Kuna tegemist on ringjoonega, siis läheme üle polaarkoordinaatidele. Polaarradiust tähistame tähega r , et pindtihedusega mitte segi ajada. Integreerimispiirkond polaarkoordinaatides

$$D = \{(r, \varphi) : 0 \leq r \leq 4, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\},$$

pindtihedus avaldub polaarkoordinaatides järgmiselt

$$\varrho(x, y) = \sqrt{r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi} = r, \quad J(r, \varphi) = r.$$

Seega plaadi mass on

$$m = \iint_D \varrho(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^4 r^2 dr d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{r^3}{3} \Big|_0^4 d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{64}{3} d\varphi = \frac{64}{3} \varphi \Big|_0^{2\pi} = \frac{128}{3} \pi.$$

Tasandilise kujundi inertsimoment. Masspunkti M inertsimoment punkti O suhtes $I_0 = mr^2$, kus m on mass ja r punktide O ja M vaheline kaugus.

Inertsimoment koordinaattelgedele ja koordinaatide alguspunkti suhtes homogeense piirkonna jaoks, kus pindtihedus on kõikjal 1, avaldub järgmiste valemitega

$$I_x = \iint_D y^2 dx dy; \quad I_y = \iint_D x^2 dx dy,$$

$$I_0 = I_x + I_y = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy.$$

Mittehomogeense materjali korral tuleb korrutada vastav avaldis pindtihedusega

$$I_x = \iint_D \varrho(x, y) y^2 dx dy; \quad I_y = \iint_D \varrho(x, y) x^2 dx dy,$$

$$I_0 = \iint_D \varrho(x, y) (x^2 + y^2) dx dy.$$

Näide 4.8. Arvutada joontega $y^2 = 1 - x$, $x = 0$, $y = 0$ piiratud tasandilise kujundi inertsimoment y telje suhtes, kui pindtihedus igas punktis võrdub selle punkti ordinaadiga y .

$$I_y = \iint_D yx^2 dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^{\sqrt{1-x}} yx^2 dy \right) dx = \int_0^1 \frac{x^2 y^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{1-x}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 (1-x) dx =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{24}.$$

Tasandilise kujundi massikeske. Kui tasandilise kujundi D pindtihedus on $\rho(x, y)$, siis tasandilise kujundi massikeskme (x_c, y_c) koordinaadid saab arvutada valemitest

$$\begin{cases} x_c = \frac{1}{m_D} \iint_D x \rho(x, y) dx dy \\ y_c = \frac{1}{m_D} \iint_D y \rho(x, y) dx dy \end{cases}$$

Avaldisi

$$M_y = \iint_D x \rho(x, y) dx dy, \quad M_x = \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

nimetatakse tasandilise kujundi **staatilisteks momentideks** vastavalt y ja x telje suhtes.

4.6. KOLMEKORDNE INTEGRAAL

Olgu ruumis antud mingi piirkond V , mis on piiratud kinnise pinnaga S . Oletame, et selles piirkonnas V ja pinnal S on defineeritud mingi pidev funktsioon $f(x, y, z)$. Olgu piirkond V jaotatud n osapiirkonnaks V_i ruumaladega ΔV_i . Valime igas osapiirkonnas mingi punkti P_i ja tähistame $f(P_i)$ funktsiooni f väärtust selles punktis. Moodustame integraalsumma


$$\sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta V_i.$$

Suurendame osapiirkondade arvu nii, et nende suurim läbimõõt läheneks nullile. Tähistame suurima osapiirkondade läbimõõdu

$$\lambda = \max(d_i).$$

Definitsioon 4.3. Piirväärtust, mis ei sõltu piirkonna V jaotusviisist ja punktide P_i valikust, nimetatakse **kolmekordseks integraaliks**

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_V f(P) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta V_i.$$



Kui integreerimispiirkond V on alt piiratud pinnaga

$$z = \psi_1(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

ja ülalt pinnaga

$$z = \psi_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}),$$

kusjuures nendel pindadel on z -teljega paralleelsete sirgetega ainult üks ühine punkt, ja kui piirkonna V projektsioon xy -tasandil rahuldab kahekordse integraali integreerimispiirkonna kõiki tingimusi, kusjuures

$$a \leq x \leq b, \quad \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x),$$

siis on kolmekordne integraal avaldatav kujul

$$\iiint_V \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, z) \, dx \, dy \, dz = \int_a^b \left[\int_{\varphi_2(x)}^{\varphi_1(x)} \left[\int_{\psi_2(\mathbf{x}, \mathbf{y})}^{\psi_1(\mathbf{x}, \mathbf{y})} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, z) \, dz \right] dy \right] dx.$$

Kolmekordse integraali **arvutamiseks** vaadeldakse algul muutujaid x ja y konstantidena ja avaldatakse määratud integreerimismuutuja z järgi, siis arvutatakse kahekordne integraal.

$$\int_{\psi_1(\mathbf{x}, \mathbf{y})}^{\psi_2(\mathbf{x}, \mathbf{y})} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, z) \, dz = F(\mathbf{x}, \mathbf{y}); \quad \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} F(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, dy \right] dx.$$

Kui kahekordse integraali korral on võimalik kasutada kahte erinevat integreerimisjärjekorda, siis kolmekordse integraali korral on erinevaid integreerimisjärjekordi 6.

Näide 4.9. Arvutada järgmine kolmekordne integraal

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\int_0^{\sqrt{x}} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}-x} y \cos(z+x) \, dz \right] dy \right] dx.$$

Arvutamist alustame kõige sisemisest integraalst, saadud tulemuse viime keskmise integraali alla ja lõpuks keskmise integraali väärtuse integreerime esimese integraali sees argumendi x järgi.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}-x} y \cos(z+x) dz = y \sin(z+x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}-x} = y(1 - \sin x).$$

$$\int_0^{\sqrt{x}} y \cdot (1 - \sin x) dy = (1 - \sin x) \int_0^{\sqrt{x}} y dy = (1 - \sin x) \frac{y^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{x}} = \frac{x}{2}(1 - \sin x).$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{2}(1 - \sin x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x - x \sin x) dx = \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx - \underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx}_{\text{ositi}} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{x^2}{2} - x \cos x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx \right) =$$


$$= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{x^2}{2} - (-x \cos x + \sin x) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{8} - 1 \right).$$

Näide 4.10. Leida integraal

$$\iiint_V \frac{3x}{1-x-y} dx dy dz,$$

kui piirkond V on piiratud tasanditega

$$x = 0, y = 0, z = 0, x+y+z = 1; \quad x, y, z \geq 0.$$




Leiame vajalikud rajad antud tasandite võrrandi-
test.

$$z = 0, \quad z = 1 - x - y.$$

$$\int_0^{1-x-y} \frac{3x}{1-x-y} dz = \frac{3x}{1-x-y} \cdot z \Big|_0^{1-x-y} = 3x,$$

$$\int_0^{1-x} 3x dy = 3xy \Big|_0^{1-x} = 3x(1-x) = 3(x-x^2),$$

$$\int_0^1 3(x-x^2) dx = \left(\frac{3x^2}{2} - x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2}.$$


Kolmekordse integraali omadused on analoogilised kahekordse integraali omadustega.

1. Kui funktsioonid $f(x, y, z)$ ja $g(x, y, z)$ on integreeruvad piirkonnas V , siis on integreeruv ka nende summa ja vahe.

$$\iiint_V [f(x, y, z) \pm g(x, y, z)] dV = \iiint_V f(x, y, z) dV \pm \iiint_V g(x, y, z) dV.$$

2. **Konstantse kordaja** võib tuua integraali märgi ette

$$\iiint_V c \cdot f(x, y, z) dV = c \iiint_V f(x, y, z) dV.$$

3. **Integreerimispiirkonda** V võib jaotada osadeks V_1 ja V_2 , millel pole ühiseid sisepunkte:

$$V = V_1 \cup V_2$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = \iiint_{V_1} f(x, y, z) dV + \iiint_{V_2} f(x, y, z) dV.$$

4.7. MUUTUJATE VAHETUS KOLMEKORDSES INTEGRAALIS

Vaatame teisendust

$$\begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w), \\ z = z(u, v, w) \end{cases} \quad (u, v, w) \in V',$$

mis teisendab uvw -ruumis asetseva kinnise piirkonna V' xyz -ruumis asetsevaks piirkonnaks V . Kui teisendus on üksühene ja kui funktsioonidel x , y ja z on olemas esimest järku osatuletised piirkonnas V' ning kui teisenduse **jakobiaan**

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v & x'_w \\ y'_u & y'_v & y'_w \\ z'_u & z'_v & z'_w \end{vmatrix} \neq 0, \text{ kui } (u, v, w) \in V',$$

siis **muutujate vahetuse valem** on kujul

$$\begin{aligned} & \iiint_V f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \\ & = \iiint_{V'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |J(u, v, w)| \, du \, dv \, dw. \end{aligned}$$

Kuna jakobiaani ja pöördteisenduse jakobiaani korrutis on 1, saame leida teisenduse jakobiaani pöördteisenduse jakobiaani kaudu


$$J(x, y, z) = \begin{vmatrix} u'_x & u'_y & u'_z \\ v'_x & v'_y & v'_z \\ w'_x & w'_y & w'_z \end{vmatrix} = \frac{1}{J(u, v, w)},$$

$$|J(u, v, w)| = \frac{1}{|J(x, y, z)|}.$$

Näide 4.11. Leida ellipsoidi ruumala.

Ellipsoidi valem on

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$



Ruumala arvutamiseks teeme järgmise muutujate vahetuse

$$\begin{aligned} x &= au, & u &= \frac{x}{a}, & u &\in [-1, 1], \\ y &= bv, & v &= \frac{y}{b}, & v &\in [-1, 1], \\ z &= cw, & w &= \frac{z}{c}, & w &\in [-1, 1]. \end{aligned}$$

Muutujate vahetuse jakobiaan on

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v & x'_w \\ y'_u & y'_v & y'_w \\ z'_u & z'_v & z'_w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = abc.$$

Ellipsoidi võrrand uutes muutujates on

$$u^2 + v^2 + w^2 = 1$$

ja ruumala arvutamise valem

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 du \int_{-1}^1 dv \int_{-1}^1 abc dw &= \int_{-1}^1 du \int_{-1}^1 abc(w)|_{-1}^1 dv = \int_{-1}^1 du \int_{-1}^1 2abc dv = \\ &= \int_{-1}^1 2abc(v)|_{-1}^1 du = 4abc(u)|_{-1}^1 = 8abc. \end{aligned}$$

Tüüpilised asendused praktikas on üleminek silinderkoordinaatidele, elliptilistele silinderkoordinaatidele, sfäärkoordinaatidele, ellipsoidkoordinaatidele ja üldistele ellipsoidkoordinaatidele. Tutvume neist kahe tähtsamaga.

SILINDRILISED KOORDINAADID

Silindrilistele koordinaatidele üleminek on põhjendatud, kui integreerimispiirkonnaks on silinder või silindri osa. Lisaks polaarkoordinaatidele on antud kõrgus h . Tegemist on muutuja vahetusega kujul


$$\begin{cases} x = \varrho \cos \varphi, \\ y = \varrho \sin \varphi, \\ z = h \end{cases}$$

Teisenduse jakobiaan on

$$J(\varrho, \varphi, h) = \begin{vmatrix} x'_\varrho & x'_\varphi & x'_h \\ y'_\varrho & y'_\varphi & y'_h \\ z'_\varrho & z'_\varphi & z'_h \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\varrho \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \varrho \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$


ehk

$$\varrho \cos^2 \varphi + \varrho \sin^2 \varphi = \varrho,$$



mille tõttu kehtib


$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Delta} f(\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi, h) \varrho d\varrho d\varphi dh$$



SFÄÄRILISED KOORDINAADID

Sfäärilisi koordinaate kasutatakse siis, kui integreerimispiirkond on sfäär või selle osa. Uuteks muutujateks võtame nurga z -telje suhtes, mille tähistame kreeka tähega θ ning punkti kauguse koordinaatide alguspunktist tähistame ϱ . Muutuja vahetus on järgmisel kujul

$$\begin{cases} x = \varrho \cos \varphi \sin \theta, \\ y = \varrho \sin \varphi \sin \theta, \\ z = \varrho \cos \theta. \end{cases}$$



Muutuja vahetuse jakobiaan on

$$J(\varrho, \varphi, \theta) = \begin{vmatrix} x'_\varrho & x'_\theta & x'_\varphi \\ y'_\varrho & y'_\theta & y'_\varphi \\ z'_\varrho & z'_\theta & z'_\varphi \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi \sin \theta & \varrho \cos \varphi \cos \theta & -\varrho \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & \varrho \sin \varphi \cos \theta & \varrho \cos \varphi \sin \theta \\ \cos \theta & -\varrho \sin \theta & 0 \end{vmatrix}.$$


Niisiis

$$|J| = \varrho^2 \sin \theta,$$

mille tõttu


$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_\Delta f(\varrho \cos \varphi \sin \theta, \varrho \sin \varphi \sin \theta, \varrho \cos \theta) \varrho^2 \sin \theta d\varrho d\varphi d\theta.$$

Uus nurk muutub vahemikus $0 \leq \theta \leq \pi$ (keskmise joonis).



Allikas: http://mathinsight.org/spherical_coordinates (tähistused: $\phi = \theta, \theta = \varphi$)

Kui kõik joonised kokku võtta, saab kõik sfäärilised koordinaadid kujutada ühel joonisel.



Allikas: Thomas' Calculus (tähistused: $\phi = \theta, \theta = \varphi$)

Näide 4.12. Leida integraal sfääriliste koordinaatide kaudu

$$\iiint_V xz \, dx \, dy \, dz, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0.$$

Integreeritav funktsioon sfäärilistes koordinaatides on

$$xz = \varrho^2 \cos \varphi \sin \theta \cos \theta, \quad J(\varrho, \varphi, \theta) = \varrho^2 \sin \theta.$$


Kuna

$$x^2 + y^2 + z^2 = \varrho^2,$$

siis integreerimispiirkonna võrrandiks saame $\varrho^2 = 1$.

Integreerimispiirkond sfäärilistes koordinaatides on seega

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \varrho \leq 1.$$



Arvutame kolmekordse integraali uues piirkonnas

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \, d\varphi \int_0^1 \varrho^4 \, d\varrho \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos \theta \, d\theta &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \, d\varphi \int_0^1 \varrho^4 \left(\frac{\sin^3 \theta}{3} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} d\varrho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \left(\frac{\varrho^5}{15} \right) \Big|_0^1 d\varphi = \frac{1}{15}. \end{aligned}$$

4.8. KOLMEKORDSE INTEGRAALI RAKENDUSED

1. Keha mass. Kui eeldada, et piirkonnas E on $f(x, y, z) \geq 0$, siis võime seda funktsiooni tõlgendada aine tihedusena ϱ punktis $(x, y, z) \in E$. Siis ühe punkti P_i fikseerimine osapiirkonnas E_i ruumalaga ΔV_i tähendab seda, et kogu osapiirkonnas on aine tihedus loetud konstantseks ehk võrdseks aine tihedusega selles väljavalitud punktis. Sellisel juhul korrutis $f(P_i)\Delta V_i$ on tihedus korda osapiirkonna ruumala ehk ligikaudu osapiirkonna mass. Ligikaudu sellepärast, et osapiirkonnas muutuv tihedus on loetud konstantseks. Integraalsumma tähendab sellisel juhul ligikaudu kogu piirkonna E massi. Piirprotsess $\lambda \rightarrow 0$ tähendab seda, et kõikide osapiirkondade diameetrid kahanevad. Järelikult hakkab aine tihedus ühes suvaliselt väljavalitud punktis üha täpsemalt iseloomustama tihedust kogu osapiirkonnas. Tõlgendades integreeritavat funktsiooni $f(x, y, z)$ aine tihedusena, tähendab kolmekordne integraal piirkonna E massi. Olgu jäiga keha E ruumala V ja aine tihedus kehas muutuv ehk $\varrho = \varrho(x, y, z)$, kus $(x, y, z) \in E$. Lõpmata väikse ruumala dV korral loeme tiheduse konstantseks ja mass $dm = \varrho(x, y, z)dV$ ja järelikult

$$m_E = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \varrho(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i = \iiint_E \varrho(x, y, z) \, dx dy dz.$$

2. Piirkonna E ruumala. Kui piirkond E on täidetud ainega, mille tihedus igas punktis $\varrho(x, y, z) = 1$, siis piirkonna E mass ja ruumala on arvuliselt võrdsed,

seega piirkonna E ruumala on arvutatav järgmise kolmekordse integraali abil

$$V_E = \iiint_E dx dy dz.$$

3. Massikeskme koordinaadid ja inertsimoment. Materiaalse keha E massikeskme $C = (x_c, y_c, z_c)$ koordinaadid avalduvad järgmisel

$$x_c = \frac{1}{m_E} \iiint_E x \varrho(x, y, z) dx dy dz; \quad y_c = \frac{1}{m_E} \iiint_E y \varrho(x, y, z) dx dy dz;$$

$$z_c = \frac{1}{m_E} \iiint_E z \varrho(x, y, z) dx dy dz,$$


kus m_E on keha mass.

Näide 4.13. Leida massikese kehale, mis on homogeenest materjalist tihedusega $\varrho = \text{const}$. Keha on alt piiratud ringjoonega

$$x^2 + y^2 \leq 4$$

Ja ülevalt piirab keha paraboloid

$$z = 4 - x^2 - y^2$$



Rajad:

$$0 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2,$$

siis

$$-2 \leq x \leq 2$$

ja

$$y = \pm\sqrt{4 - x^2}.$$

Et tegemist on sümmeetrilise kujundiga x telje suhtes, on massikeskme koordinaadid

$$x_c = y_c = 0.$$

$$m_E = \varrho \iiint_E dx dy dz = \varrho \iint_D dx dy \int_0^{4-x^2-y^2} dz = \varrho \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy = *$$

Edasi on mõistlik üle minna polaarkoordinaatidele, sest integreerimispiirkond on ring. Ringjoone puhul

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \text{ ja } 0 \leq r \leq 2.$$

Siis

$$4 - x^2 - y^2 = 4 - (x^2 + y^2) = 4 - r^2$$

ja

$$\begin{aligned} J(r, \varphi) &= r. \\ &= \varrho \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (4 - r^2)r dr = \varrho \int_0^{2\pi} \left(\frac{4r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right)_0^2 d\varphi = \varrho \int_0^{2\pi} \left(8 - \frac{16}{4} \right) d\varphi = \\ &= \varrho \int_0^{2\pi} 4 d\varphi = 4\varrho\varphi \Big|_0^{2\pi} = 8\varrho\pi. \end{aligned}$$

Nüüd arvutame massikeskme koordinaadi z_c üleminekuga polaarkoordinaatidele.

$$\begin{aligned} z_c &= \frac{1}{m_E} \iiint_E z \varrho dx dy dz = \frac{1}{8\varrho\pi} \iint_D dx dy \int_0^{4-x^2-y^2} z dz = \\ &= \frac{1}{16\pi} \iint_D (4 - x^2 - y^2)^2 dx dy = \frac{1}{16\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (4 - \varrho^2)^2 \varrho d\varrho = \\ &= \frac{1}{16\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 16\varrho - 8\varrho^3 + \varrho^5 d\varrho = \frac{1}{16\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{16\varrho^2}{2} - \frac{8\varrho^4}{4} + \frac{\varrho^6}{6} \right)_0^2 d\varphi = \\ &= \frac{1}{16\pi} \int_0^{2\pi} \left(32 - 32 + \frac{64}{6} \right) d\varphi = \frac{1}{16\pi} \int_0^{2\pi} \frac{32}{3} d\varphi = \frac{1}{16\pi} \frac{64}{3} \pi = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Saime keha massikeskme koordinaatidega

$$C = \left(0, 0, \frac{4}{3} \right).$$

Materiaalse piirkonna **inertsimoment** koordinaattelgede ja koordinaatide alguspunkti suhtes avaldub

$$\begin{aligned} I_x &= \iiint_E (y^2 + z^2) \varrho(x, y, z) dx dy dz; \quad I_y = \iiint_E (x^2 + z^2) \varrho(x, y, z) dx dy dz; \\ I_z &= \iiint_E (x^2 + y^2) \varrho(x, y, z) dx dy dz; \quad I_0 = \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) \varrho(x, y, z) dx dy dz. \end{aligned}$$

Näide 4.14. Avaldada materiaalse piirkonna R inertsimoment z -telje suhtes, kui piirkonda täitev aine on tihedusega ϱ ja piirkond R asub sfääri

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$$

sees ning väljaspool silindrit

$$x^2 + y^2 = a^2$$

(joonis).

Inertsmoment z -telje suhtes piirkonnas R on


$$I = \iiint_R (x^2 + y^2) \delta dV.$$

Teeme muutujate vahetuse, minnes üle silindrilistele koordinaatidele

$$\begin{cases} x = \varrho \cos \varphi \\ y = \varrho \sin \varphi \\ z = h \end{cases}, \quad J(\varrho, \varphi) = \varrho.$$

Sfääri ja silindri võrrandid silindrilistes koordinaatides on

$$h^2 = 4a^2 - \varrho^2, \quad \varrho^2 = a^2.$$



Integreerimipiirkonnaks saame

$$R = \left\{ (\varrho, \varphi, h) : a \leq \varrho \leq 2a, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq h \leq \sqrt{4a^2 - \varrho^2} \right\},$$

seetõttu saame inertsimomenti avaldise kujul

$$I = \iiint_R (x^2 + y^2) \delta dx dy dz = 2\delta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_a^{2a} d\varrho \int_0^{\sqrt{4a^2 - \varrho^2}} \varrho^2 \varrho dh.$$

Integreerime kõigepealt muutuja h järgi, saame

$$I = 2\delta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_a^{2a} \left((\varrho^3 h) \Big|_0^{\sqrt{4a^2 - \varrho^2}} \right) d\varrho = 2\delta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_a^{2a} (\varrho^3 \sqrt{4a^2 - \varrho^2}) d\varrho =$$

Muutuja ϱ järgi integreerimiseks teeme muutuja vahetuse

$$u = 4a^2 - \varrho^2, \quad \varrho^2 = 4a^2 - u, \quad du = -2\varrho d\varrho, \quad -\frac{du}{2} = \varrho d\varrho.$$

Uued rajad on

$$\varrho = a, u = 3a^2; \quad \varrho = 2a, u = 0.$$

$$\begin{aligned} &= 2\delta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{3a^2}^0 -\frac{1}{2}(4a^2 - u)\sqrt{u} du = 2\delta \int_0^{2\pi} \left(-2a^2 \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{5} u^{\frac{5}{2}} \Big|_{3a^2}^0 \right) d\varphi = \\ &2\delta \int_0^{2\pi} \left(a^2 \frac{4}{3} (3a^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5} (3a^2)^{\frac{5}{2}} \right) d\varphi = 2\delta a^5 \sqrt{3} \int_0^{2\pi} \frac{11}{5} d\varphi = \frac{22}{5} \sqrt{3} \delta a^5 2\pi = \frac{44}{5} \sqrt{3} \delta a^5 \pi. \end{aligned}$$


4.9. ESIMEST LIIKI JOONINTEGRAAL

Olgu antud funktsioon $u = f(x, y, z)$, mis on määratud kaarel AB . Jaotame kaare AB n elementaarkaareks $A_{i-1}A_i$, $i = 1, \dots, n$; $A_0 = A$, $A_n = B$. Olgu Δs_i kaare $A_{i-1}A_i$ pikkus. Valime igal kaaretükil vabalt punkti $M_i(x_i, y_i, z_i)$. Funktsiooni **integraalsummaks** piki joont AB nimetatakse summat

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta s_i.$$

Olgu suurim elementaarkaarte pikkustest $\lambda = \max \Delta s_i$. Leiame piirväärtuse maksimaalse elementaarkaare lähenemisel nullile.

Definitsioon 4.4. Kui piirväärtus eksisteerib ja ei sõltu joone AB osadeks jaotamise viisist ja punktide M_i valikust, siis nimetatakse seda **esimest liiki joonintegraaliks** üle kaare AB funktsioonist u



$$\int_{AB} f(x, y, z) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta s_i.$$

Kui on tegemist pideva funktsiooniga $f(x, y, z)$, siis piirväärtus eksisteerib. Integreerimisted AB märgitakse ka ühe tähega L . Joon AB võib olla ka kinnine, siis $A = B$.

Joonintegraali omadused:

1. Joonintegraal ei sõltu integreerimissuunast:

$$\int_{AB} f(x, y, z) ds = \int_{BA} f(x, y, z) ds.$$

2. Kui funktsioonid $f(x, y, z)$ ja $g(x, y, z)$ on integreeruvad joonel AB , siis on integreeruv ka nende **summa ja vahe**

$$\int_{AB} [f(x, y, z) \pm g(x, y, z)] ds = \int_{AB} f(x, y, z) ds \pm \int_{AB} g(x, y, z) ds.$$

3. **Konstansse kordaja** võib tuua integraali märgi ette

$$\int_{AB} cf(x, y, z) ds = c \int_{AB} f(x, y, z) ds.$$

4. Kui AB koosneb kaartest AC ja CB ja funktsioon $f(x, y, z)$ on integreeruv joonel AB , siis

$$\int_{AB} f(x, y, z) ds = \int_{AC} f(x, y, z) ds + \int_{CB} f(x, y, z) ds.$$

Joonintegraali arvutamine.

Kui joon esitatud parameetriliste võrranditega, siis kaare pikkuse diferentsiaal avaldub

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt.$$

Joonintegraali saame kirjutada määratud integraalina üle parameetri t .

- a) Olgu ruumiline kõver AB esitatud parameetriliste võrranditega
 $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, $A = (x, y, z)|_{t=\alpha}$, $B = (x, y, z)|_{t=\beta}$, $\alpha \leq t \leq \beta$,

$$\int_{AB} f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt.$$

- b) **Tasandiline kõver.** Kui joon AB asub xy tasandil, siis funktsioon $f(x, y)$ on avaldatav parameetriliste võrranditega

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = 0, \quad A = (x, y)|_{t=\alpha}, \quad B = (x, y)|_{t=\beta}, \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

$$\int_{AB} f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt.$$

Näide 4.15. Leida joonintegraal järgmistel tingimustel:

$$\int_{AB} x^2 y ds, \quad AB : x^2 + y^2 = 4, y \geq 0.$$

Tegemist on ringjoone ülemise osaga, raadiusega 2, mille parameetrilised võrrandid on:

$$x(t) = 2 \cos t, \quad y(t) = 2 \sin t, \quad t \in [0, \pi] \quad x'(t) = -2 \sin t, \quad y'(t) = 2 \cos t,$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \int_0^{\pi} 4 \cos^2 t \cdot 2 \sin t.$$

$$\begin{aligned} \sqrt{(-2 \sin t)^2 + (2 \cos t)^2} dt &= \int_0^{\pi} 8 \cos^2 t \sin t \sqrt{4(\sin^2 t + \cos^2 t)} dt = \\ &= \int_0^{\pi} 16 \cos^2 t \sin t dt = \int_{-1}^1 -16u^2 dt = -16 \left. \frac{u^3}{3} \right|_{-1}^1 = \frac{32}{3}. \end{aligned}$$

c) **Tasandiline kõver.** Kui tasandiline kõver AB esitatud võrrandiga

$$y = y(x), \quad a \leq x \leq b, \quad \int_{AB} f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx.$$

Näide 4.16. Leida joonintegraal

$$\int_{AB} xy^2 ds, \quad AB : y = 2x, A = (0, 0), B = (2, 4), \quad y(x) = 2x, \quad y'(x) = 2, x \in [0, 2].$$

$$\int_{AB} f(x, y) ds = \int_0^2 x(2x)^2 \sqrt{1 + 2^2} dx = 4\sqrt{5} \int_0^2 x^3 dx = 4\sqrt{5} \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^2 = 16\sqrt{5}.$$

d) **Tasandiline kõver.** Kui tasandiline kõver AB esitatud võrrandiga

$$x = x(y), \quad c \leq y \leq d, \quad \int_{AB} f(x, y) ds = \int_c^d f(x(y), y) \sqrt{\left(\frac{dx}{dy}\right)^2 + 1} dy.$$

e) **Tasandiline kõver polaarkoordinaatides.** Kui tasandiline kõver AB esitatud võrrandiga

$$r = r(\varphi), \quad \alpha \leq \varphi \leq \beta, \quad \int_{AB} f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \sqrt{r^2 + r'^2} d\varphi.$$

JOONINTEGRAALI RAKENDUSED

1. Kõvera mass ja massikeskme koordinaadid. On antud ruumiline kõver AB , millel aine tihedus on jaotunud funktsiooni $p = p(x, y, z)$ järgi. Siis materiaalse kaare mass avaldub

$$m = \int_{AB} p(x, y, z) ds.$$

Massikeskme $C = (x_c, y_c, z_c)$ koordinaadid avalduvad massi kaudu järgmiselt:

$$x_c = \frac{1}{m} \int_{AB} xp(x, y, z) ds,$$

$$y_c = \frac{1}{m} \int_{AB} yp(x, y, z) ds,$$

$$z_c = \frac{1}{m} \int_{AB} zp(x, y, z) ds.$$

2. Muutuva jõu töö. Kui punkt P liigub piki ruumilist joont punktist A punkti B . Punktile P rakendatud jõud, mis punkti P liikumisel muutub nii suuruse kui sihi poolest

$$\vec{F} = P(x, y, z) \vec{i} + Q(x, y, z) \vec{j} + R(x, y, z) \vec{k}.$$

Töö, mida teeb jõud punkti P liikumisel piki joont, avaldub järgmiselt

$$W = \int_{AB} (P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz).$$


3. Joone kaare pikkus. Kui ruumis on antud sile joon AB , siis tema pikkus avaldub valemiga

$$l_{AB} = \int_{AB} ds.$$

4. Silinderpinna pindala. Olgu funktsioon $f(x, y) \geq 0$ pidev xy tasandil asetseval siledal joonel AB . Vaatame vertikaalset silinderpinda $ABCD$, mille alumine serv on joon AB ja ülemine serv on funktsiooni f graafik $z = f(x, y)$. Pinna $ABCD$ pindala S_{ABCD} avaldub valemiga

$$S_{ABCD} = \int_{AB} f(x, y) ds.$$

Saadud valem annab [esimesti liiki joonintegraali](#) geomeetrilise tähenduse.



4.10. TEIST LIIKI JOONINTEGRAAL*

Olgu antud funktsioon $u = f(x, y, z)$, mis on määratud kaarel AB . Jaotame kaare AB n elementaarkaareks $A_{i-1}A_i$, $i = 1, \dots, n$; $A_0 = A, A_n = B$. Olgu Δs_i kaare $A_{i-1}A_i$ pikkus. Valime igal kaaretükil vabalt punkti $M_i(x_i, y_i, z_i)$. Tähistame osakaare $A_{i-1}A_i$ projektsioonid koordinaattelgedele:


$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \Delta y_i = y_i - y_{i-1} \text{ ja } \Delta z_i = z_i - z_{i-1}.$$

Moodustame integraalsummad

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta x_i,$$

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta y_i,$$

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta z_i.$$



Definitsioon 4.5. Kui integraalsumma piirväärtus eksisteerib ja ei sõltu joone AB osadeks jaotamise viisist ja punktide M_i valikust, siis nimetatakse seda piirväärtust **funktsiooni f teist liiki joonintegraaliks** üle kaare AB **projektsioonide järgi x teljel**

$$\int_{AB} f(x, y, z) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta x_i.$$

Samal viisil saab defineerida **teist liiki joonintegraalid projektsioonide järgi y ja z teljele:**

$$\int_{AB} f(x, y, z) dy = \lim_{\max \Delta y_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta y_i$$

$$\int_{AB} f(x, y, z) dz = \lim_{\max \Delta z_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta z_i$$

Definitsioon 4.6. Olgu joonel AB defineeritud kolm funktsiooni: $p = P(x, y, z)$, $q = Q(x, y, z)$ ja $r = R(x, y, z)$, siis **funktsiooni f teist liiki joonintegraaliks** üle kaare AB nimetatakse integraali

$$\begin{aligned} \int_{AB} P(x, y, z) dx + \int_{AB} Q(x, y, z) dy + \int_{AB} R(x, y, z) dz &= \\ &= \int_{AB} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz. \end{aligned}$$

Teist liiki joonintegraali omadused:

1. Teist liiki joonintegraal sõltub integreerimissuunast:

$$\int_{AB} P dx + Q dy + R dz = - \int_{BA} P dx + Q dy + R dz.$$

2. Kui funktsioonid $P_1(x, y, z)$ ja $P_2(x, y, z)$ on integreeruvad joonel AB , siis on integreeruv ka nende summa ja vahe

$$\int_{AB} [P_1(x, y, z) \pm P_2(x, y, z)] dx = \int_{AB} P_1(x, y, z) dx \pm \int_{AB} P_2(x, y, z) dx.$$

3. Konstantse kordaja võib tuua integraali märgi ette

$$\int_{AB} cP(x, y, z) dx = c \int_{AB} P(x, y, z) dx.$$

4. Kui AB koosneb kaartest AC ja CB , siis teist liiki joonintegraal avaldub

$$\int_{AB} P dx + Q dy + R dz = \int_{AC} P dx + Q dy + R dz + \int_{CB} P dx + Q dy + R dz.$$

Teist liiki joonintegraali arvutamine.

- a) Olgu ruumiline kõver AB esitatud parameetriliste võrranditega

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t),$$

$$A = (x, y, z)|_{t=\alpha}, \quad B = (x, y, z)|_{t=\beta}, \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

$$\int_{AB} f(x, y, z) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t))x'(t) dt,$$

$$\int_{AB} f(x, y, z) dy = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t))y'(t) dt,$$

$$\int_{AB} f(x, y, z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t))z'(t) dt,$$

$$\int_{AB} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz =$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \{P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)\} dt.$$

b) Tasandiline kõver. Kui joon AB asub xy tasandil, siis funktsioon $f(x, y)$ on avaldatav parameetriliste võrranditega

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = 0,$$

$$A = (x, y)|_{t=\alpha}, \quad B = (x, y)|_{t=\beta}, \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

$$\int_{AB} f(x, y) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) x'(t) dt,$$

$$\int_{AB} f(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) y'(t) dt,$$

c) Tasandiline kõver. Kui tasandiline kõver AB esitatud võrrandiga

$$y = y(x), \quad a \leq x \leq b, \quad \int_{AB} f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y(x)) dx.$$

d) Tasandiline kõver. Kui tasandiline kõver AB esitatud võrrandiga

$$x = x(y), \quad c \leq y \leq d, \quad \int_{AB} f(x, y) dx = \int_c^d f(x(y), y) dy.$$

e) Tasandiline kõver polaarkoordinaatides. Kui tasandiline kõver AB esitatud võrrandiga

$$r = r(\varphi), \quad \alpha \leq \varphi \leq \beta,$$

$$\int_{AB} f(x, y) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) (r' \cos \varphi - r \sin \varphi) d\varphi,$$

$$\int_{AB} f(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) (r' \sin \varphi + r \cos \varphi) d\varphi.$$

Kui kinnine joon AB asub xy -tasandil, on tegu integraaliga

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy,$$

siis loetakse integreerimistee **positiivseks suunaks** sellist suunda, et z -telje poolt vaadatuna jääb joone poolt piiratud ala vasakule (joon läbitakse vastupäeva, kellaosuti liikumise vastassuunas).

Teist liiki joonintegraali rakendused.

1. **Tasandilise kujundi pindala arvutamine.** Olgu xy -tasandil asetseva kujundi D rajajoon Γ tükiti sile. Siis kujundi D pindala S_D avaldub valemitega

$$S_D = \int_L x \, dy,$$

$$S_D = - \int_L y \, dx,$$

$$S_D = \frac{1}{2} \int_L x \, dy - y \, dx.$$

2. **Muutuva jõu töö arvutamine.** Liikugu materiaalne punkt massiga m mööda joont AB punktist A punkti B jõu $\vec{F} = (P, Q, R)$ toimel, kus $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$ ja $R(x, y, z)$ on pidevad funktsioonid joonel AB . Siis jõu \vec{F} töö W on arvutatav valemiga

$$W = m \int_{AB} P(x, y, z) \, dx + Q(x, y, z) \, dy + R(x, y, z) \, dz.$$

Greeni valem. Eksisteerigu pidevatel kahe muutuja funktsioonidel $p = P(x, y)$ ja $q = Q(x, y)$ pidevad osatuletised

$$\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$$

tõkestatud kinnises piirkonnas D , mille rajajoon Γ on tükiti sile. Siis

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy = \int_{\Gamma} P \, dx + Q \, dy.$$

4.11. PINDINTEGRAAL*

Olgu funktsioon $F(x, y, z)$ pidev sileda pinna $z = z(x, y)$ mingi tüki D punktides. Jaotame pinnatüki n osapiirkonnaks D_i diameetriga d_i ja pindalaga ΔS_i

ning valime igas osapiirkonnas punkti (x_i, y_i, z_i) . Tähistame suurima diameetri osapiirkondadel

$$\lambda = \max d_i$$

Definitsioon 4.7. Pindintegraal pindala järgi üle pinnatüki D defineeritakse järgmiselt

$$\iint_D F(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n F(x_i, y_i, z_i) \Delta S_i$$

Pindintegraali saab teisendada kahekordseks integraaliks, asendades $z = z(x, y)$ ning võttes pinna diferentsiaaliks

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dy}\right)^2}.$$

Integreerimispinnaks tuleb pinna D projektsioon xy tasapinnale D_{xy} . Saame

$$\iint_D F(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} F(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dy}\right)^2} dx dy.$$

Pindintegraal projektsiooni järgi on defineeritud läbi osapiirkonna D_i projektsiooni xy tasapinnale, mille pindala on ΔS_i

$$\iint_D F(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n F(x_i, y_i, z_i) \Delta S_i$$

Pindintegraali projektsiooni järgi saab teisendada kahekordseks integraaliks üle pinna D projektsiooni D_{xy}

$$\iint_D F(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} F(x, y, z(x, y)) dx dy.$$

Analoogiliselt defineeritakse pindintegraalid projektsiooni järgi xz ja yz tasanditele.

$$\begin{aligned} \iint_D F(x, y, z) dx dy &= \iint_{D_{xz}} F(x, y(x, z), z) dx dz, \\ \iint_D F(x, y, z) dx dy &= \iint_{D_{yz}} F(x(y, z), y, z) dy dz. \end{aligned}$$

V HARILIKUD DIFERENTSIAALVÕRRANDID

5.1. SISSEJUHATUS

Tehniliste ülesannete matemaatiline analüüs koosneb kolmest etapist:

- ülesande tingimuste esitamine matemaatika keeles,
- matemaatilise ülesande lahendamine,
- saadud tulemuste tõlgendamine.

Oletame, et funktsioon $y = f(x)$ kirjeldab mingi nähtuse kvantitatiivset külge. Sageli ei ole nähtuse vaatlemisel võimalik kindlaks teha x ja y vahelist sõltuvust, kuid saame määrata suuruste x, y, y', y'', \dots vahelise seose, ehk saame koostada diferentsiaalvõrrandi. Saadud seosest muutujate x, y ja tuletiste vahel on vaja tuletada otsene seos x ja y vahel ehk sõltuvus $y = f(x)$ ehk tuleb **integreerida diferentsiaalvõrrand**.

Näide 5.1. Mingilt kõrguselt visatakse alla keha, mille mass on m . Leida seaduspärasus, mille järgi muutub keha langemiskiirus $v = f(t)$, kui kehale mõjub peale raskusjõu veel õhutakistus, mis on võrdeline kiirusega (võrdetegur on k).

Newtoni II seaduse põhjal

$$F = m \frac{dv}{dt}, \quad \frac{dv}{dt} = a,$$

a on liikuva keha kiirendus (kiiruse tuletis aja järgi), F on kehale liikumise suunas mõjuv jõud. See jõud koosneb kahest komponendist: raskusjõust mg ja õhutakistusest $-kv$, see on keha liikumisele vastassuunaline

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv, \tag{5.1}$$

kus $v = f(t)$ on otsitav funktsioon. Saime seose otsitava funktsiooni ja tema tuletise vahel ehk diferentsiaalvõrrandi funktsiooni v suhtes. See väljendab mõningat tüüpi langevarjude langemise seadust. Lahendada diferentsiaalvõrrand, tähendab leida selline funktsioon $v = f(t)$, mis sarnaselt rahuldab diferentsiaalvõrrandit. Selliseid funktsioone on lõpmata palju. Osutub, et antud diferentsiaalvõrrandit rahuldab funktsioon

$$v = Ce^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k}, \quad (5.2)$$

kus C on mistahes arv (integreerimiskonstant). Kontrollime lahendi õigsust, leides lahendist (5.2) tuletise ja asendades võrrandisse (5.1) eraldi vasakule ja paremale poolele.

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= Ce^{-\frac{k}{m}t} \cdot \left(-\frac{k}{m}\right), \\ \text{v.p. } m \frac{dv}{dt} &= m \cdot Ce^{-\frac{k}{m}t} \cdot \left(-\frac{k}{m}\right) = -Ce^{-\frac{k}{m}t}, \\ \text{p.p. } mg - kv &= mg - k \left(Ce^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k}\right) = -Ce^{-\frac{k}{m}t}. \end{aligned}$$

Parem pool ja vasak pool on võrdsed, järelikult avaldis (5.2) rahuldab võrrandit (5.1). Milline neist funktsioonidest annab otsitava seose v ja t vahel?

Selle leidmiseks kasutame lisatingimust: keha allaviskamisel anti talle algkiirus v_0 . Siis funktsioon v võrrandis (5.2) peab rahuldama algtingimust. Liikumise alghetkel aeg $t = 0$ ja kiirus

$$v(0) = v_0.$$

Asendame mõlemad suurused valemisse (5.2) ja avaldame kujul C Seega konstant C on leitud ja sõltuvus v ja t vahel avaldub kujul

$$v = \left(v_0 - \frac{mg}{k}\right) e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k}.$$

5.2. DIFERENTSIAALVÕRRANDI MÕISTE, CAUCHY ÜLESANNE

Definitsioon 5.1

Diferentsiaalvõrrandiks nimetatakse võrrandit, milles on otsitavaks ühe või mitme muutuja funktsioon, võrrand seob otsitavat funktsiooni ja tema tuletisi sõltumatute muutujatega.

Vastavalt sõltumatute muutujate arvule liigitatakse diferentsiaalvõrrandeid harilikeks ja osatuletistega diferentsiaalvõrranditeks.

Definitsioon 5.2

Harilikeks diferentsiaalvõrranditeks nimetatakse diferentsiaalvõrrandeid, kus otsitav funktsioon on ühe muutuja funktsioon.

Näited harilike diferentsiaalvõrrandite kohta:

$$y' = 2x - 1, y'' + \frac{2}{x}y' + \frac{8}{x^3}y = 0,$$

kus otsitavaks on funktsioon $y = f(x)$.

Harilikud diferentsiaalvõrrandid on ka võrrandid kujul

$$\frac{dv}{dt} + 3v = 7, \quad \frac{dx}{dt} - x = 4,$$

kus otsitavaks funktsiooniks on vastavalt $v = v(t)$ ja $x = x(t)$.

Definitsioon 5.3

Osatuletistega diferentsiaalvõrranditeks nimetatakse diferentsiaalvõrrandeid, kus otsitavaks on mitme muutuja funktsioon ja võrrand sisaldab osatuletisi.

Definitsioon 5.4

Diferentsiaalvõrrandi järguks nimetatakse võrrandis esinevate otsitava funktsiooni tuletiste kõrgeimat järku.

Esimest järku hariliku diferentsiaalvõrrandi üldkujuks on

$$F(x, y, y') = 0.$$

n -järku hariliku diferentsiaalvõrrandi üldkujuks on

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

Funktsioon F esitab seose sõltumatu muutuja x , otsitava funktsiooni $y = y(x)$ otsitava funktsiooni tuletiste vahel.

Definitsioon 5.5

Diferentsiaalvõrrandi lahendiks nimetatakse sellist funktsiooni, mille asetamine võrrandisse muudab võrrandi samasuseks sõltumatu muutuja suhtes.

Definitsioon 5.6

Diferentsiaalvõrrandi integraalkõveraks nimetatakse diferentsiaalvõrrandi lahendile

$$y = y(x)$$

vastavalt joont xy -tasandil.

Näide 5.2. Olgu antud diferentsiaalvõrrand

$$y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0.$$

Näitame, et funktsioon

$$y = 2x + x^2$$

on antud diferentsiaalvõrrandi lahend. Selleks võtame lahendist esimese ja teise tuletise

$$y' = 2 + 2x, \quad y'' = 2$$

ning asendame saadud tuletised koos lahendiga esialgsesse võrrandisse:

$$2 - \frac{2}{x}(2 + 2x) + \frac{2}{x^2}(2x + x^2) = 2 - \frac{4}{x} - 4 + \frac{4}{x} + 2 = 0$$

Kuna võrrandi paremal pool võrdub nüüd nulliga, millega võrdub ka parem pool, oleme näidanud, et tõesti on tegemist võrrandi lahendiga.

Näide 5.3. Olgu antud diferentsiaalvõrrand

$$y' = 2x - 1.$$

Võrrandi lahendiks on

$$y = x^2 - x,$$

aga ka funktsioonid $y = x^2 - x + C$, kus C on suvaline konstant.

Definitsioon 5.7

Diferentsiaalvõrrandi üldlahendiks ehk **üldintegraaliks** nimetatakse diferentsiaalvõrrandi lahendit, mis sisaldab suvalist konstanti C .

Võrrandi üldlahendis sisalduvate suvaliste konstantide arv on võrdne võrrandi järguga.


n -järku diferentsiaalvõrrandi üldlahendiks on funktsioon, mis sisaldab n suvalist konstanti

$$y = f(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$$

ilmutamata kujul $F(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0$.

Näiteks diferentsiaalvõrrandi $y' = 2x - 1$ üldlahendiks on $y = x^2 - x + C$. Nende paraboolide haripunktid asuvad sirgel $x = 1/2$. Üldlahend esitab paraboolide parve. Näiteks, kui

$$\begin{aligned} C = 1, \quad x = \frac{1}{2}, \quad y &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{4} \\ C = 0, \quad x = \frac{1}{2}, \quad y &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 0 = -\frac{1}{4} \\ C = -1, \quad x = \frac{1}{2}, \quad y &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 1 = -\frac{5}{4} \end{aligned}$$



Et leida selle parve hulgast niisugune, mis läbib punkti $A(1; 2)$, tuleb määrata konstant C :

$$2 = 1 - 1 + C \Rightarrow C = 2.$$

Järelikult punkti $A(1; 2)$ läbib integraalkõver $y = x^2 - x + 2$.

Definitsioon 5.8

Diferentsiaalvõrrandi erilahendiks nimetatakse diferentsiaalvõrrandi lahendit, mis on saadud üldlahendist konstantidele arvuliste väärtuste andmisel.

Esimest järku diferentsiaalvõrrandi üldlahendist saame erilahendi, kui rahuldame algtingimuse $y(x_0) = y_0$, kus x_0, y_0 on etteantud arvud. Kuna n -järku diferentsiaalvõrrandi üldlahend sisaldab n suvalist konstanti, siis on konstantide määramiseks vaja n algtingimust.

Definitsioon 5.9

Cauchy ülesandeks nimetatakse ülesannet, kus on vaja leida diferentsiaalvõrrandit

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

lahend y , mis rahuldab algtingimusi

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}.$$

Algtingimusi nimetatakse ka Cauchy tingimusteks. Algtingimusi võib esitada ka teisiti. Esimest järku hariliku diferentsiaalvõrrandi Cauchy ülesanne on ülesanne, kus on vaja leida diferentsiaalvõrrandi $y' = f(x, y)$ selline lahend, mis argumendi väärtusel $x = x_0$ omandab väärtuse $y = y_0$ ehk rahuldab algtingimust

$$y(x_0) = y_0.$$

Järgnevalt sõnastame Cauchy ülesande jaoks lahendi olemasolu ja ühesuguse teoreemi.

Teoreem 5.1

Cauchy teoreem. Olgu $f(x, y)$ ja $\partial f(x, y)/\partial y$ määratud ja pidevad muutujate x, y piirkonnas D . Siis iga punkti $(x_0, y_0) \in D$ korral on Cauchy ülesandel

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

parajasti üks lahend $y = y(x)$.

Teoreemi tõestus on diferentsiaalvõrrandite õpikus [6] lk. 50-58.

5.2.1. CAUCHY ÜLESANDE LAHENDAMINE ASTMERIDADE ABIL

Kui funktsioon $f(x, y)$ on antud analüütiliselt muutujate x, y piirkonnas D , siis iga punkti $(x_0, y_0) \in D$ korral on funktsioon arendatav astmeritta

$$f(x, y) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} a_{ij} (x - x_0)^i (y - y_0)^j,$$

mis koondub punkti (x_0, y_0) teatavas ümbruses. Sellele funktsioonile vastava diferentsiaalvõrrandi $y' = f(x, y)$ lahend on samuti arendatav astmeritta iga x_0 korral määramispiirkonnast $y(x)$

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k,$$

mis koondub punkti x_0 teatavas ümbruses. Rea kordajad c_k avalduvad kujul

$$c_k = \frac{y^{(k)}(x_0)}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots$$

Näide 5.4. Olgu antud Cauchy ülesanne

$$y' = x^2 + y^2, \quad y(0) = 0.$$

Lahendame ülesande astmeridade abil. Võrrandi diferentseerimisel saame, arvestades, et funktsioon y on sõltuv argumentidest x

$$y' = x^2 + y^2, \quad y'' = 2x + 2yy', \quad y''' = 2 + 2(y')^2 + 2yy'',$$

$$y^{IV} = 4y'y'' + 2y'y''' + 2yy'''' = 6y'y'' + 2yy'''' ,$$

$$y^V = 6(y'')^2 + 6y'y'''' + 2y'y'''' + 2yy^{IV} = 6(y'')^2 + 8y'y'''' + 2yy^{IV} ,$$

$$y^{VI} = 12y''y'''' + 8y''y'''' + 8y'y^{IV} + 2y'y^{IV} + 2yy^V = 20y''y'''' + 10y'y^{IV} + 2yy^V ,$$

$$y^{VII} = 20(y''')^2 + 30y''y^{IV} + 12y'y^V + 2yy^{VI} .$$

Siit arvutame

$$\begin{aligned} y(0) &= 0, & y'(0) &= 0, & y''(0) &= 0, & y'''(0) &= 2, \\ y^{IV}(0) &= 0, & y^V(0) &= 0, & y^{VI}(0) &= 0, & y^{VII}(0) &= 80. \end{aligned}$$

Seega ülesande

$$y' = x^2 + y^2, \quad y(0) = 0$$

lähislahendiks võib võtta funktsiooni

$$y = \frac{2}{3!}x^3 + \frac{80}{7!}x^7 = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{63}x^7.$$

5.3. ESIMEST JÄRKU HARILIKUD DIFERENTSIAALVÕRRANDID

5.3.1. ERALDATUD JA ERALDUVATE MUUTUJATEGA DIFERENTSIAALVÕRRANDID

Vaatleme diferentsiaalvõrrandit kujul $f(x) dx + g(y) dy = 0$, kus dx ja dy on vastavalt muutujate x ja y diferentsiaalid ja $f(x)$ ja $g(y)$ on antud funktsioonid.

Definitsioon 5.10. **Eraldatud muutujatega diferentsiaalvõrrandiks** nimetatakse diferentsiaalvõrrandit kujul

$$f(x) dx + g(y) dy = 0,$$

milles dx kordaja $f(x)$ sõltub ainult muutujast x ja dy kordaja $g(y)$ sõltub ainult muutujast y .

Üldlahendi saamiseks tuleb võrrand **integreerida**, leida määramata integraalid kordajatest $f(x)$ ja $g(y)$

$$\int f(x) dx + \int g(y) dy = C,$$

kus C on suvaline konstant. Üldlahend avaldatakse kujul

$$y = F(x, C).$$

Kui võrrand on antud kujul $y' \cdot g(y) + f(x) = 0$, siis lahendamisel esimesena asendame

$$y' = \frac{dy}{dx}$$

ja korrutame võrrandi läbi diferentsiaaliga dx , edasi saame integreerida.

Definitsioon 5.11. **Eralduvate muutujatega diferentsiaalvõrrandiks** nimetatakse diferentsiaalvõrrandit kujul

$$f_1(x)g_1(y)dx + f_2(x)g_2(y)dy = 0, \quad (5.3)$$

kus funktsiooni $f_1(x)$, $f_2(x)$ on argumendi x funktsioonid ja $g_1(y)$, $g_2(y)$ argumendi y funktsioonid

Diferentsiaalide dx ja dy kordajateks on nüüd selliste funktsioonide korrutised, millest üks tegur sõltub ainult argumendist x ja teine tegur ainult argumendist y .

Eralduvate muutujatega diferentsiaalvõrrandi lahendamiseks peame muutujad eraldama. Muutujate eraldamiseks jagame võrrandi (5.3) mõlemad pooli järgmise avaldisega (tuleb jagada läbi nende funktsioonide korrutisega, mis sisaldavad teist muutujat, kui diferentsiaal):

$$|: g_1(y) \cdot f_2(x),$$

Võrrand saab siis kuju:

$$\frac{f_1(x)}{f_2(x)} dx + \frac{g_2(y)}{g_1(y)} dy = 0.$$

Integreerime võrrandit liikmeti, saame eralduvate muutujatega diferentsiaalvõrrandi (5.3) üldlahendi

$$\int \frac{f_1(x)}{f_2(x)} dx + \int \frac{g_2(y)}{g_1(y)} dy = C.$$

Näide 5.5. Leida eraldatud muutujatega diferentsiaalvõrrandi üldlahend (lahendada diferentsiaalvõrrand)

$$e^y y' = 2x + 1.$$

Kõigepealt asendame tuletise diferentsiaalide jagatisega, siis korrutame läbi diferentsiaaliga dx . Üldlahendi saamiseks peame võrrandit integreerima. Lahenduskäik on järgmine: asendame tuletise diferentsiaalide jagatisega, korrutame suurusega dx ja integreerime

$$y' = \frac{dy}{dx},$$

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x + 1, | \cdot dx$$

$$e^y dy = (2x + 1) dx.$$

$$\int e^y dy = \int (2x + 1) dx,$$

$$e^y = x^2 + x + C. \quad | \ln$$

Selleks, et avaldada üldlahendis muutuja y , võtame mõlemast võrrandi poolest naturaalogaritmi, ning kuna $\ln e^y = y$, saame võrrandi üldlahendiks

$$y = \ln(x^2 + x + C).$$

Kontrollime vastuse õigsust, leides üldlahendist tuletise ja asendades esialgsesse võrrandisse:

$$y' = \frac{2x + 1}{x^2 + x + C},$$

$$e^y y' = e^{\ln(x^2 + x + C)} \frac{2x + 1}{x^2 + x + C} = (x^2 + x + C) \frac{2x + 1}{x^2 + x + C} = 2x + 1.$$

Näide 5.6. Leida järgmise eralduvate muutujatega diferentsiaalvõrrandi üldlahend

$$\frac{x}{1 + y^2} dx + 2y(2 + x^2) dy = 0.$$

Võrrandi lahendamiseks peame kõigepealt muutujad eraldama. Antud võrrandis on diferentsiaali dx kordajaks muutujat y sisaldav funktsioon kujul $1/(1+y^2)$ ja diferentsiaali dy kordajaks on muutujat x sisaldav funktsioon kujul $(2+x^2)$. Muutujate eraldamiseks peame võrrandit läbi jagama mõlema funktsiooniga.

$$\frac{x}{1 + y^2} dx + 2y(2 + x^2) dy = 0, \quad \left| : \frac{2 + x^2}{1 + y^2} \right.$$

$$\frac{x}{2 + x^2} dx + 2y(1 + y^2) dy = 0,$$

Nüüd on tegemist eraldatud muutujatega diferentsiaalvõrrandiga, mille lahendamiseks integreerime võrrandi mõlemat poolt

$$\int \frac{x}{2 + x^2} dx + \int 2y(1 + y^2) dy = C,$$

Esimese integraali leiame järgmise muutujavahetusega:

$$\text{m.v. } u = 2 + x^2, \quad du = 2x dx, \quad \frac{du}{2} = x dx,$$

$$\int \frac{du}{2u} + 2 \int y dy + 2 \int y^3 dy = C,$$

$$\frac{1}{2} \ln|2 + x^2| + y^2 + \frac{2}{4} y^4 = C, \quad | \cdot 2$$

Saadud üldlahendis otsitav funktsioon y ei ole logaritmi argument, samas on võrrandis kordajad $1/2$, üldlahendi võime korrutada läbi kordajaga 2. Kuna integreerimiskonstant C on suvaline konstant, siis asendame esialgse konstandi uuega, mille tähistame C_1

$$\ln|2 + x^2| + 2y^2 + y^4 = 2C, \quad C_1 = 2C,$$

$$\ln|2 + x^2| + 2y^2(1 + y^2) = 2C_1.$$

Näide 5.7. Lahendada eralduvate muutujatega diferentsiaalvõrrand

$$yy' = xe^{x+y}$$

algtingimusel

$$y(0) = -1.$$

Muutujate eraldamiseks kirjutame kõigepealt e^{x+y} korrutisena

$$e^{x+y} = e^x \cdot e^y.$$

Edasi teisendame otsitava funktsiooni tuletise diferentsiaalide jagatiseks ja korrutame läbi diferentsiaaliga dx :

$$y \frac{dy}{dx} = xe^x e^y, \quad | \cdot dx$$

muutujate eraldamisel paneme tähele, et võrrandi parem pool on dx kordajaks muutuja y funktsioon e^y

$$y dy = xe^x e^y dx, \quad | : e^y$$

$$\frac{y}{e^y} dy = x \cdot e^x dx,$$

$$y \cdot e^{-y} dy = x \cdot e^x dx.$$

$$\int y \cdot e^{-y} dy - \int x \cdot e^x dx = C.$$

Mõlemad integraalid integreerime ositi.

$$\int y \cdot e^{-y} dy = -e^{-y}y + \int e^{-y} dy = -e^{-y}y - e^{-y},$$

$$\int x \cdot e^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x,$$

$$-e^{-y}y - e^{-y} - xe^x + e^x = C,$$

$$-e^{-y}(y + 1) - e^x(x - 1) = C.$$

Erilahendi saamiseks kasutame alatingumust, et üldlahendist avaldada C väärtus.

$$y(0) = -1: \quad -e^{-(-1)}(-1 + 1) - e^0(0 - 1) = C \quad \Rightarrow \quad C = 1.$$

Erilahend on järgmine

$$-e^{-y}(y + 1) - e^x(x - 1) = 1.$$

Näide 5.8. Leida järgmise diferentsiaalvõrrandi

$$y' = y^2 + 1$$

erilahend alatingimusel

$$y(0) = 1$$

$$y' = y^2 + 1 \quad \frac{dx}{dy} = y^2 + 1,$$

$$dy = (y^2 + 1)dx, \quad |: y^2 + 1$$

$$\frac{dy}{y^2 + 1} = dx.$$

$$\int \frac{dy}{y^2 + 1} - \int dx = C,$$

$$\arctan y - x = C,$$

$$\arctan y = x + C.$$

Seega võrrandi üldlahend on

$$y = \tan(x + C).$$

Erilahendi saamiseks avaldame konstandi C algtingimustest järgnevalt:

$$y(0) = 1: \arctan 1 - 0 = C. \quad C = \frac{\pi}{4}.$$

Saime võrrandi erilahendi

$$y = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$


Eralduvate muutujatega võrrandid keemias*

Keemilise reaktsiooni võib kirja pana üldise valemiga kujul



Kus suurtähtedega A, B, \dots on tähistatud keemilise reaktsiooni lähteained (reagente) ja paremal pool võrdusmärgi tähistavad tähed P, Q, \dots keemilise reaktsiooni käigus tekkivaidprodukte. Väikesed tähed a, b, \dots ja p, q, \dots tähistavad vastava keemilise aine molekulide arvu. Seega tähendab võrrand, et lähteainet A võetakse a molekuli ning lähteainet B võetakse b molekuli, keemilise reaktsiooni

tulemusena tekib p molekuli ainet P ning q molekuli ainet Q . Vaatame näiteks keemilist reaktsiooni



siin reageerib 2 molekuli vesinikku ja üks molekul hapnikku ning reaktsiooni tulemuseks on kaks molekuli vett. Termodünaamikas ja kineetikas kirjutatakse üldine keemiline reaktsioon kujul

$$0 = \sum_B \nu_B B,$$

kus võetakse summa üle kõigi ainete. Nii lähteainete kui ka saaduste jaoks on molekulide arvud määratud kordajaga ν_B , kusjuures lähteainel ja saadusel on erinev märk. Seega saame antud valemi kirjutada kujul

$$0 = -aA - bB + pP + qQ + \dots = \nu_A A + \nu_B B + \nu_P P + \nu_Q Q + \dots$$

Keemilise reaktsiooni vesiniku ja hapniku jaoks võime kirjutada kujul

$$0 = -2H_2 - O_2 + 2H_2O.$$

Keemilise reaktsiooni kiirus.

Olgu n_{A0} algne ainehulk aine A jaoks ajahetkel $t = 0$ ning olgu n_A ainehulk ajahetkel t olgu reaktsioonimäär ξ , siis saame

$$n_A = n_{A0} + \nu_A \xi.$$

Tähistame reaktsioonimäära muutumise kiirust aja järgi r :

$$r = \frac{d\xi}{dt}.$$

See kiirus on esitatav ka ainehulga muutumise kiirusena iga aine jaoks, kui leiame tuletise n_A avaldisest ja arvestame, et n_{A0} ja ν_A on konstandid:

$$\frac{dn_A}{dt} = \nu_A \frac{d\xi}{dt}.$$

Seega saame avaldada:

$$r = \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{\nu_A} \frac{dn_A}{dt}.$$

Füüsikalises keemias kasutatakse ainehulga asemel reaktsiooni kiiruse avaldamisel aine kontsentratsiooni, mis tähistatakse nurksulgudega: aine A kontsentratsioon ruumala V jaoks on esitatav:

$$[A] = \frac{n_A}{V}.$$

Siis reaktsiooni kiiruse aine A kontsentratsiooni jaoks saame:

$$\nu = \frac{r}{V} = \frac{1}{\nu_A} \frac{d[A]}{dt}.$$

Üldise keemilise reaktsiooni jaoks võime kirjutada reaktsiooni kiiruse järgmiselt:

$$\nu = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{p} \frac{d[P]}{dt} = \frac{1}{q} \frac{d[Q]}{dt} = \dots$$

Keemilise reaktsiooni kiiruse vesiniku ja hapniku näite jaoks saame kirjutada kujul

$$\nu = -\frac{1}{2} \frac{d[H_2]}{dt} = -\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[H_2O]}{dt}.$$

Keemilise reaktsiooni toimumise mehhanism on üldiselt keeruline, meie vaatleme ainult lihtsamaid reaktsioone, mille kiirus sõltub ainult lähteainete kogustest, sellise reaktsiooni kiirus on avaldatav järgmiselt:

$$\nu = k[A]^\alpha [b]^\beta \dots,$$

kus k on reaktsiooni **kiiruskonstant** ja suurused α, β, \dots defineerivad reaktsiooni **järgu**. Konstant α annab reaktsiooni järgu vastavalt lähteaine A kogusele, konstant β annab reaktsiooni järgu vastavalt lähteaine B kogusele jne. Summa $\alpha + \beta + \dots$ annab kogu **reaktsiooni järgu**.

Näiteks kui reageerib üks molekul lähteainet A , siis on tegemist esimest järku reaktsiooniga, kui reageerib kaks molekuli lähteainet A , siis on tegemist teist järku reaktsiooniga. Kui reaktsioonis osaleb kaks lähteainet $A+B$, mida mõlemat on üks molekul, siis reaktsiooni järgu annab nende ainete molekulide summa ehk tegemist on teist järku reaktsiooniga. **Esimest järku keemilise reaktsiooni kiirus**, kui reageerib üks molekul lähteainet A :

$$\nu = -\frac{d[A]}{dt} = k[A].$$

Lihtsuse mõttes tähistame aine A kontsentratsiooni $[A]$ ajahetkel t muutujaga x ,

$$\frac{dx}{dt} = -kx \quad \left| : x \right.$$

$$\frac{1}{x} \frac{dx}{dt} = -k \quad \left| \cdot dt \right.$$

$$\frac{dx}{x} = -k dt.$$

Nüüd on tegu eraldatud muutujatega võrrandiga. Integreerides saame:

$$\ln|x| = -kt + C,$$

järelikult

$$x = Ce^{-k \cdot t}.$$

Leiame C väärtuse, olgu ajahetkel $t = 0$ aine kontsentratsioon võrdne konstandiga:

$$x(0) = x_0,$$

siis

$$x_0 = Ce^{-k \cdot 0} = C.$$

Siit saame, et

$$C = x_0.$$

Seega saab aine A kontsentratsiooni arvutada igal ajahetkel kahaneva eksponent-funktsiooni kaudu :

$$x = x_0 e^{-kt}, \quad [A] = [A]_0 e^{-kt}.$$

Teist järku keemilise reaktsiooni kiirus, kui reageerib kaks molekuli lähteainet A :

$$\nu = -\frac{1}{2} \frac{d[A]}{dt} = [A]^2$$

ehk

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -2kx^2, & \Big| : x^2 \\ \frac{1}{x^2} \frac{dx}{dt} &= -2k, & \Big| \cdot (-dt) \\ -\frac{dx}{x^2} &= 2kdt. \end{aligned}$$

Integreerides saame:

$$\frac{1}{x} = 2kt + C.$$

Leiame C väärtuse algtingimusest: olgu ajahetkel $t=0$ aine kontsentratsioon võrdne konstandiga ehk $x(0) = x_0$, siis

$$\frac{1}{x_0} = 0 + C.$$

Siit saame, et $C = 1/x_0$ ja

$$\frac{1}{x} = 2kt + \frac{1}{x_0}.$$

Seega saab aine A kontsentratsiooni arvutada igal ajahetkel järgmiselt:

$$x = \frac{x_0}{1 + 2ktx_0}, \quad [A] = \frac{[A]_0}{1 + 2kt[A]_0}.$$

Teist järku keemilise reaktsiooni $A+B \rightarrow$ saadused jaoks reaktsiooni kiirus avaldub:

$$\nu = -\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = k[A][B].$$

Olgu algtingimused lähteainete esialgsete kontsentratsioonide jaoks järgmised:

$$[A]_0 = a, \quad [B]_0 = b.$$

Seega ajahetkel t on ainete kontsentratsioonid vastavalt

$$[A] = a - x, [B] = b - x$$

ja vastav reaktsiooni kiirus on

$$-\frac{d(a-x)}{dt} = \frac{dx}{dt} = k(a-x)(b-x).$$

Lahendus sõltub algtingimustest. Vaatame kõigepealt juhtu, kus $a = b$.

$$\frac{dx}{dt} = k(a-x)^2, \quad \Big| : \frac{(a-x)^2}{dt}$$

$$\frac{dx}{(a-x)^2} = k dt.$$

Nüüd on tegu eraldatud muutujatega võrrandiga. Integreerides saame:

$$\frac{1}{a-x} = kt + C.$$

Leiame C väärtuse algtingimusest, ajahetkel $t = 0$ on aine A kontsentratsioon $a - x$ võrdne $[A]_0 = a$, sest $x(0) = 0$

$$\frac{a}{a} = 0 + C.$$

Seega

$$\frac{1}{a-x} = kt + \frac{1}{a}.$$

Aine A kontsentratsiooni saame arvutada igal ajahetkel järgmiselt:

$$a - x = \frac{a}{1 + akt}, \quad [A] = \frac{[A]_0}{1 + kt[A]_0}.$$

Vaatame nüüd juhtu, kus $a \neq b$. Siis

$$\frac{dx}{dt} = k(a-x)(b-x), \quad \Big| : \frac{(a-x)(b-x)}{dt}$$

$$\frac{dx}{(a-x)(b-x)} = k dt.$$

Integreerimiseks peame lahutama murru osamurdude summaks

$$\frac{1}{(a-x)(b-x)} = \frac{A}{a-x} + \frac{B}{b-x} = \frac{A(b-x) + B(a-x)}{(a-x)(b-x)}.$$

Leiame määramata kordajad asendades $x = b$ ja $x = a$, siis

$$A = \frac{1}{b-a}, \quad B = \frac{1}{a-b}.$$

Saime

$$\frac{dx}{(a-x)(b-a)} + \frac{dx}{(a-b)(b-x)} = k dt.$$

Integreerime mõlemat võrrandi poolt, saame

$$-\frac{1}{b-a} \ln(a-x) - \frac{1}{a-b} \ln(b-x) = kt + C,$$

$$\frac{1}{b-a} \left(\ln \frac{b-x}{a-x} \right) = kt + C.$$

Algtingimusest $x(0) = 0$, saame

$$C = \frac{1}{b-a} \ln \left(\frac{b}{a} \right).$$

Seega üldlahend on kujul

$$\frac{1}{b-a} \left(\ln \frac{b-x}{a-x} \right) = kt + \frac{1}{b-a} \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$

ehk

$$\frac{1}{b-a} \ln \left(\frac{a(b-x)}{b(a-x)} \right) = kt, \quad \frac{1}{[B]_0 - [A]_0} \ln \left(\frac{[A]_0[B]}{[B]_0[A]} \right) = kt.$$

5.3.2. HOMOGEENSED DIFERENTSIAALVÕRRANID

Homogeensed funktsioonid

Olgu D mingi piirkond xy -tasandil, mis koos iga punktiga $(x, y) \in D$ sisaldab ka kiire (tx, ty) , $t > 0$.

Definitsioon 5.12. Piirkonnas D määratud funktsiooni $f(x, y)$ nimetatakse **k -astme homogeenseks funktsiooniks**, kui iga $(x, y) \in D$ ja iga $t > 0$ korral kehtib võrdus

$$f(tx, ty) = t^k f(x, y),$$

kus k on reaalarv ja $t > 0$.

Üldjuhul, n -muutuja funktsiooni korral, **k -astme homogeenseks funktsiooniks** nimetatakse funktsiooni $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, kui kehtib võrdus

$$f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^k f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

kõikide x_1, x_2, \dots, x_n väärtuste ja iga t väärtuste korral.

Näide 5.9. Leida järgmiste homogeenste funktsioonide jaoks aste k .

$$\begin{aligned} \text{a) } f(x, y) &= ax + by, \\ f(tx, ty) &= atx + bty = t(ax + by) = tf(x, y). \end{aligned}$$

Antud funktsioon on esimese astme homogeenne funktsioon ehk $k = 1$

$$\begin{aligned} \text{b) } f(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2, \\ f(tx, ty, tz) &= (tx)^2 + (ty)^2 + (tz)^2 = t^2(x^2 + y^2 + z^2) = t^2 f(x, y, z). \end{aligned}$$

Tegemist on teise astme homogeenste funktsiooniga ehk $k = 2$.

$$\begin{aligned} \text{c) } f(x, y) &= \frac{x + y}{x^4 - y^4}, \\ f(tx, ty) &= \frac{tx + ty}{(tx)^4 - (ty)^4} = \frac{t(x + y)}{t^4(x^4 - y^4)} = t^{-3} f(x, y). \end{aligned}$$

Tegemist on (-3). astme homogeenste funktsiooniga, $k = -3$.

Euleri teoreem. Kui funktsioon $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ on k -astme homogeenne funktsioon, siis

$$x_1 f'_{x_1} + x_2 f'_{x_2} + \dots + x_n f'_{x_n} = k f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Näide 5.10. Näidata Euleri teoreemi väite kehtivust järgmise homogeenste funktsiooni jaoks

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

$$k = 2. \quad f'_x = 2x, \quad f'_y = 2y, \quad f'_z = 2z,$$

$$x f'_x + y f'_y + z f'_z = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 2f(x, y, z).$$

Näide 5.11. Näidata Euleri teoreemi väite kehtivust, kui

$$f(x, y) = \frac{x}{y}.$$

$$f(tx, ty) = \frac{tx}{ty} = t^0 \frac{x}{y}$$

0. järku ehk $k = 0$, siis saame

$$f'_x = \frac{1}{y}, \quad f'_y = -\frac{x}{y^2},$$

$$xf'_x + yf'_y = \frac{x}{y} - y\frac{x}{y^2} = 0 = 0f(x, y, z).$$

Näide 5.12. Näidata Euleri teoreemi väite kehtivust, kui

$$f(x, y) = \frac{x + y}{x^4 - y^4}, \quad k = -3.$$

$$f'_x = \frac{x^4 - y^4 - 4x^3(x + y)}{(x^4 - y^4)^2}, \quad f'_y = \frac{x^4 - y^4 - 4y^3(x + y)}{(x^4 - y^4)^2},$$

$$\begin{aligned} xf'_x + yf'_y &= x \frac{x^4 - y^4 - 4x^3(x + y)}{(x^4 - y^4)^2} - y \frac{x^4 - y^4 - 4y^3(x + y)}{(x^4 - y^4)^2} = \\ &= \frac{x^5 - xy^4 - 4x^4(x + y) - yx^4 + y^5 + 4y^4(x + y)}{(x^4 - y^4)^2} = \frac{-3(x + y)(x^4 - y^4)}{(x^4 - y^4)^2} = \\ &= -3f(x, y, z). \end{aligned}$$

Homogeensed diferentsiaalvõrrandid

Definitsioon 5.13. Homogeenseks esimest järku diferentsiaalvõrrandiks nimetatakse diferentsiaalvõrrandit

$$y' = f(x, y),$$

kui $f(x, y)$ on 0-astme homogeenne funktsioon:

$$f(tx, ty) = f(x, y), \quad t > 0.$$

Homogeenne diferentsiaalvõrrand on esitatav kujul

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right),$$

kus $f(y/x)$ sõltub muutujate y ja x suhtest.

HOMOGEENSE DIFERENTSIAALVÕRRANDI LAHENDAMINE ÜLDKUJUL

Homogeenne diferentsiaalvõrrand **taandub eralduvate muutujatega võrrandiks**, kui teha järgmine muutuja vahetus

$$z = \frac{y}{x}, \quad y = zx,$$

kus $z = z(x)$ on argumenti x funktsioon.

Muutuja vahetusega peame leidma uue muutuja **diferentsiaali**, selleks leiame avaldise $y = zx$ tuletise argumenti x järgi

$$\frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx}.$$

Asendame saadud seose (??), saame võrrandi uue muutuja $z = z(x)$ kaudu järgmiselt:

$$z + x \frac{dz}{dx} = f(z).$$

Saadud diferentsiaalvõrrand on muutuja z suhtes eralduvate muutujatega võrrand, lahendame saadud võrrandi üldkujul

$$z dz = (f(z) - z) dx, \quad | : x(f(z) - z)$$

$$\frac{dz}{f(z) - z} = \frac{dx}{x},$$

$$\int \frac{dz}{f(z) - z} = \int \frac{dx}{x}.$$

$$\int \frac{dz}{f(z) - z} = \ln |x| + C.$$

Kui teostame integreerimise ja asendame otsitava z tagasi suhtega y/x , jõuame esialgse diferentsiaalvõrrandi üldlahendini. Kuna üldlahendis on tegemist jagatise-ga, siis **valem ei kehti juhul** kui

$$(z) - z = 0 \text{ ehk } f(z) = z.$$

Vaatleme seda juhtu eraldi

$$f(z) = z, \quad f\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{y}{x}.$$

Tegemist on eralduvate muutujatega võrrandiga, esialgne võrrand saab kuju

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x},$$

$$dy = \frac{y}{x} dx, \quad | : y$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x},$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x},$$

$$\ln |y| = \ln |x| + \ln C.$$

Juhul kui kõikides liikmetes esineb naturaalogaritm, on mõistlik võtta naturaalogaritm ka integreerimiskonstandist, sellega asendasime konstandi teise constandiga $\ln C$, $C > 0$. Järgnevalt saame kasutada naturaalogaritmi omadusi ja teisendada summa korrutiseks või jagatiseks. Edasi tuleks mõlemad võrrandi pooled tõsta arvu e astmeks (võib kirjutada kujul $\uparrow e$), et avaldada otsitav funktsioon y .

$$\ln |y| = \ln |xC|, \uparrow e$$

$$e^{\ln |y|} = e^{\ln |xC|},$$

$$y = Cx.$$

Näide 5.13. Leida homogeenne diferentsiaalvõrrandi üldlahend

$$y' = \frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2.$$

Lahendamiseks kordame kõiki samme, mida tegime lahendamise üldkujul, kõigepealt teeme muutuja vahetuse ja arvutame diferentsiaali:

$$\text{m.v. } \frac{y}{x} = z, \quad y = zx, \quad \frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx}.$$

Asendame võrrandisse:

$$z + x \frac{dz}{dx} = z - z^2.$$

Oleme saanud eralduvate muutujatega diferentsiaalvõrrandi, mille lahendamiseks korrutame võrrandi kõigepealt suurusega dx :

$$z dx + x dz = (z - z^2) dx,$$

Eraldame muutujad ja integreerime

$$z dz = (z - z^2 - z) dx, \quad | : xz^2$$

$$\frac{dz}{z^2} + \frac{dx}{x} = 0,$$

$$\int \frac{dz}{z^2} + \int \frac{dx}{x} = C,$$

$$-\frac{1}{z} + \ln|x| = \ln C, \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{1}{z} = \ln|x| + \ln C.$$

Lõpuks asendame tagasi muutuja vahetuse avaldise kaudu

$$\frac{x}{y} = \ln|xC|.$$

Saime võrrandi üldlahendi:

$$y = \frac{x}{\ln|xC|}.$$

Homogeenseks diferentsiaalvõrrandiks taandub võrrand kujul

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

kus $P(x, y), Q(x, y)$ on ühe ja sama astme homogeensed funktsioonid. Selleks tuleks võrrandit läbi jagada argumendi x sellise astmega x^a , mis on võrdne võrrandis oleva argumendi y kõrgeima astmega.

Näide 5.14. Leida diferentsiaalvõrrandi

$$(y^2 - x^2) dx - 2xy dy = 0$$

erilahend, mis rahuldab algtingimust

$$y(1) = 2.$$

$$(y^2 - x^2) dx - 2xy dy = 0, \quad | : x^2 dx$$

$$\frac{y^2 - x^2}{x^2} - 2\frac{y}{x} \frac{dy}{dx} = 0, \quad \frac{y^2}{x^2} - 1 - 2\frac{y}{x} \frac{dy}{dx} = 0.$$

$$\text{m.v. } \frac{y}{x} = z, \quad y = zx, \quad \frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx},$$

$$z^2 - 1 - 2z \left(z + x \frac{dz}{dx} \right) = 0, \quad | \cdot dx$$

$$(-z^2 - 1) dx - 2zxdz = 0, \quad | : -(z^2 + 1)x$$

$$\frac{dx}{x} - \frac{2z}{-(z^2 + 1)} dz = 0.$$

$$\int \frac{dx}{x} + \int \frac{2z}{z^2 + 1} dz = C,$$

$$\text{m.v } u = z^2 + 1, \quad du = 2zdz$$

$$\ln|x| + \ln|z^2 + 1| = \ln C,$$

$$\begin{aligned}\ln |x(z^2 + 1)| &= \ln C, \quad \uparrow e \\ x(z^2 + 1) &= C, \\ x \left(\left(\frac{y}{x} \right)^2 + 1 \right) &= C, \\ \left(\frac{y}{x} \right)^2 &= \frac{C}{x} - 1, \quad |x^2\end{aligned}$$

Võrrandi üldlahend on kujul

$$y^2 = Cx - x^2.$$

Erialhendi leidmiseks asendame üldlahendisse algtingimuse:

$$y(1) = 2 : \quad 2^2 = C - 1,$$

$$C = 5.$$

Võrrandi erilahend on kujul

$$y^2 = 5x - x^2.$$

5.3.3. DIFERENTSIAALVÕRRAND, MIS SISALDAB MURDLINEAARSET AVALDIST

Diferentsiaalvõrrand, mis sisaldab murdlineaarset avaldist, on kujul

$$y' = F \left(\frac{a_1x + a_2y + a_3}{b_1x + b_2y + b_3} \right).$$

Kui $a_3 = b_3 = 0$, siis tegemist on homogeenise diferentsiaalvõrrandiga. Võrrandit,

$$y' = g(x, y)$$

kus $g(x, y)$ on kas murdlineaarne avaldis x ja y suhtes või sellef funktsioon

$$g(x, y) = F \left(\frac{a_1x + a_2y + a_3}{b_1x + b_2y + b_3} \right),$$

saab taandada homogeenseks võrrandiks (või eralduvate muutujatega võrrandiks) muutuja vahetusega, mis oleneb determinandi D väärtusest, determinandi moodustame x ja y kordajatest murru lugejas ja nimetajas

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} &\neq 0, & \text{m.v. } x &= X + u \quad y = Y + v, \\ \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} &= 0, & \text{m.v. } z &= a_1x + a_2y.\end{aligned}$$

Kui $D \neq 0$, muutuja vahetuses sisalduvad konstandid u ja v tuleb määrata nii, et muutujale X ja Y üle minnes on vabaliikmed saadavas mirdlineaarses avaldises võrdsed nulliga. Selleks lahendame lineaarse võrrandisüsteemi tundmatute konstantide u ja v suhtes:

$$\begin{cases} a_1u + a_2v + a_3 = 0, \\ b_1u + b_2v + b_3 = 0. \end{cases}$$

Funktsiooni F argument peale muutuja vahetust on kujul

$$\frac{a_1X + a_2Y}{b_1X + b_2Y}.$$

Kui $D = 0$, siis ei saa u ja v üheselt määrata ja seetõttu kasutame muutuja vahetust $z = a_1x + a_2y$. Peale muutuja vahetust saame eralduvate muutujatega võrrandi.

Näide 5.15. Leida diferentsiaalvõrrandi erilahendi, mis rahuldab tingimust $y(0) = -2$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x - y + 1}{-2x + y + 2}.$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\text{m.v. } z = 2x - y, \quad z' = 2 - y', \quad \frac{dz}{dz} = 2 - \frac{dy}{dx}.$$

$$2 - \frac{dz}{dx} = \frac{z + 1}{-z + 2},$$

$$\frac{dz}{dx} = 2 - \frac{z + 1}{-z + 2}$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{-2x + 4 - z - 1}{-z + 2},$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{-3z + 3}{2 - z}. \quad | \cdot dx$$

$$dz = \frac{-3z + 3}{2 - z} dx, \quad | : \frac{-3z + 3}{2 - z}$$

$$\frac{2 - z}{3(1 - z)} dz = dx$$

$$\int \frac{2 - z}{3(1 - z)} dz = \int dx.$$

Integreerimiseks jagame arvu 2 liidetavaks, mis võimaldab murru esitada kahe murru summana:

$$\int \frac{2 - z + 1}{3(1 - z)} dz = \int dx,$$

$$\frac{1}{3} \int \frac{1-z}{1-z} dz + \frac{1}{3} \int \frac{dz}{1-z} = \int dx,$$

$$\frac{1}{3}z - \frac{1}{3} \ln|1-z| = x + C, \quad | \cdot 3$$

$$z - \ln|1-z| = 3x + C.$$

Minnes tagasi endisele muutujale, kui $z = 2x - y$, saame üldlahendi kujul

$$2x - y - \ln|1 - 2x + y| = 3x + C.$$

Erilahendi saamiseks asendame algtingimuse üldlahendisse:

$$y(0) = -2 : 2 \cdot 0 + 2 - \ln|1 - 2 \cdot 0 - 2| = 3 \cdot 0 + C,$$

$$C = 2 - \ln|1 - 2x + y| = 3x + 2,$$

$$-x - y - \ln|1 - 2x + y| - 2 = 0,$$

$$x + y + \ln|1 - 2x + y| + 2 = 0.$$

Näide 5.16. Lahendada diferentsiaalvõrrand

$$y' = \frac{x-y}{x+y-3} + 1.$$

Viime võrrandi paremal pool oleva murru ühisele nimetajale, saame

$$y' = \frac{x-y+x+y-3}{x+y-3} = \frac{2x-3}{x+y-3}.$$

Teeme muutuja vahetuse vastavalt determinandi väärtusele

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

$$\text{m.v. } x = X + u, \quad y = Y + v, \quad dx = dX, \quad dy = dY,$$

$$Y' = \frac{2x - 2u - 3}{X + u + Y + v - 3},$$

$$\begin{cases} 2u - 3 = 0, \\ u + v - 3 = 0, \end{cases} \Rightarrow u = \frac{3}{2}, \quad v = 3 - u = \frac{3}{2}.$$

Saadud võrrand on homogeenne diferentsiaalvõrrand kujul:

$$\frac{dY}{dX} = \frac{2X}{X + Y} = \frac{2X}{X \left(1 + \frac{Y}{X}\right)},$$

Lahendame homogeense võrrandi

$$\text{m.v. } \frac{Y}{X} = z, \quad \frac{dY}{dX} = z + X \frac{dz}{dX},$$

$$z + X \frac{dz}{dX} = \frac{2}{1+z} dX, \quad | \cdot dX$$

$$z dX + X dz = \frac{2}{1+z} dX,$$

$$X dz = \left(\frac{2}{1+z} - z \right) dX,$$

$$X dz = - \left(\frac{z^2 + z - 2}{1+z} \right) dX, \quad | : X \left(\frac{z^2 + z - 2}{1+z} \right)$$

$$\frac{1+z}{z^2 + z - 2} dz = - \frac{dX}{X},$$

$$\int \frac{1+z}{z^2 + z - 2} dz = - \int \frac{dX}{X}.$$

Võrrandi vasaku poole integreerimiseks peame nimetaja lahutama teguriteks ning

murru lahutama osamurdude summaks

$$\begin{aligned}
 z^2 + z - 2 &= (z + 2)(z - 1), \\
 \int \frac{1 + z}{z^2 + z - 2} dz &= \int \frac{A}{z + 2} dz + \int \frac{B}{z - 1}, \\
 1 + z &= A(z - 1) + B(z + 2), \\
 A &= \frac{1}{3}, \quad B = \frac{2}{3}. \\
 \frac{1}{3} \int \frac{dz}{z + 2} + \frac{2}{3} \int \frac{dz}{z - 1} &= - \int \frac{dX}{X}, \\
 \frac{1}{3} \ln |z + 2| + \frac{2}{3} \ln |z - 1| &= - \ln |X| + \ln C, \quad | \cdot 3 \\
 \ln |z + 2| + 2 \ln |z - 1| &= -3 \ln |X| + \ln C, \\
 \ln |(z + 2)(z - 1)^2| &= \ln \left| \frac{C}{X^3} \right|, \quad | \uparrow e \\
 (z + 2)(z - 1)^2 &= \frac{C}{X^3},
 \end{aligned}$$

Asendades muutuja vahetuse avaldise tagasi, saame

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{Y}{X} + 2 \right) \left(\frac{Y}{X} - 1 \right)^2 &= \frac{C}{X^3}, \\
 \left(\frac{Y + 2X}{X} \right) \left(\frac{Y - X}{X} \right)^2 &= \frac{C}{X^3}, \\
 \frac{(Y + 2X)(Y - X)^2}{X^3} &= \frac{C}{X^3}, \\
 (Y + 2X)(Y - X)^2 &= C,
 \end{aligned}$$

Lõpuks asendame esialgse muutuja vahetuse avaldise:

$$\begin{aligned}
 x &= X + \frac{3}{2}, \quad y = Y + \frac{3}{2}. \\
 \left(y - \frac{3}{2} + 2 \left(x - \frac{3}{2} \right) \right) \left(y - \frac{3}{2} - \left(x - \frac{3}{2} \right) \right)^2 &= C.
 \end{aligned}$$

Diferentsiaalvõrrandi üldlahend on kujul

$$\left(y + 2x - \frac{9}{2} \right) (y - x)^2 = C.$$

5.3.4. LINEAARSED DIFERENTSIAALVÕRRANDID

Definitsioon 5.14

Linearseks esimest järku diferentsiaalvõrrandiks nimetatakse võrrandit, mis on lineaarne otsitava funktsiooni y ja selle tuletise y' suhtes.

Lineaarses diferentsiaalvõrrandis on nii otsitav funktsioon kui ka otsitava funktsiooni tuletis esimeses astmes.

Hariliku esimest järku lineaarse diferentsiaalvõrrandi üldkuju on

$$P_0(x)y' + P_1(x)y = Q(x),$$

kus $P_0(x)$, $P_1(x)$ ja $Q(x)$ on antud funktsioonid ja $y = y(x)$ on otsitav.

Teoreem 5.2

Olgu võrrandi $P_0(x)y' + P_1(x)y = Q(x)$ kordajad $P_0(x)$, $P_1(x)$ ja $Q(x)$ **pi-devad** funktsioonid vahemikus (a, b) , kusjuures $P_0(x) \neq 0$ kõigi $x \in (a, b)$ korral.

Olgu $x_0 \in (a, b)$ ja $y_0 \in (-\infty, \infty)$ mingid etteantud arvud.

Siis on **võrrandil**

$$P_0(x)y' + P_1(x)y = Q(x),$$

olemas **parajasti üks lahend**

$$y = y(x),$$

mis rahuldab tingimust

$$y(x_0) = y_0.$$

Kui kordaja $P_0(x)$ erineb nullist, saab võrrandi sellega läbi jagada, tulemuseks on **lineaarne esimest järku diferentsiaalvõrrand kujul**

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x), \quad (5.4)$$

kus $P(x)$, $Q(x)$ on funktsioonid, mis sõltuvad muutujast x .

Funktsiooni $Q(x)$ nimetatakse **võrrandi vabaliikmeks**.

Kui $Q(x) \equiv 0$, siis nimetatakse võrrandit (5.4) **linearseks homogenseks diferentsiaalvõrrandiks**. Siin omab sõna „homogeenne“ teistsugust tähendust (võrrelda võib homogeensete ja mittehomoogeensete lineaarvõrrandisüsteemidega). Võrrandi (5.4) lahendamiseks vaatame kolme erinevat meetodit.

1. Integreeruvusteguriga korrutamise meetod.

Vaatame funktsiooni

$$\mu = e^{p(x)},$$

kus funktsioon $p(x)$ on funktsiooni $P(x)$ mingi algfunktsioon: $p'(x) = P(x)$. Funktsiooni $\mu = e^{p(x)}$ nimetatakse lineaarse diferentsiaalvõrrandi (5.4) **integreeruvusteguriks**.

Korrutame võrrandit (5.4) funktsiooniga $\mu = e^{p(x)}$, saame võrrandi kujul

$$y'e^{p(x)} + P(x)ye^{p(x)} = Q(x)e^{p(x)}.$$

Võrrandi vasak pool on korrutise $ye^{p(x)}$ tuletis, seega saame kirjutada võrrandi kujul

$$\frac{d}{dx} (ye^{p(x)}) = Q(x)e^{p(x)}.$$

Integreerides saame

$$ye^{p(x)} = \int Q(x)e^{p(x)} dx + C.$$

Otsitava funktsiooni y avaldamiseks korrutame võrrandi mõlemat poolt suurusega $e^{-p(x)}$, saame

$$y = e^{-p(x)} \left(\int Q(x)e^{p(x)} dx + C \right).$$

ehk

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right).$$

Oleme saanud valemi lineaarse diferentsiaalvõrrandi lahendamiseks, üldlahendi samal kujul saame ka kasutades muutuja vahetusega või konstantide varieerimise meetodiga lahendust.

2. Muutuja vahetusega lahendus.

Otsitav funktsioon on kahe esialgu tundmatu funktsiooni $u(x)$ ja $v(x)$ korrutis:

$$y = uv, \quad u = u(x), v = v(x)$$

Meie eesmärgiks on leida nende kahe funktsiooni avaldised. Selleks kõigepealt leiame korrutise tuletise valemi abil

$$\frac{dy}{dx} = v \frac{du}{dx} + u \frac{dv}{dx}. \quad (5.5)$$

Asendame võrrandisse (5.5) ja toome muutuja v sulgude ette:

$$v \frac{du}{dx} + u \frac{dv}{dx} + P(x)uv = Q(x),$$

$$v \left(\frac{du}{dx} + P(x)u \right) + u \frac{dv}{dx} = Q(x).$$

Funktsioonide u ja v kohta pole midagi eeldatud.

Nõuame, et sulgudes olev avaldis võrduks nulliga, siis saame kahest võrrandist koosneva süsteemi:

$$\frac{du}{dx} + P(x)u = 0, \quad (5.6)$$

$$u \frac{dv}{dx} = q(x). \quad (5.7)$$

Võrrand (5.6) on eralduvate muutujatega diferentsiaalvõrrand $u = u(x)$ suhtes. Eraldame muutujad ja integreerime, saame

$$\begin{aligned} \frac{du}{u} &= -P(x)dx, & \ln |u| &= -\int P(x)dx, \\ u &= e^{-\int P(x)dx}. \end{aligned} \quad (5.8)$$

Asendame saadud u avaldise võrrandisse (5.7), saame

$$\begin{aligned} e^{-\int P(x)dx} \frac{dv}{dx} &= Q(x), & \frac{dv}{dx} &= Q(x)e^{\int P(x)dx}, \\ v &= \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C. \end{aligned}$$

Me otsime lahendit kujul $y = u \cdot v$, seega lineaarse diferentsiaalvõrrandi

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

lahend on kujul

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right).$$

Võrrandi praktilisel lahendamisel võib korrata iga kord seda mõttekäiku, samuti on võimalik võrrandi lahendamisel asendada lahendivalemisse konkreetset funktsioonid $P(x)$ ja $Q(x)$ ja leida lahend valemi järgi.

3. Konstandi varieerimise meetod (Lagrange'i meetod).

Konstandi varieerimise meetodil lahendus taandub samuti kahe eralduvate muutujatega diferentsiaalvõrrandi lahendamisele. Kõigepealt lahendame vastava homogeense võrrandi

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0.$$

See on eralduvate muutujatega võrrand

$$\begin{aligned}\frac{dy}{y} &= -P(x)dx, \\ \ln |y| &= -\int P(x)dx + \ln C, \\ \ln \left| \frac{y}{C} \right| &= -\int P(x)dx, \\ \frac{y}{C} &= e^{-\int P(x)dx}, \\ y_h &= Ce^{-\int P(x)dx}.\end{aligned}\tag{5.9}$$

Lineaarse mittehomogeense diferentsiaalvõrrandi (5.4) lahendit otsime kujul (5.9), kus **konstanti** C loeme otsitavaks argumendi x funktsiooniks. Seega

$$y = C(x)e^{-\int P(x)dx},$$

Leiame tuletise otsitavast funktsioonist arvestades, et $C(x)$ on tundmatu funktsioon, mis sõltub argumentidist x :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dC(x)}{dx}e^{-\int P(x)dx} + C(x)e^{-\int P(x)dx}(-P(x)).$$

Asendame y ja dy/dx mittehomogeensesse diferentsiaalvõrrandisse, saame

$$\frac{dC(x)}{dx}e^{-\int P(x)dx} + C(x)e^{-\int P(x)dx} \cdot (-P(x)) + P(x)C(x)e^{-\int P(x)dx} = Q(x),$$

$$\frac{dC(x)}{dx} = Q(x)e^{\int P(x)dx},$$

$$C(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C.$$

Asendame saadud $C(x)$ avaldise lahendisse (5.9), saame

$$y = \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C \right) e^{-\int P(x)dx}.$$

Saime lineaarse võrrandi üldlahendi jaoks sama valemi.

Näide 5.17. Lahendada lineaarne diferentsiaalvõrrand

$$y' + y = x.$$

1) Lahendame kõigepealt võrrandi **integreeruvusteguriga korrutades**.

Kuna antud võrrandis $P(x) = 1$ ja $Q(x) = x$, siis integreeruvustegur $e^{\int P(x)}$ on

$$e^{\int P(x)} = e^{\int 1 dx} = e^x,$$

Siis korrutame võrrandi vasakut ja paremat poolt funktsiooniga e^x , saame

$$e^x y' + e^x y = e^x x,$$

kuna $e^x y' + e^x y = (e^x y)'$, saame võrrandi kujul

$$\frac{d}{dx} e^x y = x e^x,$$

integreerimisel saame

$$e^x y = e^x (x - 1) + C$$

ehk

$$y = x - 1 + C e^{-x}$$

2) **Konstandi varieerimise meetodil** jaguneb lahendus kaheks osaks:

2.1) **vastav** lineaarne **homogeenne** võrrand on kujul $y' + y = 0$, mille lahendamisel saame

$$\frac{dy}{dx} + y = 0,$$

$$\frac{dy}{y} + dx = 0,$$

$$\ln |y| + x = \ln C,$$

$$\ln \left| \frac{y}{C} \right| = -x,$$

$$\frac{y}{C} = e^{-x}, \quad y_h = C e^{-x}.$$

2.2) **erilahendit** otsime kujul

$$y_h = C(x) e^{-x}.$$

Asendades y_h esialgsesse võrrandisse $y' + y = x$, saame

$$y'_h = C'(x) e^{-x} - C(x) e^{-x},$$

$$C'(x) e^{-x} - C(x) e^{-x} + C(x) e^{-x} = x,$$

$$C'(x) e^{-x} = x,$$

$$C'(x) = x e^x,$$

$$C(x) = \int x e^x dx = e^x (x - 1) + C_1$$

$$y = (e^x (x - 1) + C_1) e^{-x} = x - 1 + C_1 e^{-x}.$$

Lahendamiseks võib ka kohe funktsioonid asendada lahendivalemisse. Seega

$$\begin{aligned} y &= \left(\int Q(x) e^{P(x) dx} dx + C \right) e^{-\int P(x) dx} = \left(\int x e^{\int dx} dx + C \right) e^{-\int dx} = \\ &= \left(\int x e^x dx + C \right) e^{-x} = (e^x (x - 1) + C) e^{-x} = x - 1 + C e^{-x}. \end{aligned}$$

Näide 5.18. Lahendada lineaarne diferentsiaalvõrrand

$$y' - \frac{2x}{x^2 + 1}y = x\sqrt{x^2 + 1}.$$

Lahendame võrrandi muutuja vahetusega:

$$y = uv, \quad \frac{dy}{dx} = v\frac{du}{dx} + u\frac{dv}{dx}.$$

Asendame võrrandisse, saame

$$\begin{aligned} v\frac{du}{dx} + u\frac{dv}{dx} - \frac{2x}{x^2 + 1}uv &= x\sqrt{x^2 + 1}, \\ v\left(\frac{du}{dx} - \frac{2x}{x^2 + 1} \cdot u\right) + u\frac{dv}{dx} &= x\sqrt{x^2 + 1}, \\ \frac{du}{dx} - \frac{2x}{x^2 + 1}u &= 0, \\ \frac{du}{u} &= \frac{2x}{x^2 + 1}dx, \\ \ln|u| &= \ln|x^2 + 1|, \\ u &= x^2 + 1. \\ (x^2 + 1)\frac{dv}{dx} &= x\sqrt{x^2 + 1}, \\ dv &= \frac{x\sqrt{x^2 + 1}}{x^2 + 1}dx, \\ dv &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}dx, \\ v &= \sqrt{x^2 + 1} + C. \end{aligned}$$

Lahendiks on u ja v korrutis, seega $y = uv = (x^2 + 1)(\sqrt{x^2 + 1} + C)$.

Märkus. Mõned diferentsiaalvõrrandid kujul

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0,$$

mis on mittelineaarsed ühe muutuja suhtes, võivad osutuda lineaarseks teise muutuja suhtes. Siis võib vaadelda näiteks sõltumatu muutuja osas suurust y , siis $dy \neq 0$ ning jagades võrrandit suurusega dy , jõuame lineaarse võrrandini, kus otsitavaks on funktsioon $x = x(y)$.

Näide 5.19. Lahendada lineaarne diferentsiaalvõrrand

$$dx - (x \cos(y) + 2 \sin(2y))dy = 0$$

Jagame võrrandit suurusega dy , saame lineaarse võrrandi kujul

$$\frac{dx}{dy} - (\cos(y))x = \sin(2y).$$

Lahendamiseks asendame funktsioonid lahendivalemisse. Selles ülesandes

$$P(y) = -\cos(y), \quad Q(y) = \sin(2y),$$

seega

$$\begin{aligned} x &= \left(\int Q(y) \cdot e^{\int P(y)dy} dy + C \right) e^{-\int P(y)dy} \\ &= \left(\int \sin(2y) \cdot e^{\int -\cos(y)dy} dy + C \right) e^{-\int -\cos(y)dy} = \\ &= \left(\int \sin(2y) \cdot e^{-\sin(y)} dy + C \right) e^{\sin(y)}. \end{aligned}$$

Leiame integraali

$$\int \sin(2y) \cdot e^{-\sin(y)} dy.$$

Selleks teeme muutuja vahetuse

$$t = \sin(y), \quad dt = \cos(y)dy.$$

Kuna $\sin(2y) = 2 \sin(y) \cos(y)$, saame peale muutuja vahetust ja ositi integreerimist


$$\begin{aligned} \int \sin(2y) \cdot e^{\sin(y)} dy &= 2 \int t \cdot e^{-t} dt = 2(-te^{-t}) + 2 \int e^{-t} dt = -2te^{-t} - 2e^{-t} = \\ &= -2 \sin(Y)e^{-\sin(y)} - 2e^{-\sin(y)} + C_1, \end{aligned}$$

kus C_1 on suvaline konstant, mille võtame $C_1 = 0$, sest lahendivalemis on konstant C juba olemas. Asendame saadud tulemuse lahendivalemisse, saame võrrandi lahendiks järgmise avaldise

$$x = (-2 \sin(y)e^{-\sin(y)} - 2e^{-\sin(y)} + C) e^{\sin(y)} = Ce^{\sin(y)} - 2(1 + \sin(y)).$$

Lineaarsed diferentsiaalvõrrandid keemias*

Enamus keemilisi reaktsioone toimuvad mitmes elementaarses järgus ja nende kirjeldus protsessi kiiruse kohta hõlmab esimest järku diferentsiaalvõrrandit. Esimest järku protsess on kirjeldatav järgmise skeemiga:



Aine A koosneb alghetkel ($t = 0$) a molekulist ehk

$$[A]_0 = a$$

ja tema kontsentratsioon ajahetkel t on $a - x$ ehk

$$[A] = a - x.$$

Aine B tekib ainest A keemilise reaktsiooni käigus ja tema molekulide arv alghetkel on 0:

$$[B]_0 = 0$$

ja ajahetkel t on molekulide arv y ehk

$$[B] = y.$$

Aine C tekib ainest B keemilise reaktsiooni käigus ja tema molekulide arv alghetkel on 0:

$$[C]_0 = 0$$

ja ajahetkel t on $x - y$:

$$[C] = x - y.$$

Sellist protsessi saab modelleerida kahe esimest järku diferentsiaalvõrrandiga, millest esimene on eralduvate muutujatega diferentsiaalvõrrand ja teine on lineaarne.

$$\begin{cases} \frac{d[A]}{dt} = -k_1[A], & \frac{d(a-x)}{dt} = -k_1(a-x), \\ \frac{d[B]}{dt} = k_1[A] - k_2[B], & \frac{dy}{dt} = k_1(a-x) - k_2y. \end{cases}$$

Lahendades esimese võrrandi süsteemist, saame

$$a - x = ae^{-k_1t},$$

seejärel asendame saadud suuruse teise võrrandisse, saame muutuja y suhtes lineaarse võrrandi:

$$\frac{dy}{dt} + k_2y = k_1ae^{-k_1t}. \quad (5.10)$$

Lahendame selle võrrandi konstandi varieerimise meetodil. Lahendamiseks peame eemaldama, et $k_1 \neq k_2$. Kõigepealt lahendame võrrandile (5.10) vastava homogeense diferentsiaalvõrrandi

$$\frac{dy}{dt} + k_2y = 0, \quad \left| \cdot \frac{dt}{y} \right. \quad (5.11)$$
$$\frac{dy}{y} = -k_2dt.$$

Integreerides saame

$$\ln |y| = -k_2t + C_1.$$

Homogeense diferentsiaalvõrrandi (5.11) üldlahendiks on sellisel juhul

$$y = C_1 e^{-k_2 t}. \quad (5.12)$$

Otsime nüüd esialgse diferentsiaalvõrrandi (5.10) lahendit kujul

$$y = C_2(t) e^{-k_2 t},$$

asendame konstandi C_1 uue otsitava funktsiooniga muutujast t . See lahend peab rahuldama ka diferentsiaalvõrrandit (5.10). Asendame lahendi võrrandisse (5.10) ja teeme järgmised teisendused

$$\begin{aligned} \frac{d(C_2(t)e^{-k_2 t})}{dt} + k_2 C_2(t)e^{-k_2 t} &= k_1 a e^{-k_1 t}, \\ \frac{d(C_2(t))}{dt} e^{-k_2 t} - k_2 C_2(t)e^{-k_2 t} + k_2 C_2(t)e^{-k_2 t} &= k_1 a e^{-k_1 t}, \\ \frac{d(C_2(t))}{dt} e^{-k_2 t} &= k_1 a e^{-k_1 t}, \\ \frac{d(C_2(t))}{dt} &= k_1 a e^{(k_2 - k_1)t} \end{aligned}$$

Integreerides saame

$$C_2(t) = \frac{ak_1}{k_2 - k_1} e^{(k_2 - k_1)t} + C_3,$$

kus C_3 on integreerimiskonstant.

Asendame saadud $C_2(t)$ võrrandisse (5.12), saame diferentsiaalvõrrandi (5.10) lahendi kujul

$$y = \left(\frac{ak_1}{k_2 - k_1} e^{(k_2 - k_1)t} + C_3 \right) e^{-k_2 t}. \quad (5.13)$$

Leiame C_3 väärtuse kasutades algtingimust $y(0) = 0$, saame

$$C_3 = -\frac{ak_1}{k_2 - k_1}.$$

Asendame saadud konstandi C_3 väärtuse võrrandisse (5.13) ja saame lahendiks

$$y = \frac{ak_1}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}).$$

Lahendist on näha, miks pidime eeldama, et $k_1 \neq k_2$. Kui $k_1 = k_2$, saame lahendiks $y = [A]_0 k_1 t e^{-k_1 t}$. Saime ainete A , B ja C kontsentratsioonid ajahetkel t

$$\begin{cases} [A] = [A]_0 e^{-k_1 t}, \\ [B] = \begin{cases} \frac{[A]_0 k_1}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}), & k_1 \neq k_2, \\ [A]_0 k_1 t e^{-k_1 t}, & k_1 = k_2, \end{cases} \\ [C] = [A]_0 - [A] - [B] \end{cases}$$

5.3.5. BERNOULLI DIFERENTSIAALVÕRRAND

Definitsioon 5.15

Bernoulli diferentsiaalvõrrandiks nimetakse võrrandit kujul

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^a, \quad (5.14)$$

kus P ja Q on teadaolevad argumendi x funktsioonid, mis on pidevad vahemikus (c, d) ning a on mingi reaalarv. Eeldame, et $a \neq 0$ ja $a \neq 1$ (sest siis on tegemist lineaarse võrrandiga).

Bernoulli võrrand on teisendatav lineaarseks võrrandiks muutuja vahetusega

$$z = y^{1-a}$$

seejuures eeldame, et $y \neq 0$.

Enne muutuja vahetust **korrutame võrrandit** (5.14) suurusega y^{-a}

$$\frac{dy}{dx}y^{-a} + P(x)y^{1-a} = Q(x)$$

ja seejärel teeme muutuja vahetuse:

$$z = y^{1-a}, \quad \frac{dz}{dx} = (1-a)y^{-a}\frac{dy}{dx}, \quad \frac{dy}{dx}y^{-a} = \frac{dz}{dx} \cdot \frac{1}{1-a}$$

Asendame võrrandisse uue muutuja ja diferentsiaali:

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} \cdot \frac{1}{1-a} + P(x)z &= Q(x) \\ \frac{dz}{dx} + (1-a)P(x)z &= (1-a)Q(x) \end{aligned}$$

Saime uue muutuja z suhtes lineaarse võrrandi. Kui $a > 0$, siis on võrrandi lahendiks ka $y = 0$.

Näide 5.20. Lahendada Bernoulli diferentsiaalvõrrand

$$y' - 2xy = 2x^3y^2.$$

Võrrandis $a = 2$. Lahendamiseks kõigepealt jagame võrrandit suurusega y^2 , saame

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y^2} - \frac{2x}{y} &= 2x^3 \\ \text{m.v. } z = y^{1-2} = \frac{1}{y}, \quad \frac{dz}{dx} &= -\frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx} \\ -z' - 2xz &= 2x^3, \\ z' + 2xz &= -2x^3. \end{aligned}$$

Saime lineaarse diferentsiaalvõrrandi, mille üldlahendiks on

$$z = \left(\int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} dx + C \right) \cdot e^{-\int P(x)dx}.$$

$$z = \left(\int (-2x^3) \cdot e^{x^2} dx + C \right) \cdot e^{-x^2} = (-x^2 e^{x^2} + e^{x^2} + C) e^{-x^2} = 1 - x^2 + C e^{-x^2}$$

$$y = \frac{1}{1 - x^2 + C e^{-x^2}}.$$

Lisaks sellele rahuldab võrrandit konstantne funktsioon $y = 0$, mida ei ole võimalik saada üldlahendist konstandi C mitte ühelgi konkreetsetel väärtusel.

Näide 5.21. Lahendada Bernoulli diferentsiaalvõrrand

$$x^2(x-1)y' - y^2 - x(x-2)y = 0.$$

Jagame võrrandit suurusega $x^2(x-1)y^2$

$$\frac{y'}{y^2} - \frac{x(x-2)}{yx^2(x-1)} = \frac{1}{x^2(x-1)},$$

$$a = 2, \quad z = y^{1-2} = \frac{1}{y}, \quad s \frac{dz}{dx} = \frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx}.$$

$$z' - \frac{x-2}{x(x-1)}z = \frac{1}{x^2(x-1)},$$

$$z = \left(\int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} dx + C \right) \cdot e^{-\int P(x)dx},$$

$$z = \left(\int \frac{1}{x^2(x-1)} \cdot e^{\int -\frac{x-2}{x(x-1)}dx} dx + C \right) \cdot e^{-\int -\frac{x-2}{x(x-1)}dx},$$

$$\int -\frac{x-2}{x(x-1)} dx = \int \frac{A}{x} dx + \frac{B}{x-1} dx,$$

$$-\frac{x-2}{x(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1}$$

$$-(x-2) = A(x-1) + Bx, \quad A = -2, \quad B = 1$$

$$\int -\frac{x-2}{x(x-1)} dx = \int \frac{-2}{x} dx + \int \frac{1}{x-1} dx = -2 \ln|x| + \ln|x-1| = \ln \frac{x-1}{x^2},$$

$$e^{\ln \frac{x-1}{x^2}} = \frac{x-1}{x^2}.$$

$$z = \left(\int \frac{1}{x^2(x-1)} \cdot \frac{x-1}{x^2} dx + C \right) \cdot \frac{x^2}{x-1} = \left(-\frac{1}{3x^3} + C \right) \cdot \frac{x^2}{x-1},$$

$$y = \frac{1}{1 + C(x-1)}.$$

Näide 5.22. Lahendada võrrand $3x^2 dx - (x^3 + y + 1)dy = 0$.

Jagame võrrandit kõigepealt suurusega dy , saame võrrandi

$$3x^2 \frac{dx}{dy} - x^3 - y - 1 = 0,$$

Jagame võrrandit suurusega $3x^2$, saame

$$\frac{dx}{dy} - \frac{1}{3}x = \frac{y+1}{3}x^{-2}$$

Tegemist on Bernoulli võrrandiga, kus $x = x(y)$ on otsitav funktsioon ja $a = -2$.

Lineaarse võrrandi saamiseks teeme muutuja vahetuse

$$z = x^{1-(-2)} = x^3,$$

$$\frac{dz}{dx} = 3x^2 \frac{dx}{dy}.$$

Lineaarne võrrand on kujul

$$z' - z = y + 1.$$

Lineaarse võrrandi lahendiks saame funktsiooni

$$z = Ce^y - y - 2,$$

Asendame muutuja z avaldisega x^3 , saame ülesande lahendiks funktsiooni

$$x = (Ce^y - y - 2)^{\frac{1}{3}}$$

5.3.6. EKSAKTNE DIFERENTSIAALVÕRRAND

Definitsioon 5.16

Diferentsiaalvõrrandit kujul $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ nimetatakse **eksaktseks** ehk **täisdiferentsiaaliga** võrrandiks, kui leidub kahe muutuja funktsioon $u(x, y)$, nii et võrrandi vasak pool on võrdne selle funktsiooni täisdiferentsiaaliga:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy. \quad (5.15)$$

Eksaktsuse tingimus

Kui teadaolevad funktsioonid M ja N ning nende osatuletised $\partial M/\partial y$ ja $\partial N/\partial x$ on pidevad muutujate x, y mingis piirkonnas D , siis **võrrandi eksaktsuseks piirkonnas D on tarvilik ja piisav**, et iga $(x, y) \in D$ korral kehtib võrdus

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Eksaktse võrrandi võib kirjutada ka kujul

$$du(x, y) = 0,$$

Võrrandi **üldlahend** on kujul

$$u(x, y) = C.$$

Saadud võrdus määrab eksaktse võrrandi üldlahendi muutujate x, y piirkonnas, milles $M^2(x, y)dx + N^2(x, y)dy \neq 0$. Eksaktse võrrandi mistahes lahend on saadav üldlahendist konstandi C mingil konkreetsel väärtusel (konstant C saab omada ainult niisuguseid väärtusi, mis kuuluvad funktsiooni $u(x, y)$ väärtuste piirkonda). Funktsiooni $u(x, y)$ leidmiseks on mitmeid meetodeid. Vaatleme lähemalt neist kahte.

- 1) Lähtume võrdusest (5.15) ja leiame funktsiooni $u(x, y)$ järgmise võrrandisüsteemi abil:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = M(x, y), \\ \frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y). \end{cases}$$

Kõigepealt integreerime esimese võrduse mõlemaid pooli muutuja x järgi, kusjuures loeme muutuja y konstantseks.

$$u(x, y) = \int M(x, y)dx + C(y), \quad (5.16)$$

kus $C(y)$ on suvaline funktsioon muutujast y . Valime $C(y)$ nii, et oleks täidetud ka teine pool seosest:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y).$$

Selleks diferentseerime võrduse (5.16) mõlemal poolel olevat avaldist muutuja y järgi ja võrdsustame tulemuse funktsiooniga $N(x, y)$. Saadavast võrrandist leiame $C(y)$, mille asendame võrdusse (5.16), saame otsitava funktsiooni $u(x, y)$ avaldise, millest võrrandi üldlahendi kirjutame kujul $u(x, y) = C$.

- 2) Lähtume valemist

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y)dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y)dy$$

või valemist

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y N(x, y)dy$$

Arvud x_0 ja y_0 võib valida vabalt, kui nii, et punkt (x_0, y_0) kuuluks muutujate x, y piirkoda, milles funktsioonid $M, N, \partial M/\partial y$ ja $\partial N/\partial x$ on pidevad.

Näide 5.23. Lahendada võrrand $\underbrace{(x^3 + xy^2)}_M dx + \underbrace{(x^2y + y^3)}_N dy = 0$.

Antud võrrand on eksaktne, sest

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^3 + xy^2) = 2xy, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y + y^3) = 2xy.$$

Järelikult

$$(x^3 + xy^2)dx + (x^2y + y^3)dy = du(x, y).$$

Ühegselt peavad kehtima võrdused

$$\frac{\partial u}{\partial x} = x^3 + xy^2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x^2y + y^3,$$

loeme y parameetriks ja integreerime x järgi

$$u(x, y) = \int M(x, y)dx + C(y) = \int (x^3 + xy^2)dx + C(y) = \frac{x^4}{4} + \frac{x^2y^2}{2} + C(y),$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^2y^2}{2} + C(y)\right) = x^2y + y^3, \quad x^2y + C'(y) = x^2y + y^3,$$

$$C'(y) = y^3, \quad C(y) = \frac{y^4}{4} + C_1, \quad C_1 = 0.$$

$$u(x, y) = \frac{x^4}{4} + \frac{x^2y^2}{2} + \frac{y^4}{4},$$

Võrrandi üldlahend on kujul $u(x, y) = C$ ehk

$$\frac{x^4}{4} + \frac{x^2y^2}{2} + \frac{y^4}{4} = C.$$

Näide 5.24. Lahendada võrrand $\underbrace{(x + 2y)}_N dy + \underbrace{(y + 3x^2)}_M dx = 0$. Kontrollime

eksaktsuse tingimust:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(y + 3x^2) = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x + 2y) = 1$$

Võrrandi lahend avaldub kujul

$$u(x, y) = \int (x + 2y)dy + C(x) = yx + y^2 + C(x).$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(yx + y^2 + C(x)) = y + 3x^2, \quad y + C'(x) = y + 3x^2, \quad C(x) = x^3,$$

$$u(x, y) = yx + y^2 + x^3.$$

Üldlahendiks on

$$yx + y^2 + x^3 = C.$$

5.4. NUMBRILISED MEETODID

Analüütiline lahendus on alati parem kui numbriline, sest analüütilist lahendit saame kasutada mistahes sõltumatu muutuja numbriliste väärtuste korral, numbriline lahend arvutatakse konkreetsete muutuja väärtuste korral.

5.4.1. EULERI MEETOD

Olgu funktsioon $f(x, y)$ pidev muutujate x, y piirkonnas D ning arvud x_0 ja y_0 olgu sellised, et $(x_0, y_0) \in D$. Vaatleme esimest järku diferentsiaalvõrrandit kujul

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad (5.17)$$

mis rahuldab algtingimust $y(x_0) = y_0$, otsitavaks funktsiooniks on $y = y(x)$. Tahame teada funktsiooni väärtust punktis $x = b$, seega võtame lõigu $[x_0, b]$ ja jaotame n võrdseks osaks

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = b, \quad x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n.$$

Tähistame vahed

$$x_1 - x_0 = x_2 - x_1 = \dots = x_n - x_{n-1} = \Delta x = h.$$
$$h = \frac{b - x_0}{n}$$

Olgu mingi funktsioon $y = \phi(x)$ võrrandi (5.17) mingi ligikaudne lahend ja

$$y_0 = \phi(x_0), \quad y_1 = \phi(x_1), \quad \dots, \quad y_n = \phi(x_n)$$

Tähistame

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0, \quad \Delta y_1 = y_2 - y_1, \quad \dots, \quad \Delta y_{n-1} = y_n - y_{n-1}$$

Asendame võrrandi (5.17) tuletise igas punktis $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ funktsiooni muudu ja argumenti muudu jagatisega

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f(x, y), \quad \Delta y = f(x, y)\Delta x.$$

Kui $x = x_0$ ja $y = y_0$, siis

$$\frac{\Delta y_0}{\Delta x} = f(x_0, y_0),$$
$$\Delta y_0 = f(x_0, y_0)\Delta x,$$
$$y_1 - y_0 = f(x_0, y_0)h,$$
$$y_1 = y_0 + f(x_0, y_0)h$$

Teada on y_0, x_0, h . Kui $x = x_1$ ja $y = y_1$, siis

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y_1}{\Delta x} &= f(x_1, y_1), \\ \Delta y_1 &= f(x_1, y_1)\Delta x, \\ y_2 - y_1 &= f(x_1, y_1)h, \\ y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1)h\end{aligned}$$

Teada on y_1, x_1, h . Analoogiliselt leiame

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2)h, \quad \dots, \quad y_n = y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1})h.$$

Saime valemi diferentsiaalvõrrandi lahendamiseks [Euleri meetodil](#)

$$y_n = y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1})h.$$

Seega on lahendi ligikaudsed väärtused punktides $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ leitud. Ühendame koordinaattasandil punktid $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. Saame integraalkõvera ligikaudse kujutisena murdjoone. Seda murdjoont nimetatakse [Euleri murdjooneks](#). Mida väiksemad sammud me teeme, seda lähedasem on Euleri murdjoon integraalkõverale.

Ülesannet võib lahendada ka [graafiliselt](#), konstrueerides Euleri murdjoone. Joonistame punkti $M_0(x_0, y_0)$ läbiva joonelemendi, see on joon tõusuga $f(x_0, y_0)$. Liigume mööda joont argumenti x kasvavate väärtuste suunas punktist M_0 paremale punktini $M_1(x_1, y_1)$. Kordame sama tegevust: joonistame punkti $M_1(x_1, y_1)$ läbiva joonelemendi ja liigume selle sihis paremale järgmise punktini $M_2(x_2, y_2)$ jne.

Näide 5.25. Leida diferentsiaalvõrrandi

$$y' = y + x$$

ligikaudne lahend kohal $x = 1$, mis rahuldaks algtingimust $y(0) = 1$.

Jaotame lõigu $[0, 1]$ kümneks osaks. Siis

$$x_k = 0; 0, 1; \dots; 1, \quad h = 0.1, \quad f(x, y) = y + x.$$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= y + x, \\ y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0)h.\end{aligned}$$

x_k	y_k	$x_k + y_k$	$(x_k + y_k)h$	$y_k + (x_k + y_k)h$
0	1	1	0,1	1,1
0,1	1,1	1,2	0,12	1,22
0,2	1,22	1,42	0,142	1,362
0,3	1,362	1,662	0,1662	1,5282
0,4	1,5282	1,9282	0,1928	1,721
0,5	1,721	2,221	0,2221	1,9431
0,6	1,9431	2,5431	0,2543	2,1974
0,7	2,1974	2,8974	0,2897	2,4871
0,8	2,4871	3,2871	0,3287	2,8158
0,9	2,8158	3,7158	0,37158	3,1874
1,0	3,1874			

Ligikaudne lahend $y(1) \approx 3,1874$

Täpse lahendi (analüütilise lahendi) saamiseks lahendame võrra $y' = y + x$. Tegemist on lineaarse diferentsiaalvõrrandiga, mille lahendame muutuja vahetusega.

$$y = uv, \quad y' = u'v + v'u \quad u'v + v'u = uv + x, \quad v(u' - u) + uv' = x$$

Lahendame kahes osas: 1) $(u' - u) = 0$, 2) $uv' = x$

$$1) (u' - u) = 0,$$

$$\frac{du}{dx} = u,$$

$$du = u dx,$$

$$\frac{du}{u} = dx,$$

$$\ln |u| = x,$$

$$u = e^x.$$

$$2) uv' = x,$$

$$v'e^x = x,$$

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dx}e^x &= x, \\ dv &= xe^{-x}dx, \\ \int dv &= \int xe^{-x}dx.\end{aligned}$$

Paremal pool võrdusmärgi oleva integraali ositi integreerimiseks tähistame

$$u = x, \quad dv = e^{-x}dx, \quad du = dx, \quad v = -e^{-x}.$$

$$\int xe^{-x}dx = -xe^{-x} - \int -e^{-x}dx$$

$$v = -xe^{-x} - e^{-x} + C = -e^{-x}(x + 1) + C,$$

$$y = uv = e^x \cdot [(-e^{-x})(x + 1) + C] = -x - 1 + Ce^x,$$

$$y(0) = 1: 1 = -0 - 1 + Ce^0, \quad C = 2.$$

Üldlahend: $y = -x - 1 + Ce^x$, **erilahend** $y = -x - 1 + 2e^x$.

Arvutame nüüd erilahendi väärtuse kohal

$$x = 1: y(1) = -1 - 1 + 2e^1 = 2e - 2 = 3,43656.$$

Ligikaudne lahend on täpsem, kui suurendame osalõikude arvu, sellisel juhul on mõistlikum kasutada tabelarvutusprogrammide abi, et vältida arvutusvigade tekkimist.

5.4.2. RUNGE-KUTTA MEETODID

Meetodid on algoritmide pere harilike diferentsiaalvõrrandite (ja harilike diferentsiaalvõrrandite süsteemide) ilmutatud või ilmutamata ligikaudse lahendi numbriliseks leidmiseks algtingimustega ülesande korral. Nad põhinevad iteratsioonil. Meetodi algse kuju töötas välja Saksa matemaatik Carl Runge aastal 1895 ning seda üldistas Martin Wilhelm Kutta aastal 1901. Kõige suurema täpsusega on 4. järku klassikaline Runge-Kutta meetod, see meetod on nii laialt levinud, et seda nimetatakse sageli lihtsalt **Runge-Kutta meetodiks**.

Olgu meil Cauchy ülesanne kujul

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0,$$

siis funktsiooni väärtus järgmises punktis arvutatakse valemi järgi:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} \cdot (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

$$k_1 = f(x_n, y_n), \quad k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \quad k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3),$$

kus h on sammu suurus argumenti x järgi.

Näide 5.26. Leida võrrandi

$$y' = y + x$$

ligikaudne lahend Runge-Kutta meetodiga kohal $x = 1$, mis rahuldaks algtingimust

$$y(0) = 1.$$

Tegemist on sama ülesandega, mis näites 5.25. Seekord jaotame lõigu $[0,1]$ viieks osaks:

$$x_k = 0; 0,2; \dots; 1, \quad h = 0,2, \quad f(x, y) = y + x.$$

$$\frac{dy}{dx} = y + x,$$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{6} \cdot (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

$$k_1 = f(x_n, y_n) = x_n + y_n,$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right) = x_n + \frac{h}{2} + y_n + \frac{h}{2}k_1,$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right) = x_n + \frac{h}{2} + y_n + \frac{h}{2}k_2,$$

$$k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3) = x_n + h + y_n + hk_3.$$

x_n	y_n	k_1	k_2	k_3	k_4	$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} \cdot (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$
0	1	1	1,2	1,22	1,444	1,2428
0,2	1,24280	1,44280	1,687080	1,711508	1,985102	1,583636
0,4	1,583636	1,983636	2,282000	2,311836	2,646003	2,044213
0,6	2,044213	2,644213	3,008634	3,045076	3,453228	2,651042
0,8	2,651042	3,451042	3,896146	3,940656	4,439173	3,436502
1,0	3,436502	Ligikaudne lahend $y(1) \approx 3,436502$				

Täpne lahend oli $y = -x - 1 + 2e^x$, $(1) = 2e - 2 = 3,43656$. Kuna tegemist oli täpsema arvutusmeetodiga, on lahend ka poole vähema osalõikude arvu korral täpsem.

Arvutustabeli võib teha kasutades ka mõnda tabelarvutusprogrammi (Microsoft Excel või muud). Tuleb kirja panna valemid esimese rea jaoks ja teises valem, mis viitab esimese rea viimasele veerule (y_{n+1}), ülejäänud valemid tuleb kopeerida soovitud arvu kordi.

0	1	1	1,2	1,22	1,444	1,2428
0,2	1,2428	1,4428	1,68708	1,711508	1,985102	1,583636
0,4	1,583636	1,983636	2,282	2,311836	2,646003	2,044213
0,6	2,044213	2,644213	3,008634	3,045076	3,453228	2,651042
0,8	2,651042	3,451042	3,896146	3,940656	4,439173	3,436502
1	3,436502					

5.5. TEIST JÄRKU DIFERENTSIAALVÕRRANDID

5.5.1. KONSTANTSETE KORDAJATEGA LINEAARSED HOMOGEENSED DIFERENTSIAALVÕRRANDID

Konstantsete kordajatega lineaarseks homogeenseks teist järku diferentsiaalvõrrandiks nimetatakse võrrandit kujul

$$\frac{d^2y}{dx^2} + a \frac{dy}{dx} + by = 0, \quad (5.19)$$

kus a, b on konstandid.

Teoreem 5.3.

Lineaarse homogeense võrrandi (5.19) erilahendite summa on samuti selle võrrandi lahend.

Teoreem 5.4.

Kui $y_1(x)$ on lineaarse homogeense võrrandi (5.19) lahend, siis on lahendiks ka $Cy_1(x)$, kus C on suvaline konstant.

Järeldus.

Kui $y_1(x)$ ja $y_2(x)$ on lineaarse homogeense võrrandi (5.19) lahendid, siis on lahendiks ka nende erilahendite lineaarne kombinatsioon $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$.

Kui $y_1(x)$ ja $y_2(x)$ on **lineaarselt sõltumatud** võrrandi (5.19) **erilahendid**, siis on

$$y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$$

võrrandi (5.19) **üldlahendiks**.

Kaht funktsiooni $y_1(x)$ ja $y_2(x)$ nimetatakse **lineaarselt sõltumatuteks**, kui

$$C_1y_1(x) + C_2y_2(x) = 0$$

kehtib vaid

$$C_1 = C_2 = 0$$

korral. Funktsioonid on **lineaarselt sõltuvad**, kui nad ei ole lineaarselt sõltumatud. Kahe lineaarselt sõltuva funktsiooni suhe on konstantne

$$\frac{y_1(x)}{y_2(x)} = -\frac{C_2}{C_1} = C.$$

Võrrandi (5.19) lahendit on loomulik otsida selliste funktsioonide seast, mille tuletised on sarnased lähtefunktsiooniga, nii et pärast võrrandisse asendamist võiksid kõik liikmed välja koonduda. Üheks selliseks funktsiooniks on

$$y = e^{kx},$$

kus k on parameeter. Leiame selle funktsiooni tuletised:

$$y' = ke^{kx}, y'' = k^2e^{kx}.$$

Kui funktsioon on võrrandi lahendiks, siis võrrandisse asendamisel peame saama samasuse, seega

$$k^2e^{kx} + ake^{kx} + be^{kx} \equiv 0$$

ehk

$$e^{kx}(k^2 + ak + b) \equiv 0.$$

Kuna $e^{kx} \neq 0$, siis samasuse kehtimiseks peab olema null teine tegur:

$$k^2 + ak + b = 0.$$

Saime ruutvõrrandi, mille lahendid avalduvad kujul

$$k_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm \sqrt{\frac{a^2}{4} - b}.$$

Definitsioon 5.17.

Diferentsiaalvõrrandile (5.19) **vastavaks karakteristlikuks võrrandiks** nimetatakse ruutvõrrandit

$$k^2 + ak + b = 0.$$

Diferentsiaalvõrrandi (5.19) üldlahendi leidmisel tuleb vaadelda 3 eri juhtu vastavalt karakteristliku võrrandi lahenditele:

- 1) reaalsed ja erinevad,
- 2) reaalsed ja võrdsed,
- 3) kompleksed.

1) Reaalsed ja erinevad karakteristliku võrrandi lahendid.

Olgu võrrandi $k^2 + ak + b = 0$ lahendid k_1, k_2 ja kehtib tingimus $k_1 \neq k_2$. Siis diferentsiaalvõrrandi (5.19) **erilahendid** on

$$y_1 = e^{k_1x} \text{ ja } y_2 = e^{k_2x}.$$

Kontrollime, kas erilahendid rahuldavad võrrandit:

$$(e^{k_1x})' = k_1 e^{k_1x}, \quad (e^{k_2x})' = k_2 e^{k_2x},$$

$$(e^{k_1x})'' = k_1^2 e^{k_1x}, \quad (e^{k_2x})'' = k_2^2 e^{k_2x},$$

$$(e^{k_1x})'' + a(e^{k_1x})' + be^{k_1x} = k_1^2 e^{k_1x} + ak_1 e^{k_1x} + be^{k_1x} = e^{k_1x}(k_1^2 + ak_1 + b) = 0.$$

Erilahend rahuldab võrrandit, sest

$$k_1^2 + ak_1 + b = 0,$$

sest k_1 on karakteristliku võrrandi

$$k^2 + ak + b = 0$$

lahend. Samasuguse tulemuse saame teise erilahendi jaoks:

$$(e^{k_2x})'' + a(e^{k_2x})' + be^{k_2x} = k_2^2 e^{k_2x} + ak_2 e^{k_2x} + be^{k_2x} = e^{k_2x}(k_2^2 + ak_2 + b) = 0.$$

Seega

$$(e^{k_1x})'' + a(e^{k_1x})' + be^{k_1x} = 0,$$

$$(e^{k_2x})'' + a(e^{k_2x})' + be^{k_2x} = 0,$$

sõltumata x väärtustest. Järelikult on e^{k_1x}, e^{k_2x} võrrandi (5.19) erilahendid. Leiame $y_1(x)$ ja $y_2(x)$ suhte

$$\frac{y_1(x)}{y_2(x)} = \frac{e^{k_1x}}{e^{k_2x}} = e^{k_1x - k_2x} \neq \text{const.}$$

Funktsioonid $y_1(x)$ ja $y_2(x)$ on linearselt sõltumatud.

Reaalsete ja erinevate karakteristliku võrrandi

$$k^2 + ak + b = 0$$

lahendite k_1 ja k_2 korral on diferentsiaalvõrrandi (5.19) **üldlahend** kujul

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x},$$

kus C_1 ja C_2 on suvalised konstandid.

2) Reaalsed ja võrdsed karakteristliku võrrandi lahendid.

$$k_1 = k_2 = -\frac{a}{2}, \quad a^2 - 4b = 0,$$

siis diferentsiaalvõrrandi (5.19) üldlahendiks on funktsioonide (erilahendite)

$$y_1 = e^{-\frac{a}{2}x}, y_2 = x e^{-\frac{a}{2}x}$$

lineaarne kombinatsioon. Üldlahend on

$$y = C_1 e^{-\frac{a}{2}x} + C_2 x e^{-\frac{a}{2}x} = (C_1 + C_2 x) e^{-\frac{a}{2}x}.$$

Näitame, et y_1 ja y_2 rahuldavad diferentsiaalvõrrandit (5.19):

$$\left(e^{-\frac{a}{2}x}\right)' = -\frac{a}{2} e^{-\frac{a}{2}x},$$

$$\left(e^{-\frac{a}{2}x}\right)'' = \frac{1}{4} a^2 e^{-\frac{a}{2}x},$$

$$\frac{1}{4} a^2 e^{-\frac{a}{2}x} + a \left(-\frac{a}{2} e^{-\frac{a}{2}x}\right) + b e^{-\frac{a}{2}x} = e^{-\frac{a}{2}x} \left(\frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{2} + b\right) =$$

$$= e^{-\frac{a}{2}x} \left(-\frac{a^2}{4} + b\right) = -\frac{1}{4} e^{-\frac{a}{2}x} (a^2 - 4b) = 0,$$

$$\left(x e^{-\frac{a}{2}x}\right)' = e^{-\frac{a}{2}x} - \frac{a}{2} x e^{-\frac{a}{2}x},$$

$$\left(x e^{-\frac{a}{2}x}\right)'' = -\frac{a}{2} e^{-\frac{a}{2}x} - \frac{a}{2} e^{-\frac{a}{2}x} + \frac{a^2}{4} x e^{-\frac{a}{2}x} = e^{-\frac{a}{2}x} \left(\frac{a^2}{4} x - a\right),$$

$$e^{-\frac{a}{2}x} \left(\frac{a^2}{4} x - a\right) + a \left(e^{-\frac{a}{2}x} - \frac{a}{2} x e^{-\frac{a}{2}x}\right) + b x e^{-\frac{a}{2}x} = e^{-\frac{a}{2}x} \left(\frac{a^2}{4} x - a + a - \frac{a^2}{2} x + b x\right) =$$

$$= e^{-\frac{a}{2}x} \left(-\frac{a^2}{4} x + b x\right) = -\frac{1}{4} x e^{-\frac{a}{2}x} (a^2 - 4b) = 0.$$

Eelduse kohaselt

$$a^2 - 4b = 0,$$

järelikult erilahendid

$$y_1 = e^{-\frac{a}{2}x}, y_2 = x e^{-\frac{a}{2}x}.$$

rahuldavad diferentsiaalvõrrandit (5.19). Kontrollime, kas erilahendid on linearselt sõltumatud

$$\frac{y_1(x)}{y_2(x)} = \frac{e^{-\frac{a}{2}x}}{xe^{-\frac{a}{2}x}} = \frac{1}{x} \neq \text{const.}$$

Funktsioonid $y_1(x)$ ja $y_2(x)$ on lineaarselt sõltumatud.

Reaalsete ja võrdsete karakteristliku võrrandi lahendite

$$k_1 = k_2 = -a/2$$

korral on diferentsiaalvõrrandi (5.19) **üldlahend** on kujul

$$y = (C_1 + C_2x)e^{k_1x} = (C_1 + C_2x)e^{-\frac{a}{2}x}.$$

3) Kompleksarvulised karakteristliku võrrandi lahendid.

Kompleksarvuliste lahendite korral peab ruutvõrrandi lahendivalemi ruutjuure alune avaldis olema negatiivne

$$a^2 - 4b < 0,$$

$$k_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{a^2 - 4b} = -\frac{a}{2} \pm \frac{1}{2}\underbrace{\sqrt{-1}}_i \cdot \sqrt{4b - a^2}.$$

Tähistame

$$\alpha = -\frac{a}{2}, \quad \beta = \frac{1}{2}\sqrt{4b - a^2}, \quad k_1 = \alpha + i\beta, \quad k_2 = \alpha - i\beta.$$

Avaldame a ja b

$$a = -2\alpha, \quad \beta^2 = \frac{1}{4}(4b - a^2), \quad b = \beta^2 + \frac{1}{4}a^2 = \beta^2 + \frac{1}{4}4\alpha^2 = \beta^2 + \alpha^2, \\ b = \beta^2 + \alpha^2.$$

Diferentsiaalvõrrandi (5.19) erilahendid on

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Näitame erilahendite kehtivust. Leiame tuletised

$$\frac{dy_1}{dx} = \alpha e^{\alpha x} \cos \beta x - \beta e^{\alpha x} \sin \beta x = e^{\alpha x}(\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x),$$

$$\frac{dy_2}{dx} = \alpha e^{\alpha x} \sin \beta x + \beta e^{\alpha x} \cos \beta x = e^{\alpha x}(\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x),$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y_1}{dx^2} &= \alpha e^{\alpha x}(\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x) + e^{\alpha x}(-\alpha\beta \sin \beta x - \beta^2 \cos \beta x) = \\ &= e^{\alpha x}(\alpha^2 \cos \beta x - \alpha\beta \sin \beta x - \alpha\beta \sin \beta x - \beta^2 \cos \beta x) = \\ &= e^{\alpha x}(\alpha^2 \cos \beta x - 2\alpha\beta \sin \beta x - \beta^2 \cos \beta x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y_2}{dx^2} &= \alpha e^{\alpha x}(\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x) + e^{\alpha x}(\alpha\beta \cos \beta x - \beta^2 \sin \beta x) = \\ &= e^{\alpha x}(\alpha^2 \sin \beta x + \alpha\beta \cos \beta x + \alpha\beta \cos \beta x - \beta^2 \sin \beta x) = \\ &= e^{\alpha x}(\alpha^2 \sin \beta x + 2\alpha\beta \cos \beta x - \beta^2 \sin \beta x). \end{aligned}$$

Asetame funktsioonid $y_1(x)$ ja $y_2(x)$ võrrandisse (5.19), asendame $a = -2\alpha, b = \beta^2 + \alpha^2$.

$$e^{\alpha x}(\alpha^2 \cos \beta x - 2\alpha\beta \sin \beta x - \beta^2 \cos \beta x) + \alpha e^{\alpha x}(\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x) + b e^{\alpha x} \cos \beta x =$$

$$\begin{aligned}
&= e^{\alpha x}(\alpha^2 \cos \beta x - 2\alpha\beta \sin \beta x - \beta^2 \cos \beta x + a(\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x) + b \cos \beta x) = \\
&= e^{\alpha x}(\cos \beta x(\alpha^2 - \beta^2 + a\alpha + b) + \sin \beta x(-2\alpha\beta - a\beta)) = \\
&= e^{\alpha x}(\cos \beta x(\alpha^2 - \beta^2 - 2\alpha^2 + \beta^2 + \alpha^2) + \sin \beta x(-2\alpha\beta + 2\alpha\beta)) = 0. \\
e^{\alpha x}(\alpha^2 \sin \beta x + 2\alpha\beta \cos \beta x - \beta^2 \sin \beta x) + ae^{\alpha x}(\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x) + be^{\alpha x} \sin \beta x = \\
&= e^{\alpha x}(\alpha^2 \sin \beta x + 2\alpha\beta \cos \beta x - \beta^2 \sin \beta x + a(\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x) + b \sin \beta x) = \\
&= e^{\alpha x}(\cos \beta x(2\alpha\beta + a\beta) + \sin \beta x(\alpha^2 - \beta^2 + a\alpha + b)) = \\
&= e^{\alpha x}(\cos \beta x(2\alpha\beta - 2\alpha\beta) + \sin \beta x(\alpha^2 - \beta^2 - 2\alpha^2 + \beta^2 + \alpha^2)) = 0.
\end{aligned}$$

Järelikult funktsioonid

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

on diferentsiaalvõrrandi (5.19) lahendid. Kontrollime, kas lahendid on lineaarselt sõltumatud

$$\frac{y_1(x)}{y_2(x)} = \frac{e^{\alpha x} \cos \beta x}{e^{\alpha x} \sin \beta x} = \cot \beta x \neq \text{const.}$$

Funktsioonid $y_1(x)$ ja $y_2(x)$ on lineaarselt sõltumatud.

Kompleksarvuliste karakteristliku võrrandi lahendite

$$k_1 = \alpha + \beta i, k_2 = \alpha - \beta i$$

korral on diferentsiaalvõrrandi (5.19) **üldlahend** on kujul

$$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

Näide 5.27. Lahendada diferentsiaalvõrrand

$$y'' + 4y' + 3y = 0.$$

Vastav karakteristlik võrrand on

$$k^2 + 4k + 3 = 0, \quad k_1 = -3, \quad k_2 = -1.$$

Lahendid on reaalsed ja erinevad, seega on üldlahend

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x} = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{-x}.$$

Näide 5.28. Lahendada diferentsiaalvõrrand

$$y'' + 6y' + 9y = 0.$$

Vastav karakteristlik võrrand on

$$k^2 + 6k + 9 = 0, \quad k_1 = k_2 = -3.$$

Lahendid on võrdsed, seega võrrandi üldlahend on

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{-\frac{a}{2}x} = (C_1 + C_2 x)e^{-3x}.$$

Näide 5.29. Lahendada diferentsiaalvõrrand

$$y'' + 6y' + 13y = 0.$$

Vastav karakteristlik võrrand ja selle lahendid on

$$k^2 + 6k + 13 = 0, \quad k_1 = -3 + 2i, \quad k_2 = -3 - 2i.$$

Lahendid on kompleksed, seega on üldlahend $\alpha = -3, \beta = 2$:

$$y = e^{-3x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x).$$

5.5.2. KONSTANTSETE KORDAJATEGA LINEAARSED DIFERENTSIAALVÖRRANDID

Konstantsete kordajatega lineaarne mittehomoogeenne teist järku diferentsiaalvõrrand on võrrand kujul

$$\frac{d^2y}{dx^2} + a \frac{dy}{dx} + by = F(x), \quad (5.20)$$

kus a, b on konstandid ja $F(x)$ on argumenti x funktsioon.

Võrrandi (5.20) **üldlahend** on esitatav summa kujul

$$y = y_h + Y,$$

kus y_h on vastava homogeense võrrandi

$$\frac{d^2y}{dx^2} + a \frac{dy}{dx} + by = 0$$

üldlahend ja Y on võrrandi (5.20) mingi **erilahend**.

Määramata kordajate meetod erilahendi otsimiseks.

Erilahendit tuleb otsida sarnaselt funktsiooni $F(x)$ kujule (võrrandi paremal pool asuv funktsioon), lisades otsitavad määramata kordajad, mille arv sõltub funktsiooni $F(x)$ kujust.

1) $F(x)$ on konstant: $F(x) = C$.

Esitame otsitava erilahendi samuti konstandi kujul

$$Y = A.$$

Kuna tegemist on konstandiga, siis tuletised $Y' = Y'' = 0$ ja võrrandisse (5.20) asendades saame

$$bA = C, \quad A = \frac{C}{b}, \quad Y = \frac{C}{b}.$$

Erijuht. Kui võrrandis (5.20) $b = 0$, siis tuleb erilahendit otsida kujul

$$Y = Ax.$$

Leiame tuletised $Y' = C_0, Y'' = 0$ ja asendame võrrandisse, saame

$$aC_0 = C, \quad C_0 = \frac{C}{a}, \quad Y = \frac{C}{a}x.$$

2) $F(x)$ on polünoom.

Võrrandi (5.20) erilahendit otsitakse **sama astme polünoomina**, näiteks kui

$$F(x) = px^2 + qx + r,$$

kus p, q ja r on etteantud, siis otsime erilahendit ruutpolünoomi kujul

$$Y = Ax^2 + Bx + C.$$

Peame määrama konstandid A, B ja C nii, et Y oleks võrrandi (5.20) lahend. Selleks leiame tuletised

$$Y' = 2Ax + B, Y'' = 2A.$$

Asendame võrrandisse (5.20), saame

$$2A + a(2Ax + B) + b(Ax^2 + Bx + C) = px^2 + qx + r.$$

Korrastame vasakul pool võrdusmärgi olevad liikmed

$$Abx^2 + x(2Aa + Bb) + 2A + aB + bC = px^2 + qx + r.$$

Arvestame, et x sama astmete kordajad peavad olema võrdsed mõlemal pool võrdusmärgi.

$$\begin{aligned} x^2: \quad Ab = p, \quad A = \frac{p}{b}, \quad x: \quad 2Aa + Bb = q, \quad B = \left(q - \frac{2ap}{b}\right) \frac{1}{b}, \\ x^0: \quad 2A + aB + bC = r, \quad C = \frac{1}{b} \left[r - \frac{2p}{b} - \frac{a}{b} \left(q - \frac{2ap}{b} \right) \right]. \end{aligned}$$

Erijuht. Kui võrrandis (5.20) $b = 0$, siis tuleb erilahendit otsida kujul

$$Y = x(Ax^2 + Bx + C).$$

3) Eksponentkujul $F(x) = pe^{nx}$.

Erilahendit otsime kujul

$$Y = Ae^{nx}.$$

Paneme tähele, et arvu e aste jääb samaks, kui funktsioonil $F(x)$, otsime ainult arvu e kordajat. Leiame tuletised

$$Y' = Ane^{nx}, Y'' = An^2e^{nx}$$

ja asendame võrrandisse

$$An^2e^{nx} + aAne^{nx} + bAe^{nx} = pe^{nx}, \quad |:e^{nx}$$

$$A(n^2 + an + b) = p, \quad A = \frac{p}{n^2 + an + b}.$$

Erijuht. Kui

$$n^2 + an + b = 0$$

ehk **n on karakteristliku võrrandi lahend**, siis otsime üldlahendit järgnevalt: kui **n on ühekordne** lahend ($n = k_1$ või $n = k_2$), siis

$$Y = Axe^{nx},$$

kui **n on kahekordne** lahend ($n = k_1 = k_2$), siis

$$Y = Ax^2e^{nx}.$$

4) $F(x)$ on trigonomeetrilisel kujul:

$$F(x) = \sin \omega x, \quad F(x) = \cos \omega x, \quad F(x) = p \sin \omega x + q \cos \omega x.$$

Erilahendit otsime alati ühesugusel kujul (sõltumata sellest, kas $F(x)$ sisaldab siinust, koosinust või summat nendest)

$$Y = A \sin \omega x + B \cos \omega x.$$

Paneme tähele, et siinuse ja koosinuse argument jääb samaks, mis on funktsioonil $F(x)$, otsime ainult nende funktsioonide kordajaid.

Olgu $F(x) = \sin \omega x$. Leiame tuletised ja asendame võrrandisse

$$Y' = A\omega \cos \omega x - B\omega \sin \omega x, \quad Y'' = -A\omega^2 \sin \omega x - B\omega^2 \cos \omega x, \\ -A\omega^2 \sin \omega x - B\omega^2 \cos \omega x + a(A\omega \cos \omega x - B\omega \sin \omega x) + b(A \sin \omega x + B \cos \omega x) \\ = \sin \omega x.$$

Võrdsustame $\sin \omega x$ ja $\cos \omega x$ kordajad mõlemal pool võrdusmärgi, saame võrrandisüsteemi kordajate A ja B leidmiseks:

$$\begin{cases} -A\omega^2 - aB\omega + bA = 1, \\ -B\omega^2 + aA\omega + bB = 0. \end{cases}$$

Erijuht. Kui võrrandis (5.20) $a = 0$, siis on tegemist erijuhuga, kui $k_{1,2} = \pm\beta i$ ja $\omega = \beta$, siis otsime erilahendit kujul

$$Y = x(A \sin \omega x + B \cos \omega x).$$

Märkused.

1. Kui võrrandi (5.20) paremal pool esineb eespool vaadeldud **funktsioonide summa**, siis erilahendi saame, kui otsime teda **samade funktsioonide summana**.
2. Ülal kirjeldatud meetod sobib ka juhul, kui võrrandi (5.20) parem pool osutub **korrutiseks**, siis otsitakse erilahendit **korrutise kujul**.
3. Erijuhtude arvestamata jätmisel tekib määramata kordajate leidmise käigus vastuolu, mistõttu kordajaid ei ole võimalik määrata.

Näide 5.30. Leida võrrandi

$$y'' + 2y' - 8y = 2x + 1$$

üldlahend.

Alguses leiame võrrandile vastava homogeense võrrandi

$$y'' + 2y' - 8y = 0$$

üldlahendi karakteristikliku võrrandi

$$k^2 + 2k - 8 = 0$$

lahendite

$$k_1 = -4, \quad k_2 = 2$$

järgi, üldlahend on

$$y_h = C_1 e^{-4x} + C_2 e^{2x}.$$

Erilahendit otsime antud ülesande paremal pool võrdusmärgi asuva funktsiooni

$$F(x) = 2x + 1$$

kujuga sarnasel kujul aga määramata kordajatega.

$$Y = Ax + B, \quad Y' = A, \quad Y'' = 0.$$

Määramata kordajate A ja B leidmiseks asendame otsitava erilahendi ja selle tuletised lahendatavasse võrrandisse, võrdsustame mõlemat pool võrdusmärgi olevad x kordajad ning vabaliikmed

$$2A - 8Ax - 8B = 2x + 1,$$

$$x: \quad -8A = 2, \quad A = -\frac{1}{4},$$

$$x^0: 2A - 8B = 1, \quad B = -\frac{3}{16},$$

$$Y = -\frac{1}{4}x - \frac{3}{16},$$

$$y = C_1 e^{-4x} + C_2 e^{2x} - \frac{1}{4}x - \frac{3}{16}.$$

Märkus. Kui võrrandi paremal pool olev funktsioon ei oleks sisaldanud vabaliiget

$$F(x) = 2x,$$

siis sellele vaatamata olesime pidanud otsima erilahendit samal kujul koos vabaliikmega.

Näide 5.31. Leida võrrandi

$$y'' - 2y' = x^2 + 4x$$

üldlahend.

Leiame vastava homogeenise võrrandi üldlahendi

$$k^2 - 2k = 0, \quad k_1 = 0, \quad k_2 = 2, \quad y_* = C_1 + C_2 e^{2x}.$$

Erilahendit otsime kujul (tegemist on erijuhuga, kuna $b = 0$)

$$Y = x(Ax^2 + Bx + C) = Ax^3 + Bx^2 + Cx,$$

$$Y' = 3Ax^2 + 2Bx + C, \quad Y'' = 6Ax + 2B,$$

$$6Ax + 2B - 2(3Ax^2 + 2Bx + C) = x^2 + 4x,$$

$$6Ax + 2B - 6Ax^2 - 4Bx - 2C = x^2 + 4x,$$

$$x^2: -6A = 1, \quad A = -\frac{1}{6},$$

$$x: 6A - 4B = 4, \quad B = -\frac{5}{4},$$

$$x^0: 2B - 2C = 0, \quad C = -\frac{5}{4},$$

$$Y = -\frac{1}{6}x^3 - \frac{5}{4}x^2 - \frac{5}{4}x,$$

$$y = C_1 + C_2 e^{2x} - \frac{1}{6}x^3 - \frac{5}{4}x^2 - \frac{5}{4}x.$$

Näide 5.32. Leida diferentsiaalvõrrandi

$$y'' + 3y' - 10y = 16e^{3x}$$

üldlahend.

Leiame vastava homogeenise võrrandi üldlahendi

$$k^2 + 3k - 10 = 0, \quad k_1 = -5, \quad k_2 = 2, \quad y_h = C_1 e^{-5x} + C_2 e^{2x}.$$

Erilahendit otsime kujul

$$Y = Ae^{3x}, \quad Y' = 3Ae^{3x}, \quad Y'' = 9Ae^{3x},$$

$$9Ae^{3x} + 3 \cdot 3Ae^{3x} - 10Ae^{3x} = 16e^{3x},$$

$$8A = 16, \quad A = 2,$$

$$Y = 2e^{3x},$$

$$y = C_1 e^{-5x} + C_2 e^{2x} + 2e^{3x}.$$

Näide 5.33. Leida võrrandi

$$y'' + 4y = 12\cos 2x$$

üldlahend.

Leiame vastava homogeense võrrandi üldlahendi

$$k^2 + 4 = 0, \quad k_1 = 2i, \quad k_2 = -2i, \quad y_h = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x.$$

Eri lahendit otsime kujul

$$Y = x(A \sin 2x + B \cos 2x),$$

sest tegemist on erijuhuga, sest kuna $a = 0$, siis $k_{1,2} = \pm 2i$ ja võrrandi paremal pool oleva trigonomeetrilise funktsiooni argumendi kordaja $\omega = 2$ on võrdne karakteristliku väärtuse imaginaarosaga.

$$Y' = A \sin 2x + B \cos 2x + x(2A \cos 2x - 2B \sin 2x),$$

$$Y'' = 2A \cos 2x - 2B \sin 2x + 2A \cos 2x - 2B \sin 2x + x(-4A \sin 2x - 4B \cos 2x) =$$

$$= 4A \cos 2x - 4B \sin 2x - 4Ax \sin 2x - 4Bx \cos 2x,$$

$$4A \cos 2x - 4B \sin 2x - 4Ax \sin 2x - 4Bx \cos 2x + 4(Ax \sin 2x + Bx \cos 2x) = 12 \cos 2x,$$

$$\cos 2x(4A - 4Bx + 4Bx) + \sin 2x(-4B - 4Ax + 4Ax) = 12 \cos 2x,$$

Võrdsustame koosinuse ja siinuse kordajad mõlemal pool võrdusmärgi, saame

$$\cos 2x: \quad 4A = 12 \quad A = 3 \qquad \sin 2x: \quad -4B = 0 \quad B = 0$$

$$Y = 3x \sin 2x, \quad y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + 3x \sin 2x.$$

5.5.3. TEIST JÄRKU VÕRRANDID FÜÜSIKAS. MEHAANILISED VÕNKUMISED*

Olgu koormus massiga m elastsel vedrul, mis on kinnitatud mingis punktis A . Koormuse kõrvalekallet tasakaaluasendi suhtes tähistame y . Kõrvalekallet alla loeme positiivseks ja üles negatiivseks. Tasakaaluasendis koormus on tasakaalus vedru elastsusega. Oletame, et jõud F_1 , mis püüab koormust viia tasakaaluasendisse, on võrdeline siirdega y

$$F_1 = -ky, \quad k = \text{const}, \quad k > 0,$$

k on vedru jäikus. Koormuse liikumist takistab vastupanujõud F_2 , mis on suunatud liikumise vastassuunas ja on võrdeline massi liikumise kiirusega

$$F_2 = -\lambda v = -\lambda \frac{dy}{dt}, \quad \lambda = \text{const}, \quad \lambda > 0.$$

Newtoni II seaduse põhjal

$$ma = F_1 + F_2, \quad a = \frac{d^2 y}{dt^2},$$

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -ky - \lambda \frac{dy}{dt}, \quad \lambda > 0, \quad k > 0.$$

Saime II järku konstantsete kordajatega lineaarse homogeense diferentsiaalvõrrandi

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0, \quad p = \frac{\lambda}{m}, q = \frac{k}{m}. \quad (5.21)$$

Võrrandit (5.21) nimetatakse **vabavõnkumiste võrrandiks**.

Oletame, et vedru alumine punkt A liigub vertikaalselt vastavalt seadusele

$$z = \varphi(t).$$

Vedru alumine ots on kinnitatud rulli külge, mis koos vedru ja koormusega liigub mööda konarusi. Sellisel juhul on taastav jõud

$$F_1 = -ky - k\varphi(t),$$

ning takistav jõud

$$F_2 = -\lambda v - \lambda\varphi'(t) = -\lambda y' - \lambda\varphi'(t).$$

Võrrandi (5.21) asemel saame

$$my'' = -ky - k\varphi(t) - \lambda y' - \lambda\varphi'(t),$$

$$my'' + \lambda y' + ky = -k\varphi(t) - \lambda\varphi'(t),$$

$$y'' + p y' + qy = f(t), \quad f(t) = -\frac{k\varphi(t) + \lambda\varphi'(t)}{m}, \quad p = \frac{\lambda}{m}, q = \frac{k}{m}. \quad (5.22)$$

Võrrandit (5.22) nimetatakse **sundvõnkumiste võrrandiks**.

5.5.3.1. VABAVÕNKUMISED *

Vabavõnkumiste võrrand saime kujul (5.21), kus otsitav funktsioon on $y = y(t)$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0, \quad p = \frac{\lambda}{m}, q = \frac{k}{m}. \quad (5.23)$$

Lahendame võrrandi, moodustame karakteristliku võrrandi ja analüüsime võimalikke lahendeid.

$$k^2 + pk + q = 0, \quad k_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}, \quad k_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}.$$

Kuna lahend sõltub karakteristliku võrrandi lahendist, siis vaatame erinevaid variante eraldi.

1. Kui $p^2/4 > q$, siis lahendid on reaalsed ja negatiivsed ning üldlahend on kujul

$$y = C_1 e^{k_1 t} + C_2 e^{k_2 t}, \quad k_1 < 0, k_2 < 0.$$

Järelikult $y \rightarrow 0$, kui $t \rightarrow \infty$, järelikult võnkumist ei teki, kuna takistavad jõud on suured võrreldes vedru jäikusega k .

2. Kui $p^2/4 = q$, $k_1 = k_2 = -p/2$, siis üldlahend

$$y = (C_1 + C_2 t) e^{-\frac{p}{2}t},$$

siis $y \rightarrow 0$, kui $t \rightarrow \infty$, ainult mitte nii kiiresti.

3. Olgu $p = 0$, takistusjõud puudub, siis $k^2 + q = 0$, $k_1 = \beta i$, $k_2 = -\beta i$, $\beta = \sqrt{q}$.

Üldlahend

$$y = C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t.$$

Tähistame

$$C_1 = A \sin \varphi_0, C_2 = A \cos \varphi_0,$$

kus A, φ_0 on suvalised. Avaldame A, φ_0

$$A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}, \quad \varphi_0 = \arctan \frac{C_1}{C_2},$$

$$y = A \sin \varphi_0 \cos \beta t + A \cos \varphi_0 \sin \beta t = A \sin (\varphi_0 + \beta t),$$

$$y = A \sin (\varphi_0 + \beta t).$$

Sellist võnkumist nimetatakse **harmooniliseks võnkumiseks**. Integraalkõveraks on sinusoidid. **Võnkeperioodiks** nimetatakse ajavahemikku T , mille jooksul siinuse argument muutub suuruse 2π võrra. Antud juhul

$$T = \frac{2\pi}{\beta}.$$

Võnkesageduseks nimetatakse võngete arvu aja 2π jooksul. Antud juhul on sagedus β . **Võnkeamplituudiks** nimetatakse suurimat hälvet tasakaaluasendist. Suurim hälve tasakaaluasendist on A . Suurust φ_0 nimetatakse **algfaasiks**.

5.5.3.2. SUNDVÕNKUMISED *

Sundvõnkumiste võrrand (5.22) on

$$y'' + p y' + q y = f(t), \quad f(t) = -\frac{k\varphi(t) + \lambda\varphi'(t)}{m}, \quad p = \frac{\lambda}{m}, q = \frac{k}{m}. \quad (5.24)$$

Praktikas on sageli võnkeid põhjustav välisjõud perioodiline ja muutub vastavalt seadusele

$$f(t) = a \sin \omega t, \quad y'' + p y' + q y = a \sin \omega t, \quad p \neq 0, \quad \frac{p^2}{4} < q,$$

kus q on vedru jäikus ja p vedru takistus, mis on võrdeline kiirusega. Leiame kõigepealt vastava homogeense võrrandi lahendi. Vastava karakteristliku võrrandi lahendid on sel juhul kompleksarvulised

$$k^2 + pk + q = 0, \quad k_1 = \alpha + i\beta,$$

$$k_2 = \alpha - i\beta, \quad k = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}, \quad \alpha = -\frac{p}{2}, \quad \beta = \sqrt{-\frac{p^2}{4} + q},$$

$$y = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t).$$

Tähistame

$$C_1 = A \sin \varphi_0, C_2 = A \cos \varphi_0,$$

$$y = Ae^{\alpha t} (\sin \varphi_0 \cos \beta t + \cos \varphi_0 \sin \beta t) = Ae^{\alpha t} \sin (\varphi_0 + \beta t).$$

Mittehomogeense võrrandi erilahendit otsime kujul

$$Y = N \sin \omega t + M \cos \omega t.$$

Leiame tuletised ja asendame võrrandisse:

$$Y' = N\omega \cos \omega t - M\omega \sin \omega t, \quad Y'' = -N\omega^2 \sin \omega t - M\omega^2 \cos \omega t,$$

$$-N\omega^2 \sin \omega t - M\omega^2 \cos \omega t + p(N\omega \cos \omega t - M\omega \sin \omega t) + q(N \sin \omega t + M \cos \omega t) = a \sin \omega t,$$

$$\sin \omega t: -N\omega^2 - pM\omega + qN = a, \quad \cos \omega t: -M\omega^2 + pN\omega + qM = 0,$$

$$M = \frac{-ap\omega}{(\omega^2 - q)^2 + p^2\omega^2}, \quad N = \frac{a(q - \omega^2)}{(q - \omega^2)^2 + p^2\omega^2}.$$

Uued konstandid A_* , φ_* , $M = A_* \sin \varphi_*$, $N = A_* \cos \varphi_*$.

$$A_* = \sqrt{M^2 + N^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2(q - \omega^2)^2 + p^2\omega^2}},$$

$$\varphi_* = \arctan \frac{M}{N},$$

$$Y = N \sin \omega t + M \cos \omega t = A_* \cos \varphi_* \sin \omega t + A_* \sin \varphi_* \cos \omega t = \frac{a}{\sqrt{a^2(q - \omega^2)^2 + p^2\omega^2}} \sin(\omega t + \varphi_*).$$

Üldlahend on

$$y = Ae^{\alpha t} \sin(\varphi_0 + \beta t) + \frac{a}{\sqrt{a^2(q - \omega^2)^2 + p^2\omega^2}} \sin(\omega t + \varphi_*).$$

Esimene liidetav kujutab sumbuvat võnkumist, aja t kasvades see liige kahaneb ja teise liidetava osatähtsus suureneb. Teine liidetav määrab sundvõnkumise. Võngete sagedus ω on võrdne välisjõu $f(t)$ sagedusega. Sundvõnkumiste amplituud on seda suurem, mida väiksem on p ja mida lähemal on suuruse ω^2 väärtus q väärtusele.

5.5.3.3. SOOJUSE LEVIMINE VARDAS*

Horisontaalselt paigutatud metallvarras on paigutatud otstega tugelede. Tugele vaheline kaugus on L . Vasakus otsas on konstantne temperatuur t_1 . Parem tugi hoiab konstantset temperatuuri $t_2 < t_1$. Varda materjal on soojusjuhtivusega λ . Varda ristlõikepindala on A ja ristlõike ümbermõõt on P . Soojuse äraandmise koefitsient varda pinnalt ümbritsevasse keskkonda on konstantne

$$\alpha \left(\frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{grad}} \right), \quad \alpha = \frac{\lambda}{t_s - t}.$$

Ümbritseva keskkonna temperatuur on t_s . Leiame seose varda suvalise punkti temperatuuri ja kauguse vahel soojemast otsast. Oletame et varras on nii peenike, et temperatuur on ristlõike ulatuses konstantne, siis on $t = t(x)$, x on kaugus. Võtame elementaarlõigu kaugusel x pikkusega dx . Soojushulk, mis läbib aja $d\tau$ jooksul varda ristlõiget kaugusel x , on võrdne

$$-\lambda A \frac{dt}{dx} d\tau.$$

Soojushulk, mis läbib aja $d\tau$ jooksul varda ristlõiget kaugusel $x + dx$, on võrdne

$$-\lambda A \left(\frac{dt}{dx} + \frac{d^2t}{dx^2} dx \right) d\tau.$$

Varda piirkond, mis asub ristlõigete vahel x ja $x + dx$, saab ajavahemiku $d\tau$ jooksul soojushulga, mis on võrdne nende soojushulkade vahega

$$\lambda A \frac{d^2 t}{dx^2} dx d\tau.$$

Sama aja jooksul soojuskadu sellelt vardaosal on

$$\alpha P dx (t - t_s) d\tau.$$

Kuna vaadeldav protsess on statsionaarne, siis

$$\lambda A \frac{d^2 t}{dx^2} dx d\tau = \alpha P dx (t - t_s) d\tau,$$

millest

$$\frac{d^2 t}{dx^2} - \frac{\alpha P}{\lambda A} (t - t_s) = 0.$$

Saime teist järku konstantsete kordajatega lineaarse mittehomoogeense diferentsiaalvõrrandi.

5.5.4. LINEAARSED HOMOGEEENSED DIFERENTSIAALVÕRRANDID

Lineaarne homogene teist järku diferentsiaalvõrrand on võrrand kujul

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0,$$

kus $p_1(x), p_2(x)$ on pidevad funktsioonid.

Kui on teada lineaarse homogene võrrandi kaks lineaarselt sõltumatut lahendit $y_1(x), y_2(x)$, siis selle võrrandi **üldlahendiks** on

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x). \quad (5.25)$$

Võrrandi erilahendi saame üldlahendist konstantide C_1, C_2 sobiva fikseerimise teel.

Wronski determinant.

Vaatleme algul kahte funktsiooni $y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x)$, mis on pidevalt diferentseeruvad ning lineaarselt sõltuvad vahemikus (a, b) . Siis leiduvad arvud $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$, millest vähemalt üks on nullist erinev nii, et iga $x \in (a, b)$ korral kehtiks võrdus

$$k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) \equiv 0.$$

Diferentseerime saadud võrdust, saame

$$k_1 y_1'(x) + k_2 y_2'(x) \equiv 0.$$

Neid kahte samasust võime vaadelda lineaarse homogene võrrandisüsteemina suuruste k_1 ja k_2 suhtes. Süsteemi determinant võrdub nulliga, kui tegemist on lineaarselt sõltuvate funktsioonidega ehk iga $x \in (a, b)$ korral

$$W(x) = 0,$$

kus

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x).$$

Determinanti $W(x)$ nimetatakse funktsioonide y_1 ja y_2 **Wronski determinandiks**.

Funktsioonide y_1 ja y_2 Wronski determinandi võrdumine nulliga on tarvilikuks tingimuseks nende funktsioonide lineaarseks sõltuvuseks antud vahemikus.

Lineaarse homogeense diferentsiaalvõrrandi järku alandamine.

Lineaarse homogeense võrrandi saab lahendada nii, et leiame kõigepealt selle võrrandi n lineaarselt sõltumatut lahendit ja kirjutame vastuse kujul (5.25), selleks üldine meetod puudub. Sellepärast tuleb võrrandi lahendamiseks sageli kasutada **järku alandamise võtet**. Kui me teame võrrandi mingit lahendit $y_1(x) \neq 0$, siis võime võrrandi järku alandada võrrandi lineaarsust säilitades. Seda saame teha kahe asendusega: esiteks asendame võrrandis

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$$

$$y = y_1 \cdot z$$

ning siis alandame võrrandi järku asendusega

$$z' = u, \quad z = z(x), u = u(x).$$

Vaatame **Liouville'i-Ostrogradski valemini** jõudmise mõttekäiku lineaarse homogeense diferentsiaalvõrrandi jaoks kujul

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0.$$

Olgu $y_1(x)$ ja $y_2(x)$ vaadeldava võrrandi mingid kaks lahendit, mis on lineaarselt sõltumatud vahemikus (a, b) . Siis iga $x \in (a, b)$ korral

$$y_1''(x) + p_1(x)y_1'(x) + p_2(x)y_1(x) = 0$$

ja

$$y_2''(x) + p_1(x)y_2'(x) + p_2(x)y_2(x) = 0.$$

Korrutades esimest võrdust suurusega $(-y_2(x))$ ja teist võrdust suurusega $y_1(x)$ ning liites tulemused, saame:

$$-y_1''(x)y_2(x) + y_2''(x)y_1(x) + p_1(x)(y_2'(x)y_1(x) - y_1'(x)y_2(x)) = 0.$$

Siin $p_1(x)$ kordaja on võrdne lahendite $y_1(x)$ ja $y_2(x)$ Wronski determinandiga

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix},$$

esimese kahe liikme vahe aga on Wronski determinandi tuletis $W'(x)$

$$W'(x) = \frac{d}{dx} \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1'(x) & y_2'(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1''(x) & y_2''(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1''(x) & y_2''(x) \end{vmatrix}.$$

Seega iga $x \in (a, b)$ korral kehtib võrdus

$$W'(x) + p_1(x)W(x) = 0.$$

Selle võrrandi lahendiks saame Liouville'i-Ostrogradski valemi. Rakendades Liouville'i-Ostrogradski valemit $C = 1$ korral, saame

$$\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = e^{-\int p_1(x)dx}.$$

$$y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) = e^{-\int p_1(x)dx}.$$

Saime esimest järku lineaarse diferentsiaalvõrrandi teise erilahendi y_2 leidmiseks. Jagame mõlemad võrrandi pooled läbi suurusega $(y_1(x))^2$, esitame võrrandi kujul

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y_2(x)}{y_1(x)} \right) = \frac{e^{-\int p_1(x) dx}}{(y_1(x))^2}.$$

Integreerides mõlemaid võrrandi pooli saame

$$\frac{y_2(x)}{y_1(x)} = \int \frac{e^{-\int p_1(x) dx}}{(y_1(x))^2} dx + C,$$

võttes $C = 0$, saame avaldada otsitava funktsiooni

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p_1(x) dx}}{(y_1(x))^2} dx.$$

Näide 5.34. Lahendada diferentsiaalvõrrand

$$(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = 0.$$

Võrrandi kordajateks on polünoomid:

$$p_0(x) = x^2 + 1, \quad p_1(x) = -2x, \quad p_2(x) = 2.$$

On vaja leida üks võrrandi lahend, et saaks Liouville'i-Ostrogradski valemit kasutada. Selleks tuleb proovida kordajatega sarnaseid funktsioone, alustades kõige lihtsamast. Võtame $p_2(x) = 2$ ja proovime $y_1(x) = C$ võrrandi lahendiks sobivust. Asendades võrrandisse $y = C, y' = y'' = 0$, saame $y_1 = 0$. See lahend ei sobi, kuna vajame nullist erinevat lahendit. Võtame järgmise kordaja $p_1(x) = -2x$ ja otsime lahendit kujul

$$y_1(x) = Ax + B, \quad y_1' = A, \quad y_1'' = 0,$$

asendame võrrandisse, saame

$$-2Ax + 2Ax + 2B = 0, \quad B = 0.$$

Otsitavaks erilahendiks sobib $y_1(x) = Ax$, kus A on suvaline konstant. Võtame erilahendiks

$$y_1(x) = x.$$

Teisendame võrrandi kujule

$$y'' - \frac{2x}{x^2 + 1} y' + \frac{2}{x^2 + 1} y = 0,$$

Liouville'-Ostrogradski valemi järgi leiame erilahendi y_2

$$p_1(x) = -\frac{2x}{x^2 + 1}, \quad y_2(x) = x \int \frac{e^{-\int -\frac{2x}{x^2+1} dx}}{x^2} dx,$$

$$y_2(x) = x \int \left(\frac{x^2 + 1}{x^2} \right) dx = x \left(\int \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) dx \right) = x \left(x - \frac{1}{x} \right) = x^2 - 1.$$

Tulemuseks on teine võrrandi erilahend, mille lineaarne kombinatsioon esimesena leitud lahendiga annab meile võrrandi üldlahendi.

$$y_1 = x, \quad y_2 = (x^2 - 1),$$

$$y = C_1(x^2 - 1) + C_2x.$$

Lahendame sama ülesande erilahendi $y_1 = x$ korral, kasutades **järgu alandamise võtet**

$$y = y_1 z, \quad z' = u.$$

Siis

$$y = xz$$

ja tuletised on kujul (korrutise tuletise valemi järgi)

$$y' = z + xz', \quad y'' = 2z' + xz''.$$

Diferentsiaalvõrrand saab peale asendust kuju

$$(x^2 + 1)(2z' + xz'') - 2x(z + xz') + 2xz = 0,$$

millest saame

$$(x^3 + x)z'' + 2z' = 0.$$

Teise sammuna teeme asenduse

$$z' = u, \quad z'' = u',$$

saame

$$(x^3 + x)u' + 2u = 0,$$

tegemist on esimest järku lineaarse diferentsiaalvõrrandiga. Võrrandi järk on alandatud ning saadud madalamat järku võrrand on samuti lineaarne. See ongi lineaarsuse säilitamine. Kuna tegemist on lineaarse homogeense võrrandiga, saame selle lahendada muutujate eraldamise teel

$$\frac{du}{u} = \frac{-2dx}{x^3 + x}.$$

Integreerimiseks peame võrrandi paremal pool asuva murru teisendama osamurdude summaks:

$$\frac{-2}{x(x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} = \frac{A(x^2 + 1) + Bx^2 + Cx}{x(x^2 + 1)}.$$

Konstandid A, B ja C leiame, asendades võrrandis

$$-2 = x^2(A + B) + Cx + A$$

argumendi väärtuseks $x = 0$, siis

$$A = -2.$$

Edasi võrdsustades x^2 kordajad vasakul ja paremal pool võrdusmärki, saame seose

$$A + B = 0,$$

sest vasakul pool vastav liige puudub, see tähendabki, et ruutliikme kordaja on võrdne nulliga. Asendades juba leitud kordaja $A = -2$, saame

$$B = 2.$$

Viimaks kordaja C leidmiseks võrdsustame x kordajad mõlemal pool võrdusmärki, tulemuseks

$$C = 0.$$

Kokkuvõttes oleme saanud

$$\frac{-2}{x(x^2 + 1)} = \frac{-2}{x} + \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Integreerime võrrandit

$$\int \frac{du}{u} = \int \frac{-2dx}{x^3 + x} = \int \frac{-2}{x} dx + \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx,$$

$$\ln|u| = -2 \ln|x| + \ln|x^2 + 1| + \ln C,$$

$$u = C \left(\frac{x^2 + 1}{x^2} \right).$$

Lõpuks asendame $u = z'$ ja leiame z avaldise

$$z' = C_1 \left(\frac{x^2 + 1}{x^2} \right),$$

$$z = \int C_1 \left(\frac{x^2 + 1}{x^2} \right) dx = C_1 \int 1 dx + C_1 \int \frac{1}{x^2} dx = C_1 x - \frac{C_1}{x} + C_2,$$

Kuna $yx = z$, siis

$$yx = C_1 \left(x - \frac{1}{x} \right) + C_2, \quad y = C_1(x^2 - 1) + C_2x.$$

5.5.5. LINEAARSED MITTEHOMOGEENSED DIFERENTSIAALVÖRRANDID

Lineaarne teist järku mittehomoogene diferentsiaalvõrrand on võrrand kujul

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = f(x),$$

kus $p_1(x), p_2(x)$ on pidevad funktsioonid ja $f(x)$ teadaolev funktsioon.

Kui on teada homogeense võrrandi $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$ kaks lineaarselt sõltumatut lahendit $y_h = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ ja mittehomoogene võrrandi üks erilahend Y , siis üldlahend avaldub kujul

$$y = Y + C_1y_1(x) + C_2y_2(x). \quad (5.26)$$

Võrrandi (5.26) mistahes lahend on saadav üldlahendist konstantide C_1, C_2 väärtuste fikseerimisel.

Erilahendi leidmine konstantide varieerimise meetodiga.

Kui on leitud lineaarse homogeense võrrandi $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$ kaks lineaarselt sõltumatut lahendit, siis erilahendit $Y(x)$ otsitakse kujul

$$Y(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x).$$

Homogeense võrrandi üldlahendisse (5.25) asendame suvalised konstandid C_1, C_2 funktsioonidega $C_1(x), C_2(x)$. Funktsioonid $C_1(x), C_2(x)$ määrame nii, et $Y(x)$ rahuldaks mittehomoogeenset võrrandit.

Kõigepealt võtame erilahendi avaldisest tuletise ja arvestame, et tegemist on korrutisega kahest argumendi x funktsioonist

$$Y'(x) = C_1'(x)y_1(x) + C_1(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2(x) + C_2(x)y_2'(x).$$

Kuna meil on kaks otsitavat funktsiooni ja ainult üks võrrand, siis võtame teiseks võrrandiks seose

$$C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0.$$

Siis

$$Y'(x) = C_1(x)y_1'(x) + C_2(x)y_2'(x),$$

$$Y''(x) = C_1'(x)y_1'(x) + C_1(x)y_1''(x) + C_2'(x)y_2'(x) + C_2(x)y_2''(x).$$

Asetame viimased kaks võrrandit esialgsesse diferentsiaalvõrrandisse

$$\begin{aligned} C_1'(x)y_1'(x) + C_1(x)y_1''(x) + C_2'(x)y_2'(x) + C_2(x)y_2''(x) \\ + p_1(x)(C_1(x)y_1'(x) + C_2(x)y_2'(x)) + p_2(x)(C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)) \\ = f(x). \end{aligned}$$

Kuna y_1 ja y_2 on vastava homogeense diferentsiaalvõrrandi erilahendid, siis asendades need homogeensesse võrrandisse, tekib samasus. Seega osa liikmeid saadud võrrandist annavad kokku arvu 0

$$\begin{aligned} C_1(x)y_1''(x) + p_1(x)(C_1(x)y_1'(x)) + p_2(x)(C_1(x)y_1(x)) \\ = C_1(x)(y_1''(x) + p_1(x)y_1'(x) + p_2(x)y_1(x)) = C_1(x) \cdot 0 = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_2(x)y_2''(x) + p_1(x)(C_2(x)y_2'(x)) + p_2(x)(C_2(x)y_2(x)) \\ = C_2(x)(y_2''(x) + p_1(x)y_2'(x) + p_2(x)y_2(x)) = C_2(x) \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Järelejäänud liikmetest saame võrrandi kujul

$$C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = f(x).$$

Funktsioonide $C_1(x), C_2(x)$ leidmiseks saime süsteemi

$$\begin{cases} C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0, \\ C_1'y_1' + C_2'y_2' = f(x). \end{cases} \quad (5.27)$$

See on suuruste $C_1'(x), C_2'(x)$ suhtes lineaarne mittehomoogenne võrrandisüsteem. Süsteem on üheselt lahenduv:

$$C_i'(x) = g_i(x), i = 1, 2 \quad C_i(x) = \int g_i(x) dx + \bar{C}_i, i = 1, 2.$$

Kuna meid huvitab ainult üks erilahend, siis võime võtta $\bar{C}_1 = \bar{C}_2 = 0$.

$$C_i(x) = \int g_i(x) dx.$$

Näide 5.35. Lahendada diferentsiaalvõrrand $(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = (x^2 + 1)^2$.

$$y'' - \frac{2x}{x^2 + 1}y' + \frac{2}{x^2 + 1}y = x^2 + 1.$$

Vastav homogeenne diferentsiaalvõrrand on juba lahendatud eelmises näites (näide 5.34), lahendiks on

$$y_h = C_1(x^2 - 1) + C_2x.$$

Järelikult antud võrrandi üldlahend avaldub kujul

$$y = Y(x) + C_1(x^2 - 1) + C_2x.$$

Leiame erilahendi $Y(x)$ süsteemist (5.26)

$$Y(x) = C_1(x)(x^2 - 1) + C_2(x)x,$$

$$y_1 = x^2 - 1, y_2 = x, y_1' = 2x, y_2' = 1.$$

Süsteemist (5.27)

$$\begin{cases} C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0, \\ C_1'y_1' + C_2'y_2' = f(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1'(x^2 - 1) + C_2'x = 0, \\ 2xC_1' + C_2' = x^2 + 1. \end{cases}$$

Leiame suurused C_1' ja C_2' :

$$C_2' = -C_1' \frac{x^2 - 1}{x}.$$

Asendame selle süsteemi teise võrrandisse, saame

$$2xC_1' - C_1' \frac{x^2 - 1}{x} = x^2 + 1,$$

$$C_1'(2x^2 - x^2 + 1) = (x^2 + 1)x,$$

$$C_1'(x^2 + 1) = (x^2 + 1)x.$$

$$C_1' = x,$$

$$C_2' = -C_1' \frac{(x^2 - 1)}{x} = -(x^2 - 1) = 1 - x^2.$$

Integreerime

$$C_1(x) = \frac{x^2}{2} + \overline{C}_1, \quad C_2(x) = x - \frac{x^3}{3} + \overline{C}_2,$$

kus \overline{C}_1 ja \overline{C}_2 konstandid. Piisab ühest erilahendist, võtame $\overline{C}_1 = \overline{C}_2 = 0$. Saime

$$C_1(x) = \frac{x^2}{2}, \quad C_2(x) = x - \frac{x^3}{3}.$$

Erilahend avaldub kujul

$$Y(x) = \frac{x^2}{2}(x^2 - 1) + x^2 - \frac{x^4}{3} = \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6}.$$

Üldlahend on kujul

$$y = C_1(x^2 - 1) + C_2x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6}.$$

5.5.6. SPETSIAALSED LINEAARSED VÖRRANDID *

Legendre võrrand on lineaarne võrrand kujul

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + l(l + 1)y = 0,$$

kus l on reaalarv.

Legendre võrrandi üldlahend avaldub kujul

$$y(x) = a_0y_1(x) + a_1y_2(x),$$

kus a_0 ja a_1 on konstandid ja y_1 sisaldab ainult paarisarvulisi muutuja x astmeid ning y_2 sisaldab ainult paarituurvalisi muutuja x astmeid. Kui l on paarisarv, siis $a_1 = 0$ ja kui l on

paaritu, siis $a_0 = 0$. Loodusteadustes pakuvad huvi sellised võrrandi lahendid, mis asuvad vahemikus $-1 \leq x \leq 1$. Selle võrrandi erilahenditeks on l astme polünoomid, mida nimetatakse Legendre polünoomideks

$$P_l(x) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2l-1)}{l!} \left\{ x^l - \frac{l(l-1)}{2(2l-1)} x^{l-2} + \frac{l(l-1)(l-2)(l-3)}{2 \cdot 4(2l-1)(2l-3)} x^{l-4} - \dots \right\}$$

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3), \quad P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x).$$

Legendre polünoomide vahel kehtib rekursiivne seos:

$$(l+1)P_{l+1}(x) - (2l+1)xP_l(x) + lP_{l-1}(x) = 0,$$

ette andes $P_0(x) = 1$ ja $P_1(x) = x$, saab leida kõik kõrgemat järku polünoomid.

Kui $l = 1$, siis

$$2P_2 - 3xP_1 + P_0 = 0, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3xP_1 - P_0) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

Kui $l = 2$, siis $3P_3 - 5xP_2 + 2P_1 = 0$,

$$P_3(x) = \frac{1}{3}(5xP_2 - 2P_1) = \frac{1}{3} \left(5x \frac{1}{2}(3x^2 - 1) - 2x \right) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

Näide 5.36. Näitame, et $P_3(x)$ on Legendre võrrandi lahend $l = 3$ korral,

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + 12y = 0.$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

$$P_3'(x) = \frac{1}{2}(15x^2 - 3) = \frac{3}{2}(5x^2 - 1),$$

$$P_3''(x) = \frac{1}{2}(30x) = 15x,$$

$$\begin{aligned} (1-x^2)15x - 2x \frac{3}{2}(5x^2 - 1) + 12 \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) &= \\ = 15x - 15x^3 - 15x^3 + 3x + 30x^3 - 18x &= 0. \end{aligned}$$

Legendre polünoomid on vahemikus $-1 \leq x \leq 1$ ortogonaalsed:

$$\int_{-1}^1 P_l(x)P_{l'}(x) dx = 0, \quad l \neq l'.$$

Näide 5.37. Näitame, et $P_1(x)$ on ortogonaalne $P_2(x)$ ja $P_3(x)$ suhtes.

$$P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

$$\int_{-1}^1 P_1(x)P_2(x) dx = \int_{-1}^1 x \frac{1}{2}(3x^2 - 1) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{3x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \right) = 0.$$

$$\int_{-1}^1 P_1(x)P_3(x) dx = \int_{-1}^1 x \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{5x^5}{5} - \frac{3x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 =$$

$$= \frac{1}{2} (1 - 1 - (-1) + (-1)) = 0.$$

Hermite võrrand on lineaarne võrrand kujul

$$y'' - 2xy' + 2ny = 0,$$

kus n on reaalarv. Võrrandi üldlahend on kujul

$$y(x) = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x),$$

kus a_0 ja a_1 on konstandid ja y_1 sisaldab ainult paarisarvulisi muutuja x astmeid ja y_2 sisaldab ainult paarituuravulisi muutuja x astmeid. Kui n on paarisarv, siis $a_1 = 0$ ja kui n on paaritu, siis $a_0 = 0$. Selle võrrandi erilahenditeks on n astme polünoomid, mida nimetatakse **Hermite polünoomideks**

$$H_n(x) = (2x)^n - \frac{n(n-1)}{1!} (2x)^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{2!} (2x)^{n-4} - \dots$$

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x, \quad H_2(x) = 4x^2 - 2, \quad H_3(x) = 8x^3 - 12x,$$

$$H_4(x) = 16x^4 - 48x^2 + 12, \quad H_5(x) = 32x^5 - 160x^3 + 120x.$$

Kehtib rekursiivne seos

$$H_{n+1}(x) - 2xH_n(x) + 2nH_{n-1}(x) = 0,$$

ette andes $H_0(x) = 1, H_1(x) = 2x$, saab leida kõik kõrgemat järku polünoomid.

Hermite funktsioonid

$$y_n(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} H_n(x), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

on lahendiks diferentsiaalvõrrandile, mis on kujul

$$y'' + (1 - x^2 + 2n)y = 0,$$

lahendamiseks tuleb teha muutuja vahetus

$$y(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} v(x).$$

Hermite funktsioonid on ortogonaalsed. Nad on seotud kvantum-mehaanika ülesannetega ja ka Schrödingeri võrrandiga.

Laguerre võrrand on lineaarne võrrand kujul


$$xy'' + (1-x)y' + ny = 0,$$

kus n on reaalarv. Selle võrrandi erilahenditeks on n astme polünoomid, mida nimetatakse **Laguerre polünoomideks**

$$L_n(x) = (-1)^n \left[x^n - \frac{n^2}{1!} x^{n-1} + \frac{n^2(n-1)^2}{2!} x^{n-2} - \dots + (-1)^n n! \right].$$

$$L_0(x) = 1, \quad L_1(x) = 1 - x, \quad L_2(x) = 2 - 4x + x^2, \quad L_3(x) = 6 - 18x + 9x^2 - x^3.$$

Kehtib järgmine rekursiivne seos



$$L_{n+1}(x) - (1 - 2n - x)L_n(x) + n^2 L_{n-1}(x) = 0,$$

millest saab leida kõik kõrgemat järku polünoomid, andes ette $L_0(x) = 1$ ja $L_1(x) = 1 - x$.

Besseli võrrand on lineaarne võrrand kujul

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0,$$

kus n on reaalarv. Kasutatakse membraanide vibratsioonide leidmisel ja ka Schrödingeri võrrandi lahendamisel ringis ning sfääril. Selle võrrandi erilahenditeks on n astme polünoomid, mida nimetatakse **Besseli funktsioonideks**, I liiki

$$J_n(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^n \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{(-1)^m}{m!(n+m)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m}.$$

$$J_0(x) = 1 - \frac{1}{(1!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \frac{1}{(2!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^4 - \frac{1}{(3!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^6 + \dots$$

$$J_1(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{1!2!} \left(\frac{x}{2}\right)^3 + \frac{1}{2!3!} \left(\frac{x}{2}\right)^5 - \frac{1}{3!4!} \left(\frac{x}{2}\right)^7 + \dots$$

Suurte x väärtuste korral kehtib

$$J_n(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin\left(x - \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right).$$

Besseli funktsioon $J_{n+1/2}(x)$ jaoks

$$J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x, \quad J_{\frac{3}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(\frac{\sin x}{x} - \cos x\right).$$

Kehtib ka rekursiivne seos


$$J_{n+1}(x) - \frac{2n}{x} J_n(x) + J_{n-1}(x) = 0.$$

Kasutusel on sfäärilised Besseli funktsioonid järguga n

$$j_n(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{n+1/2}(x), \quad n \geq 0.$$

Sfäärilised Neumanni funktsioonid avalduvad järgmiselt:

$$\eta_n(x) = (-1)^{n+1} \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{-n-1/2}(x), \quad n \geq 0.$$



5.6. KÕRGEMAT JÄRKU DIFERENTSIAALVÕRRANDID

Olgu võrrandis kõige kõrgem tuletise järk n , siis on **n -järku diferentsiaalvõrrandi üldkuju** on

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

Definitsioon 5.18.

Olgu funktsioon $F = F(x, y, y_1, y_2, \dots, y_n)$ määratud muutujate $x, y, y_1, y_2, \dots, y_n$ piirkonnas G . Vahemikus (a, b) **määratud** funktsiooni

$$y = y(x)$$

nimetatakse võrrandi

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

lahendiks selles vahemikus, kui

- 1) funktsioon $y(x)$ on **n korda pidevalt diferentseeruv** vahemikus (a, b) ;
- 2) iga $x \in (a, b)$ korral punkt koordinaatidega $(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x))$ kuulub funktsiooni F määramispiirkonda G ;
- 3) funktsiooni $y(x)$ asetamisel võrrandisse $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ otsitava y kohale saame **samasuse** $x \in (a, b)$ suhtes:

$$F(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0 \text{ iga } x \in (a, b) \text{ korral.}$$

Siis öeldakse ka, et funktsioon $y = y(x)$ **rahuldab** võrrandit vahemikus (a, b) .

Definitsioon 5.19.

Võrrandit kujul

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}) \quad (5.28)$$

nimetatakse n -järku hariliku diferentsiaalvõrrandi **normaalkujuks**.

Võrrandi lahendi all mõistame funktsiooni, mille asetamisel võrrandisse saame samasuse sõltumatu muutuja suhtes.

Definitsioon 5.20.

Normaalkujulise n -järku diferentsiaalvõrrandi **üldlahendiks** nimetatakse võrrandi (5.28) lahendit

$$y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n),$$

kus C_1, C_2, \dots, C_n on suvalised konstandid.

Suvalised konstandid võib määrata **algtingimustest**

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, y''(x_0) = y_2, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}. \quad (5.29)$$

Kui $n > 2$, siis võivad n -järku diferentsiaalvõrrandiga kaasned ka tingimused, mis seovad otsitava funktsiooni $y = y(x)$ ja tema tuletiste väärtusi integreerimislõigu $[a, b]$ rajapunktides $x = a$ ja $x = b$. Niisuguseid tingimusi nimetatakse **rajatingimusteks**, diferentsiaalvõrrandit koos rajatingimustega aga **rajaülesandeks**.

Teoreem 5.6.

Cauchy teoreem. Olgu funktsioon

$$f(x, y, y_1, y_2, \dots, y_{n-1})$$

pidev muutujate $x, y, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$ piirkonnas D ning olgu tal olemas esimest järku osatuletised argumentide $y, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$ järgi, mis olgu samuti pidevad piirkonnas D . Siis iga punkti $(x_0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in D$ korral on Cauchy ülesandel (5.28), (5.29) olemas **parajasti üks lahend $y = y(x)$** .

Definitsioon 5.21.

Normaalkujulise **n -järku diferentsiaalvõrrandi üldlahendiks** piirkonnas D nimetatakse seost

$$y = y(x, C_1, C_2, \dots, C_n),$$

kus C_1, C_2, \dots, C_n on suvalised konstandid, mille puhul iga $(x_0, y_0, y_0^1, \dots, y_0^{n-1}) \in D$ jaoks leiduvad konstantide väärtused nii, et neile väärtustele vastav lahend rahuldab algtingimusi (5.29).

Definitsioon 5.22.

Normaalkujulise **n -järku diferentsiaalvõrrandi erilahendiks** nimetatakse lahendit, mis saadakse üldlahendist konstantide C_1, C_2, \dots, C_n konkreetsete väärtuste korral.

Näide 5.38. Lahendada võrrand $y^{(n)} = f(x)$.

Leiame üldlahendi algtingimustel $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, y''(x_0) = y_2, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$.

Integreerime võrrandi mõlemat poolt, saame

$$y^{(n-1)} = \int_{x_0}^x f(x) dx + C_1,$$

kus x_0 on argumenti mistahes fikseeritud väärtus ja C_1 on integreerimiskonstant. Integreerime veelkord,

$$y^{(n-2)} = \int_{x_0}^x \left[\int_{x_0}^x f(x) dx \right] + C_1(x - x_0) + C_2.$$

Jätkame protsessi, saame

$$y = \int_{x_0}^x \dots \left[\int_{x_0}^x f(x) dx \right] + C_1 \frac{(x - x_0)^{n-1}}{(n-1)!} + C_2 \frac{(x - x_0)^{n-2}}{(n-2)!} + \dots + C_n.$$

Kui meil on algtingimused

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad y''(x_0) = y_2, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1},$$

siis saame

$$C_n = y_0, C_{n-1} = y_1, C_{n-2} = y_2, \dots, C_1 = y_{n-1}.$$

Näide 5.39. Lahendada võrrand

$$y''' = e^{kx+1},$$

kus k on mingi nullist erinev reaalarv.

Integreerime võrrandi mõlemaid pooli muutuja x järgi, saame

$$y'' = \frac{1}{k} e^{kx+1} + C_1,$$

kus C_1 on suvaline konstant. Integreerides veel kaks korda, saame võrrandi üldlahendiks

$$y = \frac{1}{k^3} e^{kx+1} + C_1 x^2 + C_2 x + C_3,$$

kus C_1, C_2 ja C_3 on suvalised konstandid.

Diferentsiaalvõrrand kujul

$$F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0,$$

on lahendatav järku alandamise teel muutuja vahetusega

$$y^{(k)} = z,$$

lugedes suuruse z muutuja x funktsiooniks $z = z(x)$. Uue otsitava funktsiooni kaudu saadud diferentsiaalvõrrand on $(n - k)$ -järku kujul

$$F(x, z, z', \dots, z^{(n-k)}) = 0.$$

Näide 5.40. Lahendada võrrand $y^{(4)} = \sqrt{y''''}$.

Alandame võrrandi järku asendusega

$$y'''' = z,$$

lugedes suuruse z muutuja x funktsiooniks $z = z(x)$. Siis saame diferentsiaalvõrrandi kujul

$$\sqrt{z} = z'$$

ehk esimest järku eralduvate muutujatega võrrandi, lahendame selle võrrandi

$$\frac{dz}{dx} = \sqrt{z},$$

$$\frac{dz}{\sqrt{z}} = dx,$$

$$2\sqrt{z} = x + C_1 \text{ ehk } 4z = (x + C_1)^2.$$

Kuna muutujate eraldamisel jagades läbi suurusega \sqrt{z} eeldame, et $\sqrt{z} \neq 0$, seetõttu võrrandi lahendiks on ka $z = 0$. Asendame tagasi z avaldise, saame võrrandi

$$y'''' = \frac{1}{4} (x + C_1)^2,$$

mille lahendamiseks integreerime kolm korda järjest, saame

$$y'' = \frac{1}{12} (x + C_1)^3 + C_2,$$

$$y' = \frac{1}{48} (x + C_1)^4 + C_2 x + C_3,$$

$$y = \frac{1}{240} (x + C_1)^5 + \frac{x^2}{2} C_2 + C_3 x + C_4.$$

Lahendades võrrandist $z = 0$ saadava võrrandi $y'''' = 0$, saame lisaks üldlahendi kujul

$$y = C_5 x^2 + C_6 x + C_7.$$

Võrrand kujul

$$F(y, y', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad n \geq 2,$$

mis ei sisalda sõltumatut muutujat x , on lahendatav järgu alandamise teel muutuja vahetusega

$$y' = z,$$

kus $z = z(y)$ on muutuja y funktsioon, mitte argumenti x funktsioon. Siis

$$y'' = \frac{d(y')}{dx} = \frac{dz(y)}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx} = z'z,$$

$$y''' = \frac{d(y'')}{dx} = \frac{d(z'z)}{dx} = \frac{d(z'z)}{dy} \frac{dy}{dx} = z''z^2 + (z')^2z.$$

Järgnevate tuletistega säilib saadud seaduspärasus: iga järgmine y tuletis sisaldab uue muutuja z tuletisi, alates esimest järku tuletisest kuni ühe võrra väiksema järguni: $y^{(k)}$ sisaldab uue muutuja z tuletisi $z', z'', \dots, z^{(k-1)}$, $2 \leq k \leq n$.

Näide 5.41. Lahendada võrrand $y'^2 + yy'' = 0$.

Alandame võrrandi järku asendusega

$$y' = z,$$

lugedes suuruse z muutuja y funktsiooniks $z = z(y)$. Siis

$$y'' = z'z$$

ja diferentsiaalvõrrand saab kuju

$$z^2 + yz'z = 0$$

ehk

$$\frac{dz}{dy}zy = -z^2,$$

$$\frac{z}{z^2}dz = -\frac{1}{y}dy.$$

Lahendame saadud esimest järku võrrandi, saame

$$\ln|z| = -\ln|y| + \ln C_1,$$

$$|z| = \frac{C_1}{|y|}.$$

Asendame $z = y'$, saame esimest järku võrrandi

$$y' = \frac{C_1}{y},$$

mille lahendiks on

$$y^2 = C_1x + C_2.$$

5.6.1. KÕRGEMAT JÄRKU LINEAARSED VÕRRANDID

Lineaarne homogeenne diferentsiaalvõrrand üldkujul on

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0, \quad (5.30)$$

kus $p_1(x), \dots, p_n(x)$ on pidevad funktsioonid. Seda võrrandit nimetatakse **linearseks homogenseks n -järku diferentsiaalvõrrandiks**.

Definitsioon 5.23.

Olgu $y_i = y_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) vahemikus (a, b) määratud ja $n - 1$ korda pidevalt diferentseeruvad funktsioonid. Determinanti

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \dots & y_n(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \dots & y_n'(x) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

nimetatakse funktsioonide $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ **Wronski determinandiks** ehk wronskiaaniks (punktis x).

Wronski determinanti tähistatakse ka $W(y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x))$, kus argument näitab, millistest funktsioonidest on Wronski determinant võetud.

Teoreem 5.7. Olgu $y_i = y_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) vahemikus (a, b) määratud ja $n - 1$ korda pidevalt diferentseeruvad funktsioonid. Kui funktsioonid y_1, y_2, \dots, y_n on **lineaarselt sõltuvad** vahemikus (a, b) , siis nende funktsioonide **Wronski determinant $W(x)$ on võrdne nulliga** iga $x \in (a, b)$ korral.

Vastupidine väide üldiselt ei kehti: Wronski determinant võib võrduda nulliga, kuid funktsioonid võivad olla lineaarselt sõltumatud antud piirkonnas.

Näide 5.42. Funktsioonid

$$y_1(x) = \begin{cases} x^3, & x < 0, \\ 0, & x \geq 0, \end{cases}$$

ja

$$y_2(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^3, & x \geq 0, \end{cases}$$

on lineaarselt sõltumatud vahemikus $(-\infty, \infty)$, kuid nende funktsioonide Wronski determinant $W(x)$ on võrdne nulliga iga $x \in (-\infty, \infty)$ korral.

Kui arvutame funktsioonidest Wronski determinandi, saame $x < 0$ korral

$$W(x) = \begin{vmatrix} x^3 & 0 \\ 3x^2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

ja ka $x \geq 0$ korral

$$W(x) = \begin{vmatrix} 0 & x^3 \\ 0 & 3x^2 \end{vmatrix} = 0.$$

Samas tingimusest

$$0 = k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) = \begin{cases} k_1 x^3, & x < 0, \\ k_2 x^3, & x \geq 0, \end{cases}$$

järeldub, et $k_1 = k_2 = 0$ ehk funktsioonid y_1 ja y_2 on lineaarselt sõltumatud.

Teoreem 5.8.

Kui lineaarse homogeense n -järku diferentsiaalvõrrandi (5.30) lahendid $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ on vahemikus **lineaarselt sõltumatud**, siis nende funktsioonide **Wronski determinant $W(x)$ on nullist erinev** iga $x \in (a, b)$ korral.

Definitsioon 5.24.

Öeldakse, et n -järku lineaarse homogeense diferentsiaalvõrrandi (5.30) mis tahes n lineaarselt sõltumatut lahendit moodustavad selle võrrandi **lahendite fundamentaalsüsteemi**.

Teoreem 5.9.

Olgu lineaarse homogeense n -järku diferentsiaalvõrrandi (5.30) kordajad pidevad funktsioonid vahemikus (a, b) . Olgu $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ võrrandi lahendite fundamentaalsüsteem, siis võrrandi (5.30) **üldlahend** avaldub kujul

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x) = \sum_{k=1}^n C_k y_k(x). \quad (5.31)$$

Üldlahendiga on määratud ära võrrandi (5.30) kõik lahendid, st võrrandi (5.30) mistahes lahendi saame üldlahendist konstantide C_1, C_2, \dots, C_n sobiva fikseerimise teel.

Lineaarse homogeense diferentsiaalvõrrandi järku alandamine.

Lineaarse homogeense võrrandi saab lahendada nii, et leiame kõigepealt selle võrrandi n lineaarselt sõltumatut lahendit ja kirjutame vastuse kujul (5.31), selleks üldine meetod puudub. Sellepärast tuleb võrrandi lahendamiseks sageli kasutada üldist **järku alandamise võtet**.

Kui me teame võrrandi mingit lahendit $y_1(x) \neq 0$, siis võime võrrandi järku alandada võrrandi lineaarsust säilitades. Seda saame teha kahe asendusega: esiteks asendame võrrandis

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0,$$

$$y = y_1 \cdot z,$$

ning siis alandame võrrandi järku asendusega

$$z' = u, \quad z = z(x), u = u(x).$$

Liouville'i-Ostrogradski valem.

Olgu $p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x)$ mingid pidevad funktsioonid, kui $a < x < b$, ning oletame, et funktsioonid $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ moodustavad lahendite fundamentaalsüsteemi lineaarse homogeense n -järku diferentsiaalvõrrandi

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0$$

jaoks. Siis funktsioonide $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ Wronski determinant $W(x)$ on vahemikus (a, b) nullist erinev iga $x \in (a, b)$ korral.

Siis võrrandist

$$W' + p_1(x)W = 0$$

saame Wronski determinandi W jaoks avaldise, mida nimetatakse **Liouville'i-Ostrogradski valemiks** (mõnikord ka Abeli valemiks)

$$W(x) = C e^{-\int p_1(x) dx}, \quad a < x < b,$$

kus C on suvaline konstant, mis ei saa olla null.

Kuigi võrrandi (5.30) lahendite fundamentaalsüsteem $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ sõltub selle võrrandi kõigist kordajatest $p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x)$, sõltub lahendite Wronski determinant $W(x)$ ainult kordajast $p_1(x)$.

Lineaarne mittehomogeenne diferentsiaalvõrrand on võrrand kujul

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f(x).$$

Kui on teada lineaarse homogeense diferentsiaalvõrrandi

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0$$

jaoks n lineaarselt sõltumatut lahendit

$$y_h = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + \dots + C_ny_n(x)$$

ja mittehomogeense võrrandi üks **erilahend Y** , siis **mittehomogeense diferentsiaalvõrrandi üldlahend** avaldub kujul

$$y = Y + C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + \dots + C_ny_n(x). \quad (5.32)$$

Lineaarse mittehomogeense diferentsiaalvõrrandi mistahes lahend on saadav üldlahendist (5.32) konstantide C_1, C_2, \dots, C_n väärtuste fikseerimisel.

Erilahendi Y leidmine konstantide varieerimise meetodiga.

Erilahendit $Y(x)$ otsitakse järgmisel kujul

$$Y(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x) + \dots + C_n(x)y_n(x),$$

homogeense võrrandi üldlahendisse (5.31) asendame suvalised konstandid C_1, C_2, \dots, C_n funktsioonidega $C_1(x), C_2(x), \dots, C_n(x)$. Funktsioonid $C_1(x), C_2(x), \dots, C_n(x)$ määratakse nii, et $Y(x)$ rahuldaks mittehomogeenset võrrandit. See on ainult üks tingimus n funktsiooni määramiseks. Puuduvad tingimused võime vabalt ette anda, need anname ette nii, et lahendi $y_h(x)$ tuletised kuni järguni $n - 1$ oleksid võimalikult lihtsa kujuga.

Diferentseerime $Y(x)$ avaldist, saame

$$Y' = C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) + \dots + C_n'(x)y_n(x) + \\ + C_1(x)y_1'(x) + C_2(x)y_2'(x) + \dots + C_n(x)y_n'(x).$$

Esimese vabalt valitud tingimusena nõuame, et viimase avaldise paremal pool olev esimene summa oleks võrdne nulliga:

$$C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) + \dots + C_n'(x)y_n(x) = 0.$$

Siis

$$Y' = C_1(x)y_1'(x) + C_2(x)y_2'(x) + \dots + C_n(x)y_n'(x),$$

mille diferentseerimisel saame

$$Y'' = C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) + \dots + C_n'(x)y_n'(x) + \\ + C_1(x)y_1''(x) + C_2(x)y_2''(x) + \dots + C_n(x)y_n''(x).$$

Teise tingimusena nõuame, et

$$C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) + \dots + C_n'(x)y_n'(x) = 0.$$

Siis

$$Y'' = C_1(x)y_1''(x) + C_2(x)y_2''(x) + \dots + C_n(x)y_n''(x).$$

Sarnaselt diferentseerime edasi ja toome sisse uued lisatingimused kuni saame

kus a_1, \dots, a_n on konstandid ja $f(x)$ antud vabaliige ja $y = y(x)$ otsitav funktsioon. Võrrand on erijuht võrrandist (5.30).

Võrrandi lahendamiseks tuleb lahendada kõigepealt **vastav homogeenne võrrand** kujul

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0, \quad (5.35)$$

selleks koostame karakteristliku võrrandi

$$k^n + a_1 k^{n-1} + \dots + a_{n-1} k + a_n = 0 \quad (5.36)$$

ja leiame lahendina karakteristlikud väärtused k_1, \dots, k_n .

Definitsioon 5.25.

Võrrandit (5.36)

$$k^n + a_1 k^{n-1} + \dots + a_{n-1} k + a_n = 0$$

nimetatakse diferentsiaalvõrrandi (5.35) **karakteristlikuks võrrandiks**, võrrandi (5.36) lahendeid nimetatakse **karakteristlikeks väärtusteks**. Võrrandi (5.36) vasakul poolel olevat polünoomi

$$P(k) = k^n + a_1 k^{n-1} + \dots + a_{n-1} k + a_n$$

nimetatakse võrrandi (5.35) **karakteristlikuks polünoomiks**.

Karakteristlike väärtuste iseloomule vastavalt (reaalsed või kompleksed, kordsed) kirjutame välja võrrandi lineaarselt sõltumatud erilahendid y_1, \dots, y_n ja nende lineaarse kombinatsioonina ka võrrandi üldlahendi.

- a) igale **reaalsele ühekordsele** karakteristlikule väärtusele k_i vastab erilahend kujul

$$y_i = e^{k_i x},$$

- b) igale **m-kordsele reaalsele** karakteristlikule väärtusele k_i vastab m erilahendit kujul

$$e^{k_1 x}, x e^{k_1 x}, x^2 e^{k_1 x}, \dots, x^{m-1} e^{k_1 x},$$

- c) igale kompleksarvulistele karakteristlike väärtuste paarile $k_{j,l} = \alpha \pm i\beta$ vastab kaks reaalselt erilahendit kujul

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x,$$

- d) igale **m-kordsele kompleksarvulisele** karakteristlike väärtuste paarile $k_{j,l} = \alpha \pm i\beta$ vastab $2m$ reaalselt erilahendit kujul

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, x e^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{m-1} e^{\alpha x} \cos \beta x,$$

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, x e^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{m-1} e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Teoreem 5.10.

Kui funktsioon $y = u + iv$ on lineaarse homogeenne diferentsiaalvõrrandi kompleksarvuliseks lahendiks, siis selle reaalosa u ja imaginaarosa kordaja v on samuti võrrandi lahendiks.

Teoreem 5.11.

Kui konstantsete kordajatega lineaarse homogeenne n -järku diferentsiaalvõrrandi (5.35) karakteristlikud väärtused k_1, \dots, k_n on paarikaupa erinevad, siis funktsioonid $y_i = e^{k_i x}$ moodustavad diferentsiaalvõrrandi (5.35) lahendite fundamentaalsüsteemi ja seega tema üldlahendiks on

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x} + \dots + C_n e^{k_n x},$$

kus $-\infty < x < \infty$ ja C_1, C_2, \dots, C_n on suvalised konstandid.

Teoreem kehtib ka kompleksarvuliste karakteristiklike väärtuste korral

$$k_j = \alpha + i\beta, k_l = \alpha - i\beta,$$

kuid sellisel juhul vastab kompleksarvuliste lahenditele kaks reaalselt lahendit, milleks on kompleksarvulise lahendi reaalosa ja imaginaarosa kordaja. Näiteks kui

$$y_1 = e^{k_1 x} = e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x} \cos \beta x + i e^{\alpha x} \sin \beta x$$

ja

$$y_2 = e^{k_2 x} = e^{(\alpha-i\beta)x} = e^{\alpha x} \cos \beta x - i e^{\alpha x} \sin \beta x,$$

siis sellest, et y_1 on võrrandi kompleksarvuliseks lahendiks, järeldub teoreemist 5.10, et ka lahendi reaalosa $Re(y_1) = e^{\alpha x} \cos \beta x$ ja imaginaarosa kordaja $Im(y_1) = e^{\alpha x} \sin \beta x$ on selle võrrandi lahenditeks. Seega kompleksarvuliste lahenditele y_1 ja y_2 vastab kaks reaalselt lahendit kujul

$$\tilde{y}_1 = Re(y_1) = e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad \tilde{y}_2 = Im(y_1) = e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Näide 5.43. Leida üldlahend võrrandile

$$y''' - 2y'' - 3y' = 0.$$

Vastav karakteristiklik võrrand on kujul

$$k^3 - 2k^2 - 3k = 0, k(k^2 - 2k - 3) = 0,$$

karakteristiklikud väärtused on

$$k_1 = 0, k_2 = -1, k_3 = 3.$$

Võrrandi erilahendid on

$$y_1 = e^{0x} = 1, y_2 = e^{-x}, y_3 = e^{3x}$$

ja võrrandi üldlahendiks on

$$y = C_1 + C_2 e^{-x} + C_3 e^{3x}.$$

Näide 5.44. Lahendada diferentsiaalvõrrand

$$y''' - y'' - y' + y = 0.$$

Vastav karakteristiklik võrrand on kujul

$$k^3 - k^2 - k + 1 = 0$$

ja selle lahendid on

$$k_1 = -1, k_2 = k_3 = 1.$$

Võrrandi erilahendid on

$$y_1 = e^{-x}, y_2 = e^x, y_3 = x e^x$$

ja võrrandi üldlahendiks on

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x + C_3 x e^x.$$

Näide 5.45. Lahendada diferentsiaalvõrrand

$$y^{(7)} - 2y^{(6)} + 2y^{(5)} - 4y^{(4)} + y''' - 2y'' = 0.$$

Vastav karakteristiklik võrrand on kujul

$$k^7 - 2k^6 + 2k^5 - 4k^4 + k^3 - 2k^2 = k^2(k-2)(k^2+1)^2 = 0$$

ja selle lahendid on

$$k_1 = k_2 = 0, k_3 = 2, k_4 = k_5 = i, k_6 = k_7 = -i.$$

Võrrandi erilahendid on

$$y_1 = 1, \quad y_2 = x, \quad y_3 = e^{2x}, \quad y_4 = \cos x, \\ y_5 = x \cos x, \quad y_6 = \sin x, \quad y_7 = x \sin x.$$

ja võrrandi üldlahendiks on

$$y = C_1 + C_2x + C_3e^{2x} + (C_4 + C_5x) \cos x + (C_6 + C_7x) \sin x.$$

Mittehomogeense võrrandi lahend avaldub vastava homogeense võrrandi lahendi ja ühe mittehomogeense võrrandi erilahendi summana:

$$y = C_1y_1 + \dots + C_ny_n + Y,$$

kus Y on mittehomogeense võrrandi üks erilahend.

Näide 5.46. Leida erilahend võrrandile

$$y''' - y'' = e^x.$$

Kuna vastava karakteristliku võrrandi

$$k^3 - k^2 = 0$$

lahendid on $k_1 = 1, k_2 = k_3 = 0$, siis vastava homogeense võrrandi üldlahendiks on

$$y_h = C_1 + C_2x + C_3e^x.$$

Seega üks karakteristliku võrrandi lahenditest $k_1 = 1$ on võrdne arvu e^x astmes oleva argumenti x kordajaga. Seetõttu otsime erilahendit kujul

$$Y = Axe^x,$$

siis

$$Y' = Ae^x + Axe^x,$$

$$Y'' = Ae^x + Ae^x + Axe^x = 2Ae^x + Axe^x,$$

$$Y''' = 2Ae^x + Ae^x + Axe^x = 3Ae^x + Axe^x.$$

Tundmatu kordaja A määramiseks asetame võrrandisse otsitava y tuletiste asemele vastavad Y tuletiste avaldised. Saame

$$3Ae^x + Axe^x - 2Ae^x - Axe^x = e^x$$

ehk

$$Ae^x = e^x.$$

Siit saame, et $A = 1$ ja otsitavaks erilahendiks on

$$Y = xe^x.$$

5.7. DIFERENTSIAALVÕRRANDITE SÜSTEEMID

Paljude ülesannete lahendamisel tuleb leida funktsioonid

$$y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x),$$

mis rahuldavad diferentsiaalvõrrandite süsteemi argumenti x , otsitavate funktsioonide y_1, y_2, \dots, y_n ning nende tuletiste suhtes. Harilike diferentsiaalvõrrandite süsteemi üldkujus võib olla

otsitavate funktsioonide kõrgemat järku tuletisi. Kõrgemat järku tuletised on võimalik uute muutujate sissetoomise teel asendada temaga samaväärselise normaalkujulise süsteemiga.

Definitsioon 5.26.

Normaalkujuliseks süsteemiks (normaalsüsteemiks) nimetatakse diferentsiaalvõrrandite süsteemi, kus võrrandite vasakuteks poolteks on otsitavate funktsioonide esimest järku tuletised, paremad pooled aga tuletisi ei sisalda:

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = F_1(x, y_1, \dots, y_n), \\ \frac{dy_2}{dx} = F_2(x, y_1, \dots, y_n), \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ \frac{dy_n}{dx} = F_n(x, y_1, \dots, y_n), \end{cases} \quad (5.37)$$

kus $F_k(x, y_1, \dots, y_n)$ on antud funktsioonid $k = 1, 2, \dots, n$, $y_k = y_k(x)$ on otsitavad funktsioonid.

Näide 5.47. Leida järgmise süsteemi normaalkuju

$$\begin{cases} y' - 2zz' = 0, \\ \sin x + y'' - z^2 = 0. \end{cases}$$

Avaldame teisest võrrandist y'' ja esimesest z' , saame süsteemi kujul

$$\begin{cases} z' = \frac{y'}{2z}, \\ y'' = z^2 - \sin x. \end{cases}$$

Võtame kasutusele uue funktsiooni

$$w = y',$$

saame süsteemi asendada kolmandat järku normaalkujulise süsteemiga otsitavate y , z ja w suhtes:

$$\begin{cases} y' = w, \\ z' = \frac{w}{2z}, \\ w' = z^2 - \sin x. \end{cases}$$

Normaalsüsteemi järguks nimetatakse normaalsüsteemis sisalduvate võrrandite arvu. Süsteem (5.37) on n -järku.

Definitsioon 5.27.

Normaalsüsteemi (5.37) lahendiks vahemikus (a, b) nimetatakse suvalist kogumit n funktsioonist $y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x)$, mis on määratud ja pidevalt diferentseeruvad vahemikus (a, b) , kui ta muudab samasuseks süsteemi (5.37) iga võrrandi iga $x \in (a, b)$ korral.

Definitsioon 5.28.

Diferentsiaalvõrrandite süsteemi (5.37) jaoks **Cauchy ülesanne** seisneb järgnevas: leida süsteemi lahendite hulgast niisugune

$$y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x),$$

mis rahuldab tingimusi

$$y_1 = y_1^0, y_2 = y_2^0, \dots, y_n = y_n^0,$$

kui $x = x_0$, kus $y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0$ on ette antud arvud ehk algväärtused

$$y_1(x_0) = y_1^0, y_2(x_0) = y_2^0, \dots, y_n(x_0) = y_n^0.$$

Arv x_0 on sõltumatu muutuja x algväärtus.

Algingimused on kujul

$$y_k(x_0) = y_k^0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Definitsioon 5.29.

Normaalsüsteemi (5.37) üldlahendiks (piirkonnas D) nimetatakse n suvalisest konstandist C_1, C_2, \dots, C_n sõltuvat süsteemi lahendit

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \\ y_2 = f_2(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \\ \dots \\ y_n = f_n(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \end{cases} \quad (5.38)$$

millel on järgmine omadus: iga punkti $(x_0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0) \in D$ leiduvad sellised konstantide väärtused $C_1 = C_1^0, C_2 = C_2^0, \dots, C_n = C_n^0$, et vastav lahend (integraalköver) (5.35) kulgeb läbi mainitud punkti, st rahuldab tingimusi

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_0, C_1^0, C_2^0, \dots, C_n^0), \\ y_2 = f_2(x_0, C_1^0, C_2^0, \dots, C_n^0), \\ \dots \\ y_n = f_n(x_0, C_1^0, C_2^0, \dots, C_n^0). \end{cases}$$

Üldlahendist (5.38) konstantide C_1, C_2, \dots, C_n väärtuste fikseerimisel saadavaid lahendeid nimetatakse süsteemi (5.37) **erilahenditeks**.

Näide 5.48. Näidata, et järgmise diferentsiaalvõrrandite süsteemi

$$\begin{cases} y' = y - z, \\ z' = z - 4y \end{cases}$$

lahendiks on

$$\begin{cases} y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}, \\ z = 2C_1 e^{-x} - 2C_2 e^{3x}, \end{cases}$$

kus C_1 ja C_2 on suvalised konstandid.

Leiame lahenditest tuletised (võrrandite vasakud pooled) ja näitame, et need on võrdsed võrrandite paremate pooltega

$$y' = -C_1 e^{-x} + 3C_2 e^{3x},$$

$$y - z = -C_1 e^{-x} + 3C_2 e^{3x},$$

$$z' = -2C_1 e^{-x} - 6C_2 e^{3x},$$

$$z - 4y = -2C_1 e^{-x} - 6C_2 e^{3x}.$$

Järelikult funktsioonid y ja z on tõepoolest süsteemi lahendid konstantide C_1 ja C_2 mis tahes väärtuste korral.

Mõnikord ei sõltu süsteemis olevad võrrandid teistest muutujatest, siis on võimalik lahendada võrrandid eraldi diferentsiaalvõrranditena. Järgnevas näites koosneb süsteem kahest teineteisest sõltumatust diferentsiaalvõrrandist ja süsteemi lahendamine taandub kahe eraldi võrrandi lahendamisele.

Näide 5.49. Leida järgmise normaalsüsteemi erilahend

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}, \\ \frac{dz}{dx} = \frac{z}{x}, \end{cases}$$

algtingimustel

$$y(1) = 2 \text{ ja } z(1) = 3.$$

Tegemist on sellise süsteemiga, mille mõlemad võrrandid on eraldi lahendatavad, nad ei sõltu teisest muutujast. Kõigepealt korrutame mõlemat võrrandit suurusega dx ja seejärel jagame esimest võrrandit suurusega y ja teist võrrandit suurusega z , saame

$$\begin{cases} \frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}, \\ \frac{dz}{z} = \frac{dx}{x}. \end{cases}$$

Integreerides mõlemaid võrrandeid, saame

$$\begin{cases} \ln|y| = \ln|x| + \ln C_1, \\ \ln|z| = \ln|x| + \ln C_2. \end{cases}$$

Üldlahend avaldub järgmiselt

$$\begin{cases} y = C_1 x, \\ z = C_2 x. \end{cases}$$

Erilahendi saamiseks rakendame rajatingimusi, saame konstantide C_1 ja C_2 väärtused järgmiselt:

$$C_1 = 2, C_2 = 3.$$

Seega erilahendiks on

$$y = 2x, z = 3x.$$

5.7.1. ÜHELE VÕRRANDILE TAANDAMISE MEETOD

Diferentsiaalvõrrandite süsteemide üks põhilisi lahendusmeetodeid seisneb nende taandamises ühele kõrgemat järku diferentsiaalvõrrandile. Lahendades selle võrrandi, leiame ühe otsitavatest funktsioonidest. Ülejäänud otsitavad funktsioonid leiame lähtesüsteemi võrrandite ja süsteemi teisendamise käigus saadud seoste abil. Kuna diferentsiaalvõrrandite süsteemi ühele kõrgemat järku võrrandile taandamisel on põhilisteks operatsioonideks võrrandite diferentseerimine ja muutujate elimineerimine, nimetatakse ühele muutujale taandamise meetodit tihti ka **elimineerimismeetodiks**.

Näide 5.50. Kasutades elimineerimismeetodit, lahendada diferentsiaalvõrrandite süsteem

$$y' = z, \quad z' = y,$$

kus $y = y(x)$ ja $z = z(x)$ on otsitavad funktsioonid.

Diferentseerime esimest võrrandit, saame

$$y'' = z'$$

ja asendame teise võrrandisse, saame teist järku diferentsiaalvõrrandi kujul

$$y'' = y,$$

üldlahendiks saame

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x.$$

Esimesest võrrandist saame otsitava funktsiooni z :

$$z = -C_1 e^{-x} + C_2 e^x.$$

Näide 5.51. Kasutades elimineerimismeetodit, lahendada diferentsiaalvõrrandite süsteem

$$\begin{cases} y - 2zz' = 0, \\ \sin x + y'' - z^2 = 0, \end{cases}$$

kus $y = y(x)$ ja $z = z(x)$ on otsitavad funktsioonid.

Diferentseerime teist võrrandit, saame

$$\cos x + y''' - 2zz' = 0$$

ja elimineerime korrutise $2zz'$, liites võrrandid kokku. Saime kolmandat järku konstantsete kordajatega lineaarse võrrandi

$$y''' - y = -\cos x,$$

mille üldlahend avaldub kujul

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3 + Y,$$

kus Y on võrrandi erilahend ja $\{y_1, y_2, y_3\}$ vastava homogeense võrrandi lineaarselt sõltumatud erilahendid. Vastava homogeense võrrandi

$$y''' - y = 0$$

karakteristlik võrrand on kujul

$$k^3 - 1 = 0,$$

karakteristliku võrrandi lahenditeks on

$$k_1 = 1, k_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, k_3 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

seega homogeense võrrandi üldlahendiks on

$$y_h = C_1 e^x + e^{-\frac{x}{2}} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right).$$

Mittehomogeense võrrandi erilahendit otsime samal kujul funktsiooniga $(-\cos x)$, ehk trigonomeetriliste funktsioonide summana:

$$Y = A \sin x + B \cos x, \quad Y' = A \cos x - B \sin x,$$

$$Y'' = -A \sin x - B \cos x, \quad Y''' = -A \cos x + B \sin x.$$

Asendame erilahendi võrrandisse, saame:

$$-A \cos x + B \sin x - A \sin x - B \cos x = -\cos x.$$

Konstantide A ja B määramiseks peavad $\sin x$ ja $\cos x$ kordajad mõlemal pool võrdusmärgi olema võrdsed, siit saame kaks võrrandit:

$$-A - B = -1, \quad B - A = 0,$$

ehk

$$A = B = \frac{1}{2}.$$

Saime erilahendiks

$$Y = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x$$

ja üldlahendiks

$$y = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x + C_1 e^x + e^{-\frac{x}{2}} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right).$$

Nüüd on vaja leida teine otsitav funktsioon z , selleks kasutame teist võrrandit ja leiame üldlahendist y teise tuletise:

$$\begin{aligned} z^2 = \sin x - \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \cos x + C_1 e^x + \frac{1}{4} e^{-\frac{x}{2}} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right) + \\ + e^{-\frac{x}{2}} \left(-\frac{3}{4} C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x - \frac{3}{4} C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right). \end{aligned}$$

Näide 5.52. Kasutades elimineerimismeetodit, lahendada diferentsiaalvõrrandite süsteem

$$\begin{cases} y' = 2 - z, \\ z' = y - 4 \cos x, \end{cases}$$

kus $y = y(x)$ ja $z = z(x)$ on otsitavad funktsioonid.

Avaldame esimesest võrrandist otsitava z ja diferentseerime saadud võrrandit:

$$z = 2 - y', \quad z' = -y''.$$

Nüüd asendame saadud z' avaldise teise võrrandisse, saame

$$-y'' = y - 4 \cos x$$

ehk

$$y'' + y = 4 \cos x. \quad (5.39)$$

Saime teist järku konstantsete kordajatega lineaarse diferentsiaalvõrrandi, mille üldlahend on kujul

$$y = y_h + Y,$$

kus y_h on võrrandile vastava homogeense võrrandi lahend ja Y on mittehomogeense võrrandi erilahend. Kõigepealt lahendame võrrandile vastava homogeense võrrandi

$$y'' + y = 0.$$

Lahendamiseks moodustame võrrandile vastava karakteristliku võrrandi

$$k^2 + 1 = 0,$$

mille lahenditeks on

$$k_1 = i, k_2 = -i.$$

Kuna tegemist on kompleksarvuliste karakteristikliku võrrandi lahenditega, siis homogeense võrrandi üldlahend avaldub kujul

$$y_h = e^{0x}(C_1 \sin x + C_2 \cos x) = C_1 \sin x + C_2 \cos x.$$

Mittehomogeense võrrandi erilahendi leidmisel peame arvestama, et võrrandis

$$y'' + ay' + by = F(x)$$

$a = 0$, see tähendab, et võrrandis puudub liige, mis sisaldab y' . Kuna $F(x) = 4 \cos x$ ehk koosinuse argument on 1 korda x ja karakteristikliku võrrandi lahendis imaginaarühiku kordaja on 1, siis meil on tegemist **erijuhuga**, mille korral peame erilahendit Y otsima kujul

$$Y = x(A \sin x + B \cos x).$$

Tuletiste leidmisel kasutame korrutise tuletise reeglit. Siis

$$Y' = A \sin x + B \cos x + x(A \cos x - B \sin x),$$

$$Y'' = A \cos x - B \sin x + A \cos x - B \sin x + x(-A \sin x - B \cos x).$$

Asendades suurused Y, Y'' mittehomogeensesse võrrandisse (5.39), saame

$$A \cos x - B \sin x + A \cos x - B \sin x + x(-A \sin x - B \cos x) + x(A \sin x + B \cos x) = 4 \cos x,$$

$$2A \cos x - 2B \sin x - x(A \sin x + B \cos x) + x(A \sin x + B \cos x) = 4 \cos x.$$

Nüüd taanduvad välja liikmed, mis sisaldavad $xA \sin x, xB \cos x$ (nii juhtub alati) ja on võimalik leida kordajate A, B väärtused, võrdsustades vasakul ja paremal pool võrdusmärki trigonomeetriliste funktsioonide kordajad.

$$\cos x \text{ kordajad: } 2A = 4, \quad A = 2,$$

$$\sin x \text{ kordajad: } -2B = 0, \quad B = 0.$$

Seega otsitav erilahend on kujul

$$Y = 2x \sin x$$

ja võrrandi üldlahendi saame

$$y = y_h + Y = C_1 \sin x + C_2 \cos x + 2x \sin x.$$

Kuna meil on tegemist süsteemiga, milles on vaja leida ka otsitav funktsioon $z = z(x)$, kasutame selleks eespool esimesest võrrandist saadud avaldist:

$$z = 2 - y',$$

$$y' = C_1 \cos x - C_2 \sin x + 2 \sin x + 2x \cos x,$$

$$z = 2 - y' = 2 - C_1 \cos x + C_2 \sin x - 2 \sin x - 2x \cos x.$$

Diferentsiaalvõrrandite süsteemi lahenditeks on seega

$$\begin{cases} y = C_1 \sin x + C_2 \cos x + 2x \sin x, \\ z = 2 - C_1 \cos x + C_2 \sin x - 2 \sin x - 2x \cos x. \end{cases}$$

5.7.2. INTEGREERUVATE KOMBINATSIOONIDE MEETOD

Teiseks meetodiks, mida sageli kasutatakse diferentsiaalvõrrandite süsteemide lahendamisel, on **integreeruvate kombinatsioonide meetod** ehk **kombineerimismeetod**. See meetod seisneb süsteemi võrrandite teisendamisel kujule, millest on lihtne leida võrrandeid kujul $\varphi(x, y_1, \dots, y_n) = C$. Süsteemi võrrandite teisendamisel sageli võrrandid liidetakse omavahel või lahutatakse ühest võrrandist teine. Nendele võtetele võib lisaks kasutada ka võrrandite läbikorrutamist sobivate funktsioonidega enne liitmist või lahutamist, et oleks võimalik saadud võrrandit integreerida.

Näide 5.53. Kasutades integreeruvate kombinatsioonide meetodit, lahendada diferentsiaalvõrrandite süsteem

$$\begin{cases} y' = z, \\ z' = y, \end{cases}$$

kus $y = y(x)$ ja $z = z(x)$ on otsitavad funktsioonid.

Tegemist on ülesandes 5.50 oleva süsteemiga, mille lahendasime elimineerimismeetodil. Lahendame sama ülesande nüüd teisel meetodil. Liites antud võrrandite vasakud ja paremad pooled, saame

$$y' + z' = z + y$$

ehk

$$\frac{d(y + z)}{dx} = y + z.$$

See ongi üheks integreeruvaks kombinatsiooniks, mille lahendamiseks teeme asenduse $u = y + z$ ja saame diferentsiaalvõrrandi

$$u' = u,$$

mille lahendiks on

$$u = C_1 e^x,$$

edasi asendades u avaldise tagasi

$$y + z = C_1 e^x$$

ja avaldades integreerimiskonstandi, saame

$$C_1 = e^{-x}(y + z).$$

Teise integreeruva kombinatsiooni saamiseks lahutame süsteemi esimesest võrrandist teise:

$$y' - z' = z - y$$

ehk

$$\frac{d(y - z)}{dx} = -(y - z).$$

Saime teise integreeruva kombinatsiooni, mille lahendamiseks teeme asenduse

$$u = y - z$$

ja saame diferentsiaalvõrrandi

$$u' = -u,$$

mille lahendiks on

$$u = C_2 e^{-x},$$

edasi asendame u avaldise tagasi, saame

$$y - z = C_2 e^{-x}$$

ja avaldades integreerimiskonstandi, saame

$$C_2 = e^x(y - z).$$

Süsteemi üldlahendi võib esitada kujul

$$\begin{cases} e^{-x}(y + z) = C_1, \\ e^x(y - z) = C_2. \end{cases}$$

Kui avaldada saadud seostest otsitavad funktsioonid y ja z , saame süsteemi üldlahendi kujul:

$$\begin{cases} y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}, \\ z = C_1 e^x - C_2 e^{-x}. \end{cases}$$

Saime sama tulemuse, mis ülesandes 5.50.

Näide 5.54. Kasutades integreeruvate kombinatsioonide meetodit, lahendada järgmine diferentsiaalvõrrandite süsteem

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{x - y}{z - t}, \\ \frac{dy}{dt} = \frac{x - y}{z - t}, \\ \frac{dz}{dt} = x - y + 1, \end{cases}$$

kus $x = x(t)$, $y = y(t)$ ja $z = z(t)$ on otsitavad funktsioonid.

Lahutame süsteemi esimesest võrrandist teise, saame

$$\frac{d(x - y)}{dt} = 0,$$

millest integreerimisel saame

$$x - y = C_1.$$

Asendades saadud avaldise süsteemi teise ja kolmandasse võrrandisse, saame teist järku süsteemi

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = \frac{C_1}{z - t}, \\ \frac{dz}{dt} = C_1 + 1. \end{cases}$$

Selle süsteemi teisest võrrandist saame integreerides avaldada z :

$$z = t + C_1 t + C_2.$$

Asendades saadud avaldise uue süsteemi esimesse võrrandisse, saame

$$\frac{dy}{dt} = \frac{C_1}{t + C_1 t + C_2 - t} = \frac{C_1}{C_1 t + C_2}.$$

Saadud võrrandi lahendamisel saame

$$y = \ln|C_1 t + C_2| + C_3.$$

Süsteemi üldlahend on kujul

$$\begin{cases} x = \ln|C_1 t + C_2| + C_1 + C_3, \\ y = \ln|C_1 t + C_2| + C_3, \\ z = t(1 + C_1) + C_2. \end{cases}$$

5.7.3. SÜMMEETRILISTE SÜSTEEMIDE LAHENDAMINE KOMBINEERIMISMEETODIL

Kirjutame normaalkujul oleva süsteemi (5.37) võrrandid ümber sümmeetrilisele kujule arvestades, et diferentsiaalide jagatised on otsitavate tuletised ja avaldades argumendi diferentsiaali igast võrrandist. Saame

$$dx = \frac{dy_1}{y_1}, dx = \frac{dy_2}{y_2}, \dots, dx = \frac{dy_n}{y_n}.$$

Süsteemi (5.37) **sümmeetriline** kuju on

$$\frac{dy_1}{F_1(x, y_1, \dots, y_n)} = \frac{dy_2}{F_2(x, y_1, \dots, y_n)} = \dots = \frac{dy_n}{F_n(x, y_1, \dots, y_n)} = \frac{dx}{1}.$$

Tegemist on süsteemi teise kirjutusviisiga, seetõttu võime lubada olukorda, kus osa nimetajatest sümmeetrilisel kujul on nullid. Nulliga võrduv nimetaja sümmeetrilises süsteemis tähendab selle muutuja diferentsiaali võrdumist nulliga. Näiteks kui

$$dy_1 = 0,$$

siis vastavat võrrandit integreerides saame $y_1 = C$, kus C on suvaline konstant.

Sümmeetrilise süsteemi lahendamiseks integreeruvate kombinatsioonide meetodil on võimalik kasutada **võrdsete murdude omadust**, mille kohaselt mistahes kordajate k_1, k_2, \dots, k_n ($|k_1| + |k_2| + \dots + |k_n| \neq 0$) korral kehtib

$$\frac{p_1}{q_1} = \frac{p_2}{q_2} = \dots = \frac{p_n}{q_n} = \frac{k_1 p_1 + k_2 p_2 + \dots + k_n p_n}{k_1 q_1 + k_2 q_2 + \dots + k_n q_n}.$$

Selle omaduse tõttu võime korrutada iga murru lugejat ja nimetajat ühe ja sama kordajaga ning tulemuseks on murd, mille lugejas on kõikide murdude lugejate summa ning nimetajas kõikide nimetajate summa. Integreeruva kombinatsiooni saamiseks võib teostada korrutamised ja liitmised nii, et nimetaja võrduks nulliga, mistõttu saame lugeja integreerimisel esimese integraali avaldise.

Näide 5.55.

Kasutades integreeruvate kombinatsioonide meetodit, lahendada järgmine sümmeetriline diferentsiaalvõrrandite süsteem

$$\frac{dx}{2y} = \frac{dy}{-\ln x} = \frac{dz}{\ln x - 2y}.$$

Esimene võrdus annab

$$-\ln x \, dx = 2y \, dy,$$

mille integreerimisel saame

$$-x \ln x - x = y^2 + C_1,$$

siit

$$y^2 + x(\ln x - 1) = C_1.$$

Teise integreeruva kombinatsiooni saamiseks proovime nimetajasse sada nulli, selleks liidame esialgse süsteemi kõikide murdude lugejad ja kõikide murdude nimetajad kokku, saame

$$\frac{dx}{2y} = \frac{dy}{-\ln x} = \frac{dz}{\ln x - 2y} = \frac{d(x + y + z)}{2y - \ln x + \ln x - 2y} = \frac{d(x + y + z)}{0}.$$

Et nimetaja võrdumine nulliga sümmeetrilises süsteemis tähendab lugeja võrdumist nulliga, saame

$$d(x + y + z) = 0,$$

millest

$$x + y + z = C_2.$$

Süsteemi üldlahend on kujul

$$y^2 + x(\ln x - 1) = C_1, x + y + z = C_2.$$

Saadud esimesed integraalid on lineaarselt sõltumatud, kuna ühes avaldistest puudub muutuja z , seetõttu ei ole võimalik ühte teise kaudu avaldada.

Näide 5.56.

Kasutades integreeruvate kombinatsioonide meetodit, lahendage järgmine sümmeetriline diferentsiaalvõrrandite süsteem

$$\frac{dx}{(z - y)^2} = \frac{dy}{z} = \frac{dz}{y}.$$

Teine võrdus annab

$$ydy = zdz,$$

mille integreerimisel saame

$$\frac{y^2}{2} = \frac{z^2}{2} + C_1,$$

siit

$$y^2 - z^2 = C_1.$$

Teise integreeruva kombinatsiooni saamiseks lahutame teise ja kolmanda murru lugejad ja nimetajad liikmeti ja võrdsustame esimese murruga.

$$\frac{dx}{(z - y)^2} = \frac{dy}{z} = \frac{dz}{y} = \frac{d(y - z)}{z - y},$$

$$\frac{dx}{(z - y)^2} = \frac{-d(z - y)}{z - y},$$

Teeme muutuja vahetuse $u = z - y$, siis

$$\frac{dx}{u^2} = -\frac{du}{u},$$

kust saame

$$dx = -udu$$

ja integreerides võrrandit, on tulemuseks

$$x = -\frac{u^2}{2} + C_2.$$

Korrutades võrrandit kahega ja asendades tagasi muutuja vahetuse avaldise, saame

$$2x - (z - y)^2 = C_2.$$

Saime süsteemi üldlahendi kujul

$$y^2 - z^2 = C_1, 2x - (z - y)^2 = C_2.$$

Näide 5.57.

Kasutades integreeruvate kombinatsioonide meetodit, lahendage järgmine sümmeetriline diferentsiaalvõrrandite süsteem

$$\frac{dx}{4z - 5y} = \frac{dy}{5x - 3z} = \frac{dz}{3y - 4x} \quad (4z \neq 5y).$$

Korrutame esimest murdu (lugejat ja nimetajat) arvuga 3, teist arvuga 4 ja kolmandat arvuga 5 ja liites kõik lugejad ja nimetajad kokku, saame

$$\begin{aligned} \frac{3dx}{12z - 15y} &= \frac{4dy}{20x - 12z} = \frac{5dz}{15y - 20x} = \frac{d(3x + 4y + 5z)}{12z - 15y + 20x - 12z + 15y - 20x} = \\ &= \frac{d(3x + 4y + 5z)}{0}. \end{aligned}$$

Et nimetaja võrdumine nulliga sümmeetrilises süsteemis tähendab lugeja võrdumist nulliga, saame

$$d(3x + 4y + 5z) = 0,$$

millest

$$3x + 4y + 5z = C_1.$$

Korrutame esimest murdu (lugejat ja nimetajat) suurusega $2x$, teist murdu suurusega $2y$ ja kolmandat suurusega $2z$ ja liites kõik lugejad ja nimetajad kokku, saame

$$\begin{aligned} \frac{2xdx}{8xz - 10xy} &= \frac{2ydy}{10xy - 6yz} = \frac{2zdz}{6yz - 8zx} = \frac{d(x^2 + y^2 + z^2)}{8xz - 10xy + 10xy - 6yz + 6yz - 8zx} = \\ &= \frac{d(x^2 + y^2 + z^2)}{0}. \end{aligned}$$

Et nimetaja võrdumine nulliga sümmeetrilises süsteemis tähendab lugeja võrdumist nulliga, saame

$$d(x^2 + y^2 + z^2) = 0,$$

millest

$$x^2 + y^2 + z^2 = C_2.$$

Leitud esimesed integraalid on sõltumatud, kuna eeldame, et $4z \neq 5y$. Saime süsteemi üldlahendi kujul

$$3x + 4y + 5z = C_1, x^2 + y^2 + z^2 = C_2.$$

VI PTK OSATULETISTEGA DIFERENTSIAALVÕRRANDID

6.1. OSATULETISTEGA DIFERENTSIAALVÕRRANDI MÕISTE

Definitsioon 6.1.

Võrrandit, mis seob otsitavat mitme muutuja funktsiooni tema osatuletistega ja sõltumatute muutujatega, nimetatakse **osatuletistega diferentsiaalvõrrandiks**.

Üldkuju kahe sõltumatu muutuja korral.

Kahe sõltumatu muutuja x ja y korral on esimest järku **osatuletistega diferentsiaalvõrrandi üldkujuks**

$$F\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) = 0,$$

kus $u = u(x, y)$ on otsitav funktsioon.

Funktsioon F esitab seose sõltumatute muutujate x ja y ning funktsioonide

$$u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$$

vahel. Tähistades

$$\frac{\partial u}{\partial x} = p, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = q, \quad F(x, y, u, p, q) = 0.$$

Olgu funktsioon $F(x, y, u, p, q)$ määratud muutujate x, y, u, p, q piirkonnas G .

Definitsioon 6.2.

Esimest järku osatuletistega diferentsiaalvõrrandi **lahendiks** muutujate x, y piirkonnas D nimetatakse sellist funktsiooni $u = u(x, y)$, kui ta on piirkonnas D määratud ja pidevalt diferentseeruv ning

$$\left(x, y, u(x, y), \frac{\partial u(x, y)}{\partial x}, \frac{\partial u(x, y)}{\partial y}\right) \in G$$

ja

$$F\left(x, y, u(x, y), \frac{\partial u(x, y)}{\partial x}, \frac{\partial u(x, y)}{\partial y}\right) = 0$$

iga $(x, y) \in D$ korral, ehk mis sellesse võrrandisse asetatuna muudab võrrandi **samasuseks**.

Oluline erinevus harilike ja osatuletistega diferentsiaalvõrrandite vahel seisneb selles, et harilike diferentsiaalvõrrandite üldlahendites sisalduvad suvalised konstandid, osatuletistega diferentsiaalvõrrandites aga suvalised funktsioonid. Seega võrrandi **lahend** $u = u(x, y)$ võib sõltuda ühest **suvalisest funktsioonist**.

Näide 6.1. Võrrandi

$$\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

üheks lahendiks on funktsioon $u = x + y$, kuna tema osatuletised on

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 1 - 1 = 0,$$

ehk saame samasuse $0 \equiv 0$.

Näide 6.2. Lahendada osatuletistega diferentsiaalvõrrand

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0.$$

Integreerime võrrandit argumendi x järgi, nagu harilikku diferentsiaalvõrrandit, saame $u = C$. Kuna u on kahe muutuja funktsioon, siis C ei sõltu argumendist x , aga võib sõltuda argumendist y , võrrand on ikka rahuldatud. Võrrandi üldlahendiks on suvaline funktsioon argumendist y :

$$u = C(y).$$

Näide 6.3. Lahendada osatuletistega diferentsiaalvõrrand

$$x \frac{\partial u}{\partial y} + u = 0.$$

Vaatleme muutujat x parameetrina ja lahendame vastava hariliku diferentsiaalvõrrandi

$$\frac{1}{u} \frac{du}{dy} = -\frac{1}{x},$$

$$\frac{du}{u} = -\frac{dy}{x},$$

$$\ln|u| = -\frac{y}{x} + \ln|C(x)|,$$

$$u = C(x)e^{-\frac{y}{x}}.$$

Selle võrrandi lahendis olev integreerimiskonstant võib sõltuda argumendist x . Kontrollime lahendit, asendades selle esialgsesse võrrandisse:

$$x \frac{\partial (C(x)e^{-\frac{y}{x}})}{\partial y} + C(x)e^{-\frac{y}{x}} = 0,$$

$$x \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) \cdot C(x)e^{-\frac{y}{x}} + C(x)e^{-\frac{y}{x}} = 0.$$

Geomeetriliselt vastab võrrandi lahendile $u = u(x, y)$ **pind ruumis**, seda pinda nimetatakse **integraalpinnaks**. Kuna üldlahendis on suvalised funktsioonid, sisaldab võrrandi lahend lõpmata palju integraalpindu.

Definitsioon 6.3.

Osatuletistega diferentsiaalvõrrandi järguks nimetatakse võrrandis leiduvat kõrgeimat osatuletise järku.

Teist järku osatuletistega diferentsiaalvõrrand on kujul

$$F\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right) = 0.$$

Teist järku osatuletistega diferentsiaalvõrrandi üldlahend sisaldab kaht suvalist funktsiooni. Loodusteadustes kasutatavad teist järku osatuletistega diferentsiaalvõrrandid:

a) **Lainevõrrand**, mis kirjeldab laine levikut, näiteks pillikeele võnkumist, on kujul

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2},$$

kus α on konstant. Pillikeele jaoks on $\alpha^2 = T/\rho$, kus T tähistab keele otstes mõjuvat tõmbejõudu ja ρ lineaarset tihedust ehk massi pikkusühiku kohta.

b) **Difusioonivõrrand**, mis on kujul

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

kus otsitav funktsioon $u = u(x, t)$ võib tähistada näiteks gaasi kontsentratsiooni või osarõhku, mis muutub ajas. Konstant D tähistab difusioonikordajat.

Näide 6.4. Lahendada teist järku osatuletistega diferentsiaalvõrrand

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0.$$

Kirjutame antud võrrandi kujul

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0.$$

Kõigepealt integreerime argumendi x järgi (nagu harilikku diferentsiaalvõrrandit), seejärel integreerime argumendi y järgi

$$\frac{\partial u}{\partial y} = C(y), \quad u = \int C(y) dy + C_2(x).$$

Kuna integreerisime muutuja y järgi, võib integreerimiskonstant sõltuda suvalisest argumendi x funktsioonist. Tähistades

$$\int C(y) dy \doteq C_1(y),$$

saame üldlahendi, mis sisaldab kaht suvalist funktsiooni

$$u = C_1(y) + C_2(x).$$

Seega teist järku osatuletistega diferentsiaalvõrrandi üldlahend sõltub kahest suvalisest funktsioonist. Kui järk on kõrgem, siis samuti suvaliste funktsioonide arv, millest üldlahend sõltub, on võrdne võrrandi järguga.

6.2. CAUCHY ÜLESANNE

Cauchy ülesanne osatuletistega diferentsiaalvõrrandi jaoks on järgmine: **leida integraalpind, mis läbib etteantud kõverat**. Selle kõvera võrrandid võivad olla antud **ristkoordinaatides**

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

või **parameetrilisel kujul**: leida integraalpind, mis läbib etteantud kõverat

$$x = \varphi(t), y = \psi(t), u = \chi(t),$$

kus parameeter t muutub mingis vahemikus (t_1, t_2) . Tuleb leida selline võrrandi lahend, mille korral

$$\Phi(\varphi(t), \psi(t), \chi(t)) \equiv 0.$$

Kui etteantud kõver asub mingil tasandil $x = x_0$ või $y = y_0$, kus x_0 ja y_0 on mingid etteantud arvud

$$x = x_0, u = \chi(y)$$

või

$$y = y_0, u = \psi(x),$$

siis algtingimuse saab kirjutada vastavalt

$$u(x_0, y) = \chi(y),$$

või

$$u(x, y_0) = \psi(x).$$

Näide 6.5. Lahendada Cauchy ülesanne

$$x \frac{\partial u}{\partial y} + u = 0, \quad u(x, 1) = x^2.$$

Üldlahendi leidsime näites 6.3, algtingimusest asendame üldlahendisse vastavad suurused, saame

$$u = C(x)e^{-\frac{y}{x}},$$

$$x^2 = C(x)e^{-\frac{1}{x}},$$

$$C(x) = x^2 e^{\frac{1}{x}},$$

$$u = x^2 e^{\frac{1}{x}} e^{-\frac{y}{x}} = x^2 e^{\frac{1-y}{x}}.$$

Näide 6.6. Lahendada Cauchy ülesanne

$$\frac{\partial u}{\partial x} = xy, \quad u|_{x^2+y^2=1} = 1.$$

Loeme parameetriks argumendi y ja lahendame vastava hariliku diferentsiaalvõrrandi

$$\frac{du}{dx} = xy, \quad u = y \cdot \frac{x^2}{2} + C(y),$$

Üldlahendis $C(y)$ on muutuja y funktsioon. Leiame $C(y)$ nii, et oleks rahuldatud antud tingimus

$$1 = y \cdot \frac{1-y^2}{2} + C(y),$$

$$C(y) = 1 - \frac{y(1-y^2)}{2},$$

seega otsitav lahend Cauchy ülesandele on

$$u = y \cdot \frac{x^2}{2} + 1 - \frac{y(1-y^2)}{2}.$$

Näide 6.7. Lahendada Cauchy ülesanne

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y, \quad u(1, y) = y^2.$$

Integreerime argumendi x järgi, üldlahend on

$$u(x, y) = xy + C(y),$$

$$u(1, y) = 1y + C(y),$$

$$y + C(y) = y^2.$$

Avaldame $C(y)$:

$$C(y) = y^2 - y.$$

Erilahend on

$$u(x, y) = xy + y^2 - y.$$

Näide 6.8. Lahendada Cauchy ülesanne

$$\frac{\partial u}{\partial x} = u, \quad u\left(\frac{1}{y}, y\right) = y.$$

Jagame suurusega u ja integreerime x järgi

$$\frac{\partial u}{u} = \partial x, \quad \ln|u| = x + \ln C(y), \quad u(x, y) = C(y)e^x.$$

Erilahend

$$C(y)e^{\frac{1}{y}} = y; \quad C(y) = ye^{\frac{1}{y}}.$$

Üldlahend on:

$$u(x, y) = ye^{\frac{1}{y}}e^x = ye^{x + \frac{1}{y}}.$$

Cauchy ülesanne ei ole alati lahenduv: võib juhtuda, et läbi etteantud kõvera ei lähe ükski integraalpindadest. Samas võib läbi lähtekõvera minna rohkem kui üks integraalpindadest.

Teist järku osatuletistega diferentsiaalvõrrandi **erilahendi** leidmiseks peab olema teada ka otsitava funktsiooni u esimest järku **osatuletiste väärtus** lähtekõvera punktides, sest vaja on teada kahe suvalise funktsiooni väärtust $C_1(x), C_2(y)$.

Näide 6.9. Lahendada Cauchy ülesanne

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad u(1, y) = y^2, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = y.$$

Integreerime argumendi x järgi kaks korda

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = C_1(y),$$

$$u = \int C_1(y) dx + C_2(y) = xC_1(y) + C_2(y).$$

Erilahendi saamiseks teisest tingimusest, asendades eelnevasse võrrandisse

$$\frac{\partial u}{\partial x} = C_1(y),$$

$$C_1(y) = y$$

ja esimesest tingimusest saame asendades üldlahendisse

$$x = 1, u = y^2: 1 \cdot C_1(y) + C_2(y) = y^2,$$

$$y + C_2(y) = y^2,$$

$$C_2(y) = y^2 - y.$$

Erilahend on kujul

$$u(x, y) = xy + y^2 - y.$$

6.3. LINEAARSED OSATULETISTEGA DIFERENTSIAALVÕRRANDID

Lineaarne osatuletistega diferentsiaalvõrrand on võrrand kujul

$$p(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + q(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} = r(x, y). \quad (6.39)$$

Kvaasilineaarne osatuletistega diferentsiaalvõrrand on võrrand kujul

$$p(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} + q(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = r(x, y, u).$$

Lineaarse homogeense esimest järku osatuletistega diferentsiaalvõrrandi üldkuju on

$$p(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + q(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} = 0. \quad (6.40)$$

Lineaarse homogeense osatuletistega diferentsiaalvõrrandi **lahendamiseks** tuleb lahendada temaga sümmeetriline harilik diferentsiaalvõrrand

$$\frac{dx}{p(x, y)} = \frac{dy}{q(x, y)}. \quad (6.41)$$

Osutub, et osatuletistega diferentsiaalvõrrandi (6.40) ja võrrandi (6.41) lahendamise ülesanded on ekvivalentsed. Sellise sümmeetrilise diferentsiaalvõrrandi lahendi

$$\psi(x, y) = C$$

korral osatuletistega diferentsiaalvõrrandi **üldlahendiks** on

$$u = \psi(x, y).$$

Kui otsitav funktsioon on **kolme** muutuja funktsioon

$$p(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial x} + q(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial y} + r(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial z} = 0, \quad (6.42)$$

tuleb lineaarse homogeense osatuletistega diferentsiaalvõrrandi lahendamiseks lahendada harilike diferentsiaalvõrrandite süsteem

$$\frac{dx}{p(x, y, z)} = \frac{dy}{q(x, y, z)} = \frac{dz}{r(x, y, z)}. \quad (6.43)$$

Kehtivad järgmised laused.

Lause 6.1.

Kui valem

$$\psi(x, y, z) = C$$

esitab diferentsiaalvõrrandite süsteemi (6.43) lahendit (integraali), siis funktsioon

$$u = \psi(x, y, z)$$

on diferentsiaalvõrrandi (6.42) üheks erilahendiks.

Tõestus. Olgu

$$\psi(x, y, z) = C$$

süsteemi (6.43) lahend. Diferentseerime lahendit:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy + \frac{\partial \psi}{\partial z} dz = 0. \quad (6.44)$$

Süsteemis (6.43) tähistame suhte

$$\frac{dx}{p(x, y, z)} = \frac{dy}{q(x, y, z)} = \frac{dz}{r(x, y, z)} = \lambda,$$

siis

$$dx = \lambda p, dy = \lambda q, dz = \lambda r.$$

Asetame need võrrandisse (6.44), seejärel jagame läbi liikmega λ , saame

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} p + \frac{\partial \psi}{\partial y} q + \frac{\partial \psi}{\partial z} r = 0.$$

Tulemuseks saime võrrandi (6.42), kus otsitava u asemel on funktsioon ψ . See aga tähendab, et funktsioon ψ rahuldab võrrandit (6.42), mistõttu on võrrandi üheks erilahendiks. ■

Kehtib ka vastupidine väide: Kui

$$\psi = \psi(x, y, z)$$

on võrrandi (6.42) erilahend, siis

$$\psi(x, y, z) = C$$

on süsteemi (6.43) lahend.

Lause 6.2.

Kui

$$\psi_1(x, y, z) = C_1 \text{ ja } \psi_2(x, y, z) = C_2$$

on kaks lahendit (integraali) vastavale harilike diferentsiaalvõrrandite süsteemile (6.43), siis

$$u = \varphi(\psi_1, \psi_2)$$

ehk suvaline funktsioon funktsioonidest ψ_1 ja ψ_2 rahuldab vastavat osatuletistega diferentsiaalvõrrandit (6.42).

Tõestus. Arvutame osatuletised funktsioonist

$$u = \varphi(\psi_1, \psi_2)$$
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial \varphi}{\partial \psi_1} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial \psi_2} \frac{\partial \psi_2}{\partial x},$$
$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial \varphi}{\partial \psi_1} \frac{\partial \psi_1}{\partial y} + \frac{\partial \varphi}{\partial \psi_2} \frac{\partial \psi_2}{\partial y},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial \varphi}{\partial \psi_1} \frac{\partial \psi_1}{\partial z} + \frac{\partial \varphi}{\partial \psi_2} \frac{\partial \psi_2}{\partial z},$$

seejärel asetame saadud osatuletised võrrandisse (6.42). Saame

$$\begin{aligned} & \left(p(x, y, z) \frac{\partial \psi_1}{\partial x} + q(x, y, z) \frac{\partial \psi_1}{\partial y} + r(x, y, z) \frac{\partial \psi_1}{\partial z} \right) \frac{\partial \varphi}{\partial \psi_1} + \\ & + \left(p(x, y, z) \frac{\partial \psi_2}{\partial x} + q(x, y, z) \frac{\partial \psi_2}{\partial y} + r(x, y, z) \frac{\partial \psi_2}{\partial z} \right) \frac{\partial \varphi}{\partial \psi_2} \equiv 0. \end{aligned}$$

Tulemus on samaselt null, sest lause 6.1 põhjal on mõlemad sulgudes olevad avaldised on samaselt nullid. Seega on **võrrandi (6.42) lahendiks funktsioon**

$$u = \varphi(\psi_1, \psi_2). \quad \blacksquare$$

Seega saadud lahend $u = \varphi(\psi_1, \psi_2)$ on võrrandi (6.42) **üldlahend**, kui funktsioonid

$$\psi_1(x, y, z) = C_1 \text{ ja } \psi_2(x, y, z) = C_2$$

on lineaarselt sõltumatud.

Näide 6.10. Lahendada diferentsiaalvõrrand

$$y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

Vastav harilik diferentsiaalvõrrand on

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x}.$$

Lahendamiseks korrutame võrrandit suurusega xy , saame

$$\begin{aligned} xdx &= -ydy, \\ \frac{x^2}{2} &= -\frac{y^2}{2} + \frac{C}{2}, \\ x^2 + y^2 &= C. \end{aligned}$$

Osatuletistega diferentsiaalvõrrandi üldlahend on suvaline funktsioon leitud lahendi vasakust poolest

$$u = \psi(x^2 + y^2).$$

Näide 6.11. Lahendada diferentsiaalvõrrand

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = 0.$$

Vastav diferentsiaalvõrrandisüsteem on

$$\begin{aligned} \frac{dx}{x} &= \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}, \\ \frac{dx}{x} &= \frac{dy}{y}, \end{aligned}$$

$$\ln |x| = \ln |y| + \ln C_1,$$

$$x = C_1 y,$$

$$\frac{x}{y} = C_1.$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{dz}{z},$$

$$\ln|x| = \ln|z| + \ln C_2,$$

$$x = C_2 z,$$

$$\frac{x}{z} = C_2.$$

Seega

$$\psi_1 = \frac{x}{y}, \psi_2 = \frac{x}{z},$$

üldlahend on

$$u = \varphi\left(\frac{x}{y}, \frac{x}{z}\right).$$

Kui tundmatuks on n muutuja funktsioon $u(x_1, x_2, \dots, x_n)$, siis esimest järku lineaarse osatuletistega diferentsiaalvõrrandi lahendamine toimub analoogiliselt. Võrrand on kujul

$$p_1(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial x_1} + p_2(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial x_2} + \dots + p_n(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial x_n} = 0 \quad (6.45)$$

ja temale vastav harilike diferentsiaalvõrrandite süsteem on kujul

$$\frac{dx_1}{p_1(x, y, z)} = \frac{dx_2}{p_2(x, y, z)} = \dots = \frac{dx_n}{p_n(x, y, z)}.$$

Süsteem sisaldab $n - 1$ sõltumatut võrrandit, järelkult saame leida süsteemile $n - 1$ sõltumatut üldlahendit

$$\psi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = C_1,$$

$$\psi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = C_2,$$

... ..

$$\psi_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_n) = C_{n-1}.$$

Võrrandi (6.45) üldlahend on suvaline funktsioon, mis sõltub leitud lahenditest:

$$u = \varphi(\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n).$$

Kvaasilineaarse mittehomogeense võrrandi kujul

$$p(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} + q(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = r(x, y, u)$$

lahendamise saab viia lineaarse homogeense võrrandi lahendamisele. Kuna võrrandi kordajad p, q ja r võivad sõltuda ka otsitavast funktsioonist u , on võrrand kvaasilineaarne. Võrrandi lahendit otsime ilmutamata kujul

$$V(x, y, u) = 0,$$

otsitavaks on funktsioon kujul V . Leiame funktsioonist V osatuletised argumentide x ja y järgi (ilmutamata funktsiooni tuletise valemi põhjal)

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial V}{\partial x}}{\frac{\partial V}{\partial u}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial V}{\partial y}}{\frac{\partial V}{\partial u}},$$

ning asetame võrrandisse (??):

$$p(x, y, u) \left(-\frac{\frac{\partial V}{\partial x}}{\frac{\partial V}{\partial u}} \right) + q(x, y, u) \left(-\frac{\frac{\partial V}{\partial y}}{\frac{\partial V}{\partial u}} \right) - r(x, y, u) = 0.$$

Korrutame suurusega $-\partial V/\partial u$, saame

$$p(x, y, u) \frac{\partial V}{\partial x} + q(x, y, u) \frac{\partial V}{\partial y} + r(x, y, u) \frac{\partial V}{\partial u} = 0.$$

Tulemuseks on lineaarne homogeenne osatuletistega diferentsiaalvõrrand funktsiooni V suhtes. Moodustame võrrandile [vastava harilike diferentsiaalvõrrandite süsteemi](#):

$$\frac{dx}{p(x, y, u)} = \frac{dy}{q(x, y, u)} = \frac{du}{r(x, y, u)}.$$

Sellele süsteemile saame leida kaks sõltumatut üldlahendit

$$\psi_1(x, y, u) = C_1,$$

$$\psi_2(x, y, u) = C_2.$$

Võrrandi üldlahend on

$$V = \varphi(\psi_1, \psi_2),$$

kus φ on suvaline funktsioon. Seega esialgse võrrandi (6.39) lahendiks on funktsioon

$$\varphi(\psi_1, \psi_2) = 0.$$

Samal meetodil saab lahendada kvaasilineaarset homogeenset võrrandit, sellisel juhul tekib süsteemi viimases võrrandis nulliga jagamine. Saame süsteemi kahe võrrandiga, millest teine võrrand on $du = 0$, mille lahend on $u = C_1$ (näide 6.13).

Näide 6.1. Lahenda diferentsiaalvõrrand

$$xu \frac{\partial u}{\partial x} + yu \frac{\partial u}{\partial y} = xy.$$

Vastav diferentsiaalvõrrandisüsteem on

$$\frac{dx}{xu} = \frac{dy}{yu} = \frac{du}{xy}.$$

Saime harilike diferentsiaalvõrrandite süsteemi kahe võrrandiga, millest lahendame kõigepealt esimese:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{xu} &= \frac{dy}{yu}, \\ \frac{dx}{x} &= \frac{dy}{y}, \\ y &= C_1 x,\end{aligned}$$

kust

$$x = \frac{y}{C_1}.$$

Teise võrrandi lahendamisel saame

$$\begin{aligned}\frac{dy}{yu} &= \frac{du}{xy}, \\ \frac{dy}{y} &= \frac{u du}{xy}, \\ dy &= \frac{u du}{x}.\end{aligned}$$

Asendame argumendi x esimeses süsteemis saadud avaldisega

$$\begin{aligned}dy &= \frac{C_1 u du}{y}, \\ y dy &= C_1 u du, \\ \frac{y^2}{2} &= C_1 \frac{u^2}{2} + \frac{C_2}{2}, \\ y^2 &= C_1 u^2 + C_2.\end{aligned}$$

Lõpuks on vaja leitud lahendid viia kujule

$$\psi_1(x, y, z) = C_1 \quad \text{ja} \quad \psi_2(x, y, z) = C_2,$$

et suvalised konstandid oleksid mõlemal juhul paremal pool võrdusmärki:

$$\frac{y}{x} = C_1,$$

$$y \left(y - \frac{u^2}{x} \right) = C_2.$$

Üldlahendiks on

$$\varphi \left(\frac{y}{x}, y \left(y - \frac{u^2}{x} \right) \right) = 0.$$

Sellest lahendist on võimalik avaldada otsitav funktsioon u , kui teises argumentis oleva funktsiooni kirjutame kujul

$$y \left(y - \frac{u^2}{x} \right) = f \left(\frac{y}{x} \right)$$

ning avaldame suuruse u^2

$$u^2 = xy + f_1 \left(\frac{y}{x} \right),$$

kus

$$f_1 \left(\frac{y}{x} \right) = \left(\frac{y}{x} \right)^{-1} f \left(\frac{y}{x} \right).$$

Näide 6.2. Leida diferentsiaalvõrrandi

$$u \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

lahend, mis läbib sirget

$$x = y = u.$$

Siin on tegemist kvaasilineaarse võrrandiga, mis on homogeenne. Selle võrrandi lahendamiseks saame kasutada antud meetodit. Vastav diferentsiaalvõrrandisüsteem on kujul

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{-1} = \frac{du}{0},$$

millest saame süsteemi kahe võrrandiga. Kui nimetaajas on null, siis võrdsustame lugeja nulliga.

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{-1}, \quad du = 0.$$

Teisest võrrandist saame leida otsitava funktsiooni u avaldise:

$$u = C_1,$$

asendame esimesse võrrandisse ja lahendame, saame

$$C_1 y = -x + C_2,$$

asendades esimesena saadud C_1 avaldise, saame võrrandi paremale poole konstandi

$$uy + x = C_2.$$

Võrrandi üldlahendiks on

$$\varphi(u, uy + x) = 0.$$

Erilahendi leidmiseks asendame üldlahendisse $y = u$ ja $z = u$, saame

$$\begin{aligned} C_1 &= u, \\ C_2 &= u^2 + u. \end{aligned}$$

Seega

$$C_2 = C_1(1 + C_1).$$

Sellest saame avaldada erilahendi

$$uy + x = u(1 + u).$$

6.4. DIFERENTSIAALVÕRRANDITE SÜSTEEM KAHEST OSATULETISTEGA VÕRRANDIST

Diferentsiaalvõrrandite süsteemi üldkuju:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = f(x, y, u), \\ \frac{\partial u}{\partial y} = g(x, y, u). \end{cases}$$

Otsitav funktsioon $u = u(x, y)$, funktsioonid f ja g olgu pidevalt diferentseeruvad mingis muutujate x, y, u piirkonnas D .

Teoreem 6.1. *Süsteem on täielikult integreeruv parajasti siis, kui piirkonnas D kehtib samasus*

$$\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial u}g \equiv \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial u}f.$$

Sellisel juhul on süsteemil üks lahend, mis läbib etteantud punkti.

Järeldus 6.2. Kui on täidetud samasuse tingimus, siis on süsteemil olemas *ühest* *parameetrist sõltuv lahendite* $u \equiv u(x, y, b)$, kus b on parameeter.

Näide 6.3. Lahendada süsteem

$$\frac{\partial u}{\partial x} = ax + y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x + \frac{y}{a}.$$

Integreerumise tingimus on täidetud:

$$\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial u}g \equiv 1 \equiv \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial u}f,$$

$$\frac{du}{dx} = ax + y,$$

$$u = \frac{ax^2}{2} + yx + C(y),$$

$$\frac{du}{dy} : x + C'(y) = x + \frac{y}{a},$$

$$C'(y) = \frac{y}{a},$$

$$C(y) = \frac{y^2}{2a} + b.$$

$$u = \frac{ax^2}{2} + yx + \frac{y^2}{2a} + b = \frac{1}{2a}(y + ax)^2 + b.$$

VI Kirjandus

- [1] Mati Kilp. Algebra I, Eesti Matemaatika Selts, Tartu, 2005.
- [2] Lembit Roots, Elmar Sakkov, Kõrgem matemaatika: õppevahend majandusteaduskonna üliõpilastele, Tartu Riiklik Ülikool, teoreetilise mehaanika kateeder, Tartu, 1982.
- [3] Elmar Reimers. Matemaatilise analüüsi praktikum II. Tallinn, 1988. <https://drive.google.com/file/d/0BwtuAJRdWlyMS2s0ZzctTGdsSOU/view>
- [4] L. Loone, V. Soomer. Matemaatilise analüüsi algkursus. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009.
- [5] N. S. Piskunov. Diferentsiaal- ja integraalarvutus II. Tallinn, 1983.
- [6] Erich Steiner. The Chemistry Maths Book, Oxford University Press, 2008.
- [7] Thomas' Calculus. 12th edition.
- [8] Arvet Pedas, Gennadi Vainikko. Harilikud diferentsiaalvõrrandid: teooria, näiteid, ülesandeid. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011.
- [9] Lembit Roots. Valitud küsimusi kõrgemast matemaatikast. 1, [Osatuletistega diferentsiaalvõrrandid]: õppevahend Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonna üliõpilastele, Tartu Riiklik Ülikool, teoreetilise mehaanika kateeder, 1981.

Veebimaterjalid:

- [10] Aivo Parringu konspekt "Algebra ja geomeetria", <http://math.ut.ee/pmi/kursused/ag/parring/>
- [11] Peep Miidla. Diferentsiaalvõrrandite õppematerjalid: <http://math.ut.ee/~peepm/dv/>
- [12] Math Insight <http://mathinsight.org>

[13] Khan Academy Calculus <https://www.khanacademy.org/math/calculus-home?t=classes>