

# **TOPOLOOGILISED VEKTORRUUMID**

MTMM.00.074 Loengukursus  
Tartu Ülikooli  
matemaatika-informaatikateaduskonna  
üliõpilastele

Toivo Leiger



## Sissejuhatus

Kaasaegne matemaatika baseerub **hulga** mõistel. Hulk on mingite objektide kogum, milles iga objekt (element) on teistest erinev. Kui antud hulga elementide või alamhulkade vahel on määratud mingid seosed, siis öeldakse, et hulgas on määratud vastav *struktuur*. Struktuuriga hulki nimetatakse ka *ruumideks*.

Kõige üldisem hulki käsitlev õpetus on hulgateooria, mis üldjuhul ei eelda hulgas mingisuguse struktuuri olemasolu. Sisukamate ja rakenduste suhtes värtuslikumate teoriate saamiseks vaadeldakse hulki, milles on defineeritud üks või enam struktuure.

N. Bourbaki järgi eraldatakse matemaatiliste struktuuride hulgast välja kolm struktuuride liiki, mida nimetatakse **matemaatika põhistruktuurideks**:

- 1) *algebraised struktuurid*, mida määrvavad seosed on antud algebraliste operatsioonide (tehete) abil ja seovad omavahel lõpliku arvu elemente,
- 2) *topoloogilised struktuurid*, milles (Bourbaki sõnul) "...leiavad matemaatilise formuleeringu intuitiivsed mõisted ümbris, piirväärtus ja pidevus, mille juurde viib meid meie ettekujutus ruumist",
- 3) *järjestusstruktuurid*, mis määratatakse sel viisil, et hulga mõningate elementide järjestatud paaride  $(x, y)$  korral on fikseeritud komponentide järgnevus (tavaliselt väljendame seda sõnadega "x on väiksem kui y").

Käesoleva kursuse pealkiri – **topoloogilised vektorruumid** – viitab selgelt sellele, milliste struktuuridega me allpool tegemist teeme. Need on vektorruumid, mis samal ajal on ka topoloogilised ruumid, lisaks sellele eeldatakse nende kahe struktuuri teatavat loomulikku kooskõla. See kooskõla saavutatakse nõudega vektorruumi tehete pidevusest. Niisuguste struktuuride käsitlemist (ja seega käesoleva aine õppimist) hõlbustab kogemus, mis on saadud funktsionaalanalüüsist põhikursustest. Asjaolu, et normeeritud ruum on topoloogilise vektorruumi üks erijuhte, on oluliselt määranud topoloogiliste vektorruumide teoria arenemist. Normeeritud ruumide teoriast on genereeritud mitte ainult mitmed probleemiasetused, vaid ka siinvaadeldava teoria sisemine loogika.

Kuigi **järjestusstruktuure** me käesolevas kursuses spetsiaalselt ei käsitele, vajame me sellise struktuuriga hulki konkreetsete probleemide uurimisel. Topoloogilise koonduvuse kirjeldamisel kasutame me käesolevas kursuses suunatud peresid. Suunatud pere on selline "jada", mille indeksid moodustavad mingi suunatud hulga (suunatud pere korrektne definitsioon on antud artiklis 1.2). Seejuures nimetatakse hulka  $X$  *suunatud hulgaks*, kui tema elementide mõningate järjestatud paaride  $(x, y)$  korral on defineeritud (järjestus)suhe  $x \leq y$ , mis rahuldab tingimusi

- (a)  $x \leq x$  iga  $x \in X$  korral,
- (b) kui  $x \leq y$  ja  $y \leq z$ , siis  $x \leq z$  ( $x, y, z \in X$ ),
- (c) kui  $x, y \in X$ , siis leidub  $z \in X$  omadusega  $x \leq z, y \leq z$ .

Kui lisaks tingimustele (a) ja (b) rahuldab vaadeldav seos veel tingimust

- (d) kui  $x \leq y$  ja  $y \leq x$ , siis  $x = y$  ( $x, y \in X$ ),

siis nimetatakse hulka  $X$  *järjestatud hulgaks*. Järjestatud hulkade üldisest teoriast rakendame me allpool Zorni lemmat, mille formulierimiseks vajame veel selle teoria mõningaid põhimõisteid. Järjestatud hulka nimetatakse *täielikult järjestatuks* (ehk *lineaarselt järjestatuks*), kui iga paari  $x, y \in X$  puhal kehtib kas  $x \leq y$  või  $y \leq x$ . Alamhulka  $E$  järjestatud hulgas  $X$  nimetatakse *ülast tõkestatuks*, kui leidub selline element  $z \in X$ , et  $x \leq z$  iga  $x \in E$  korral.

Element  $x_0 \in E$  omadusega

$$[x \in E, x \geq x_0] \Rightarrow x = x_0,$$

nimetatakse alamhulga  $E$  maksimaalseks elemendiks.

**Zorni lemma.** *Kui järjestatud hulga  $X$  iga täielikult järjestatud alamhulk on ülalt tõkestatud, siis hulgas  $X$  leidub (vähemalt üks) maksimaalne element.*

Topoloogiliste struktuuride põhimõistetest ja meile vajalikest põhitulemustest anname ülevaate esimeses peatükis. Lühidalt meenutame siinkohal **vektorruumide teoria** mõisteid ja lepime kokku põhiliste tähistuste osas.

**Vektorruum.** Teatavasti nimetatakse hulka  $X$  *vektorruumiks* (ka *lineaarseks ruumiks*) üle korpuse  $\mathbb{K}$  kui iga elementide paari  $x, y \in X$  korral on defineeritud nende summa  $x+y \in X$  ja suvaliste  $x \in X$  ning  $\lambda \in \mathbb{K}$  ( $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  (kõigi kompleksarvude korpus) või  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  (kõigi reaalarvude korpus)) korral on defineeritud korrutis  $\lambda x \in X$ , kusjuures neilt tehetelt nõutakse järgmisi omadusi:

$$x + (y + z) = (x + y) + z,$$

$$x + y = y + x,$$

eksisteerib *nullelement*  $0 \in X$ , et  $x + 0 = x$  iga  $x \in X$  korral,

iga  $x \in X$  korral leidub *vastandelement*  $-x \in X$  omadusega  $x + (-x) = 0$ ,

$$(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x),$$

$$(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x,$$

$$\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y,$$

$$1x = x.$$

Vastavalt sellele, kas  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  või  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , kõneleme kas *realsest* või *komplekssest vektorruumist*.

Vektorruumi  $X$  fikseeritud alamhulkade  $E$  ja  $F$  ning elementide  $x \in X$  ja  $\lambda \in \mathbb{K}$  puhul kasutame järgmisi tähistusi:

$$\begin{aligned} x + E &:= \{x + y \mid y \in E\}, \quad E + F := \{y + z \mid y \in E, z \in F\}, \\ \lambda E &:= \{\lambda y \mid y \in E\}. \end{aligned}$$

**Vektoralamruum ja hulga lineaarne kate.** Alamhulka  $X_0 \subset X$ , mis rahuldab tingimusi

$$X_0 + X_0 \subset X_0, \quad \lambda X_0 \subset X_0 \quad (\lambda \in \mathbb{K}),$$

nimetatakse *vektoralamruumiks*. Antud alamhulka  $E \subset X$  sisaldavat vähimat vektoralamruumi nimetame hulga  $E$  *lineaarseks katteks* ja tähistame *span*  $E$ . Seejuures on *span*  $E$  hulga  $E$  elementide kõikvõimalike lineaarsete kombinatsioonide hulk, s.t.

$$\text{span } E = \left\{ \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k \mid x_k \in E, \lambda_k \in \mathbb{K} \ (k = 1, \dots, n), n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Üheelemendilise hulga  $\{x\}$  puhul  $\text{span}\{x\} =: \langle x \rangle$ .

**Lineaarne sõltumatus, vektorruumi baas.** Öeldakse, et vektorruumi  $X$  alamhulk  $E \subset X$  on *lineaarselt sõltumatu*, kui tema iga lõpliku alamhulga  $\{x_1, \dots, x_n\}$  puhul seosest

$\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k = 0$  järeltub, et  $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ . Niisugust lineaarselt sõltumatut alamhulka  $E$ , mille korral  $\text{span } E = X$ , nimetatakse vektorruumi  $X$  baasiks.

**Lineaарne kujutus.** Kujutust (ehk operaatorit)  $A$  vektoruumist  $X$  vektoruumi  $Z$  (kirjutame  $A: X \rightarrow Z$ ) nimetatakse *lineaarseks*, kui

$$A(x_1 + x_2) = A(x_1) + A(x_2), \quad A(\lambda x) = \lambda A(x) \quad (\lambda \in \mathbb{K}).$$

Kui selline kujutus  $A$  on pööratav, siis ka pöördkujutus  $A^{-1}: Z \rightarrow X$  on lineaарne. Skalaарsete väärustega lineaарset kujutust nimetame *lineaarseks funktsionaaliks*.

**Bilineaарne funktsionaal.** Olgu  $X$  ja  $Y$  vektoruumid üle ühe ja sama korpuse  $\mathbb{K}$ . Funktsionaali  $B: X \times Y \rightarrow \mathbb{K}$ , mille korral funktsionaalid

$$B_x: Y \rightarrow \mathbb{K}, \quad y \mapsto B(x, y) \quad (x \in X)$$

ning

$$B_y: X \rightarrow \mathbb{K}, \quad x \mapsto B(x, y) \quad (y \in Y)$$

on lineaarsed, nimetatakse *bilineaarseks*.

Lõpuks märgime, et me lubame endale kasutatavate terminite osas teatvaid "keelelisi vabadusi", muidugi vaid siis, kui see ei häiri tekstist arusaamist. Näiteks kasutame me sõna "ruum" nii vektorruumi, topoloogilise ruumi, topoloogilise vektorruumi jm. ruumide puhul, kui lause kontekstist on selge, millist ruumi silmas peetakse. Sõna "süsteem" kasutame mõnikord hulga tähistamiseks. Näiteks kõneldakse enamasti nulliumbruste süsteemist, kuigi põhimõtteliselt on tegemist hulgaga.

Tekstis on lugejale jäetud hulgaliselt nn. *aktiviseerimiselemente*. Need on ülesanded, lihtsamate lausetega tõestused või mõned tehnilised detailid tõestustes, mille iseseisev kontrollmine aitab vaadeldavate mõistete ja tulemuste olemust paremini selgitada. Sellised kohad tekstis on märgitud sümboliga  $\clubsuit$ .

# Sisukord

<b>1 Topoloogilised ruumid</b>	<b>8</b>
1.1 Üldise topoloogia põhimõisted ja -tulemused . . . . .	8
1.2 Suunatud pered topoloogilises ruumis . . . . .	10
1.3 Kompaktsed topoloogilised ruumid . . . . .	14
<b>2 Topoloogilised vektorruumid</b>	<b>17</b>
2.1 Topoloogilise vektorruumi mõiste . . . . .	17
2.2 Vektorruumide topologiseerimise põhiteoreem . . . . .	19
<b>3 Tõkestatud ja kompaktsed alamhulgad topoloogilises vektorruumis</b>	<b>24</b>
3.1 Tõkestatud ja täielikult tõkestatud alamhulgad . . . . .	24
3.2 Kompaktsed alamhulgad topoloogilises vektorruumis . . . . .	26
<b>4 Metriseeruvad topoloogilised vektorruumid</b>	<b>29</b>
4.1 Metriseeruvad topoloogilised vektorruumid . . . . .	29
4.2 Lõplikumõõtmelised topoloogilised vektorruumid . . . . .	32
4.3 Näiteid . . . . .	34
<b>5 Kumerad hulgad ja poolnormid</b>	<b>38</b>
5.1 Kumerad alamhulgad vektorruumis . . . . .	38
5.2 Poolnormid ja Minkowski funktsionaalid . . . . .	42
<b>6 Hahn-Banachi teoreem</b>	<b>45</b>
6.1 Hahn-Banachi teoreem reaalse vektorruumi puhul . . . . .	45
6.2 Hahn-Banachi teoreem kompleksse vektorruumi puhul . . . . .	48
6.3 Eraldamisteoreemid . . . . .	49
<b>7 Lokaalselt kumerad ruumid</b>	<b>52</b>
7.1 Lokaalselt kumera topoloogia kirjeldamine nulliumbruste baasi ja poolnormide abil	52
7.2 Koonduvus ja tõkestatus lokaalselt kumeras ruumis . . . . .	55
7.3 Metriseeruvad ja normeeruvad lokaalselt kumerad ruumid . . . . .	57
7.4 Lokaalselt kumera ruumi kaasruum . . . . .	60
7.5 Veel kaks eraldamisteoreemi . . . . .	61
<b>8 Vektorruumide duaalsed paarid</b>	<b>64</b>
8.1 Duaalne paar . . . . .	64
8.2 Nõrk topoloogia . . . . .	66
8.3 Polaarid . . . . .	71
<b>9 Polaartopoloogiad</b>	<b>73</b>
9.1 $\mathfrak{S}$ -topoloogiad ja võrdpidevad hulgad . . . . .	73
9.2 Mackey topoloogia . . . . .	76
9.3 Mackey teoreem tõkestatud hulkadest . . . . .	78

<b>10 Tünniruumid ja F-ruumid</b>	<b>81</b>
10.1 Tugev topoloogia ja tünniruum	81
10.2 F-ruumid. Lahtise kujutuse printsip	83
10.3 Teoreem kinnisest graafikust	85
<b>11 Projektiivsed piirid</b>	<b>88</b>
11.1 Projektiivse piiri topoloogia	88
11.2 Lokaalselt kumerate ruumide otsekorrutis	91
<b>12 Induktiivsed piirid. Bornoloogilised ruumid</b>	<b>94</b>
12.1 Induktiivse piiri topoloogia	94
12.2 Bornoloogilised ruumid	96
<b>13 Induktiivse piiri erijuhud: faktorruum, otsesumma, range induktiivne piir</b>	<b>100</b>
13.1 Faktorruumid	100
13.2 Topoloogilised otsesummad	102
13.3 Ranged induktiivsed piirid	106
<b>14 Topoloogiliste vektorruumide näiteid</b>	<b>109</b>
14.1 Lokaalselt tõkestatud ruumid $L^p$ , kus $0 < p < 1$	109
14.2 Pidevate funktsioonide ruumid	110
14.3 Analüütiliste funktsioonide ruum	111
14.4 Diferentseeruvate funktsioonide ruume	112
14.5 Distributsioonid	114
14.6 Jadaruumid	115

# 1 Topoloogilised ruumid

Selles sissejuhatavas peatiikis on meie eesmärgiks tuletada meeleteenud topoloogiliste ruumidega seotud põhilised mõisted ja faktid, mida teame üldise topoloogia ja funktsionaalanalüüs kurustest. Klassikaline funktsionaalanalüüs, mille põhisisu on normeeritud ruumid ja lineaarsed kujutused neis ning nende vahel, toetub põhiliselt meetriliste ruumide teooriale. Meetrilise ruumi topoloogia on täielikult kirjeldatav selles ruumis koonduvate jadadega. Topoloogilises ruumis vajatakse selleks üldisemat koonduvuse mõistet, mida saab kirjeldada kas filtrite või suunatud perede abil. Meie oma käsitluses kasutame põhiliselt suunatud peresid.

## 1.1 Üldise topoloogia põhimõisted ja -tulemused

**Topoloogiline ruum.** Olgu  $X$  mingi hulk. Alamhulkade süsteemi  $\tau$  nimetatakse *topoloogiaks* hulgas  $X$ , kui ta rahuldab järgmisi tingimusi:

(T1)  $\emptyset \in \tau$  ja  $X \in \tau$ ,

(T2) kui  $G_\gamma \in \tau$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral, siis  $\bigcup_{\gamma \in \Gamma} G_\gamma \in \tau$  mistahes hulga  $\Gamma$  puhul,

(T3) kui  $G_1, \dots, G_n \in \tau$ , siis  $\bigcap_{k=1}^n G_k \in \tau$ .

Hulka  $X$ , mis on varustatud topoloogiaga  $\tau$ , nimetatakse *topologiliseks ruumiks* (järgnevalt lühidalt *TR*), mida me tähistame  $(X, \tau)$  või lihtsalt  $X$ , kui topoloogia suhtes on kokku lepitud. Süsteemi  $\tau$  elemente  $G$  nimetatakse *TR-i  $X$  lahtisteks hulkadeks*, hulga  $X$  elemente  $x$  aga selle ruumi *punktideks*.

**Topoloogiate võrdlemine.** Kui hulgas  $X$  on defineeritud kaks topoloogiat  $\tau$  ja  $\tau'$  ning  $\tau \subset \tau'$  (s.t. iga lahtine hulk *TR*-is  $(X, \tau)$  on lahtine ka ruumis  $(X, \tau')$ ), siis öeldakse, et topoloogia  $\tau'$  on *tugevam* topoloogiast  $\tau$  ehk  $\tau$  on *nõrgem* kui  $\tau'$ . Igas hulgas on nõrgim ja tugevaim topoloogia, need on vastavalt  $\{\emptyset, X\}$  ja  $\{G \mid G \subset X\}$ .

**TR-i alamruum.** Olgu  $(X, \tau)$  TR ja  $X_0$  hulga  $X$  mingi alamhulk. Siis

$$\tau_0 := \{X_0 \cap G \mid G \in \tau\}$$

on topoloogia hulgas  $X_0$ . TR-i  $(X_0, \tau_0)$  nimetatakse ruumi  $(X, \tau)$  *alamruumiks*.

**Hulga sisepunktid.** TR-i  $(X, \tau)$  alamhulga  $E$  elementi  $x$  nimetatakse selle hulga *sisepunktidiks*, kui leidub niisugune  $G \in \tau$ , et  $x \in G \subset E$ . Selle definitsiooni kohaselt koosneb lahtine hulk ainult sisepunktidest.

**Punkti ümbrused.** Iga hulka  $U \subset X$ , millele element  $x \in X$  on sisepunkt, nimetatakse punkti  $x$  *ümbruseks*. Niisiis, *hulk  $U \subset X$  on punkti  $x \in X$  ümbris parajasti siis, kui leidub selline lahtine hulk  $G \subset X$ , et  $x \in G \subset U$ .*

**Ümbruste baas.** Kui antud punkti  $x \in X$  puhul on fikseeritud selline ümbruste süsteem  $\mathfrak{B}_x$ , et

N<sub>2c</sub>

punkt x suvalise ümbruse U korral leidub  $V \in \mathfrak{B}_x$  omadusega  $V \subset U$ ,

siis süsteemi  $\mathfrak{B}_x$  nimetatakse punkti x ümbruste *baasiks* (ehk *fundamentaalsüsteemiks*).

Topoloogia saab määrrata ka nii, et defineeritakse iga punkti x jaoks ümbruste baas. Nimelt kehtib järgmine teoreem.

**Teoreem 1.1.** (a) Kui  $TR$ -s  $(X, \tau)$  iga punkti  $x \in X$  jaoks on fikseeritud tema ümbruste baas  $\mathfrak{B}_x$ , siis on täidetud järgmised tingimused:

(B1) kui  $V \in \mathfrak{B}_x$ , siis  $x \in V$ ,

(B2) kui  $V_1, V_2 \in \mathfrak{B}_x$ , siis leidub  $V \in \mathfrak{B}_x$  omadusega  $V \subset V_1 \cap V_2$ , f\circ

(B3) iga  $V \in \mathfrak{B}_x$  jaoks leidub  $V' \in \mathfrak{B}_x$  nii, et

$$1) V' \subset V \text{ ja } 2) \forall y \in V' \exists W \in \mathfrak{B}_y : W \subset V.$$

(b) Olgu hulga  $X$  iga elemendi  $x$  jaoks määratud mittetühi alamhulkade süsteem  $\mathfrak{B}_x$  nii, et oleksid täidetud tingimused (B1) – (B3). Siis alamhulkade süsteem

$$\tau := \{G \subset X \mid \forall x \in G \exists V \in \mathfrak{B}_x : V \subset G\}$$

on topoloogia hulgas  $X$ , mille suhtes  $\mathfrak{B}_x$  on punkti  $x$  ümbruste baas.

**Topoloogiate võrdlemine ümbruste baaside abil.** Olgu hulgas  $X$  määratud kaks topoloogiat  $\tau$  ja  $\tau'$ , tähistame suvalise punkti  $x \in X$  ümbruste baasid nendes topoloogiates vastavalt  $\mathfrak{B}_x$  ja  $\mathfrak{B}'_x$ . Kehtib seos

$$\tau \subset \tau' \Leftrightarrow \forall x \in X \forall V \in \mathfrak{B}_x \exists U \in \mathfrak{B}'_x : U \subset V.$$

$$\mathfrak{B}_x \subset \mathcal{N}_x^1 \left( \begin{matrix} \mathcal{N}_x^1 \\ \mathcal{N}_x^2 \subset \mathcal{N}_x^1 \end{matrix} \right)$$

**Ümbruste baasid alamruumis.**  $TR$ -i  $(X, \tau)$  alamruumi  $X_0$  topoloogia  $\tau_0$  on määratud ümbruste baasidega

$$\mathfrak{B}_x^0 := \{X_0 \cap U \mid U \in \mathfrak{B}_x\} \quad (x \in X_0).$$

**Alamhulga puutepunkt.** Olgu  $E$   $TR$ -i  $(X, \tau)$  alamhulk. Punkti  $x \in X$  nimetatakse hulga  $E$  puutepunktiks, kui ta iga ümbrus  $V$  lõikab hulka  $E$ , s.t. kui  $E \cap V \neq \emptyset$ . Selle definitsiooni puhul juhime tähelepanu järgmisele lihtsalt kontrollitavale, kuid olulisele faktile, mida me allpool tihti kasutame ilma seda kommenteerimata:

väljendi "punkti  $x$  iga ümbrus" võib asendada väljendiga "iga  $V \in \mathfrak{B}_x$ ".

**Alamhulga sulund.** Hulga  $E$  kõigi puutepunktide hulka nimetame tema *sulundiks* ja tähistame  $\overline{E}$ . Niisiis,

$$x \in \overline{E} \Leftrightarrow \forall V \in \mathfrak{B}_x : E \cap V \neq \emptyset.$$

Toome mõned olulisemad *sulundi omadused* (tõestada!) ☒:

- 1)  $E \subset \overline{E}$ ,  $\overline{\overline{E}} = \overline{E}$
- 2)  $E_1 \subset E_2 \Rightarrow \overline{E_1} \subset \overline{E_2}$ ,
- 3)  $\overline{E_1 \cup E_2} = \overline{E_1} \cup \overline{E_2}$ .

**Kinnised hulgad.** Hulka  $E \subset X$  nimetatakse *kinniseks*  $TR$ -s  $(X, \tau)$  ehk  $\tau$ -*kinniseks*, kui  $E = \overline{E}$ . Lihtne kontroll näitab, et  $E$  on kinnine parajasti siis, kui tema täiend on lahtine, s.t. kui  $X \setminus E \in \tau$ .

**Pidev kujutus.** Kujutust  $f$   $TR$ -st  $(X, \tau)$   $TR$ -i  $(Z, \tau')$  nimetatakse pidevaks punktis  $x \in X$ , kui punkti  $f(x) \in Z$  iga ümbruse  $V$  korral tema originaal  $f^{-1}(V)$  on punkti  $x$  ümbrus  $TR$ -s  $(X, \tau)$ . Sellega on samaväärne tingimus

$$\forall V \in \mathfrak{B}_{f(x)} \exists U \in \mathfrak{B}_x : f(U) \subset V.$$

Kujutus  $f$  on pidev (s.t. pidev iga punktis  $x \in X$ ), kui kehtivad järgmised teineteisega samaväärsed tingimused:

- (i)  $G \in \tau' \Rightarrow f^{-1}(G) \in \tau$  (lahtise hulga originaal on lahtine),
- (ii)  $F = \overline{F}$  ruumis  $Z \Rightarrow f^{-1}(F) = \overline{f^{-1}(F)}$  ruumis  $X$  (kinnise hulga originaal on kinnine).

**TR-de isomorfism.** Kui antud TR-de  $(X, \tau)$  ja  $(Z, \tau')$  puhul leidub niisugune pööratav ehk bijektiivne kujutus  $f: (X, \tau) \rightarrow (Z, \tau')$ , mis on pidev ning mille pöördkujutus  $f^{-1}: (Z, \tau') \rightarrow (X, \tau)$  on samuti pidev, siis nimetame neid TR-e *isomorfseteks* ehk *homöomorfseteks*. Kujutust  $f$  nimetame sel juhul TR-de  $(X, \tau)$  ja  $(Z, \tau')$  *topoloogiliseks isomorfismiks* ehk *homöomorfismiks*.

**TR-de korrutis.** Selle artikli lõpus vaatleme topoloogiliste ruumide korrutistopoloojat, piirdudes seejuures kahe TR-i  $(X, \tau)$  ja  $(Z, \tau')$  korrutisega. Defineerime korrutishulgus

$$X \times Z := \{(x, z) \mid x \in X, z \in Z\}$$

korrutistopoloojia  $\tau_{X \times Z}$  järgmisel viisil. Punkti  $w := (x_0, z_0)$  ümbruste baasiks võtame hulga  $X \times Z$  alamhukade süsteemi

$$\mathfrak{B}_w := \{U \times V \mid U \in \mathfrak{B}_{x_0}, V \in \mathfrak{B}_{z_0}\},$$

kus  $\mathfrak{B}_{x_0}$  ja  $\mathfrak{B}_{z_0}$  on vastavalt punktide  $x_0$  ja  $z_0$  ümbruste baas ruumis  $(X, \tau)$  ja  $(Z, \tau')$ . Vahetu kontroll näitab, et sel juhul on täidetud teoreemi 1.1 tingimused **(B1)** - **(B3)**, seega on hulgas  $X \times Z$  defineeritud topoloogia, mida me nimetame *korrutistopoloojaks* ja mille suhtes süsteem  $\mathfrak{B}_w$  iga  $w \in X \times Z$  korral on ümbruste baas.

Analoogiliselt defineeritakse korrutistopoloojia suvalise lõpliku arvu TR-de korral.

**Pidev kujutus korrutisruumis.** Olgu lisaks TR-dele  $X$  ja  $Z$  antud veel kolmas TR  $(H, \tau'')$ . Kujutus  $f: (X \times Z, \tau_{X \times Z}) \rightarrow (H, \tau'')$  on definitsiooni kohaselt punktis  $w = (x_0, z_0)$  pidev parajasti siis, kui

$$\forall W \in \mathfrak{B}_{f(w)} \exists U \in \mathfrak{B}_{x_0}, V \in \mathfrak{B}_{z_0} : f(U \times V) \subset W.$$

Seejuures on kujutused

$$f_{z_0}: (X, \tau) \rightarrow (H, \tau''), x \mapsto f(x, z_0)$$

ja

$$f_{x_0}: (Z, \tau') \rightarrow (H, \tau''), z \mapsto f(x_0, z)$$

pidevad vastavalt punktis  $x_0$  ja  $z_0$ .

## 1.2 Suunatud pered topoloogilises ruumis

**Suunatud pere.** Olgu  $\Gamma$  mingi suunatud hulk (suunatud hulga definitsioon on toodud sissejuhatuses). Kujutust suunatud hulgast  $\Gamma$  mingisse hulka  $X$  nimetatakse *suunatud perek* (või lühidalt *perek*) hulgas  $X$ . Lihtsaimad pered on jadad, need tekivad juhul  $\Gamma = \mathbb{N}$ . Jadade eeskujul tähistame suunatud hulgaga  $\Gamma$  määratud peresid  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  või lühemalt  $(x_\gamma)$ .

**Definitsioon.** Olgu  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  pere hulgas  $X$  ning olgu  $E$  hulga  $X$  mingi alamhulk. Ütleme, et pere  $(x_\gamma)$

- 1) *riivab sageli hulka E*, kui iga  $\gamma \in \Gamma$  korral leidub  $\gamma' \geq \gamma$  omadusega  $x_{\gamma'} \in E$ , frequent FET
- 2) on *põhiliselt hulgas E*, kui leidub selline  $\gamma_0 \in \Gamma$ , et  $x_\gamma \in E$  iga  $\gamma \geq \gamma_0$  korral. NEP

E ∈ F



**Lemma 1.2.** Olgu  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  pere hulgas  $X$ . Leidub hulga  $X$  alamhulkade hulk  $\mathcal{C}$  järgmiste omadustega:

- (i)  $(x_\gamma)$  riivab sageli iga hulka  $A \in \mathcal{C}$ ,
- (ii) kui  $A, B \in \mathcal{C}$ , siis  $A \cap B \in \mathcal{C}$ ,
- (iii) iga  $A \subset X$  puhul kas  $A \in \mathcal{C}$  või  $X \setminus A \in \mathcal{C}$ .

**Tõestus.** Vaatleme alamhulkade  $A \subset X$  hulki  $\mathcal{F}$ , mille korral on täidetud tingimused (i) ja (ii), olgu  $\Phi$  kõigi selliste hulkade  $\mathcal{F}$  hulk:

$$\Phi := \{\mathcal{F} \mid \mathcal{F} \text{ rahuldab tingimusi (i) ja (ii)}\}.$$

Selge, et  $\{X\} \in \Phi$ , seega  $\Phi \neq \emptyset$ . Määrame hulgas  $\Phi$  osalise järjestuse sisalduvuse järgi seosega

$$\mathcal{F}_1 \leq \mathcal{F}_2 : \Leftrightarrow \mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$$

ning näitame Zorni lemma abil, et selles osaliselt järjestatud hulgas on maksimaalne element.

Olgu  $\{\mathcal{F}_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\} \subset \Phi$  täielikult järjestatud alamhulk, tähistame

$$\widehat{\mathcal{F}} := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{F}_\lambda = \{A \subset X \mid \exists \lambda \in \Lambda : A \in \mathcal{F}_\lambda\}$$

ja veendume, et  $\widehat{\mathcal{F}} \in \Phi$  (iseseisvalt!)  $\blacksquare$ . Seega on suvaliselt valitud täielikult järjestatud alamhulk  $\{\mathcal{F}_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$  hulgas  $\Phi$  ülalt tõkestatud elemendiga  $\widehat{\mathcal{F}}$ , Zorni lemma kohaselt on hulgas  $\Phi$  maksimaalne element, tähistame selle tähega  $\mathcal{C}$ . Jääb näidata, et  $\mathcal{C}$  rahuldab tingimust (iii).

Vaatleme kahte juhtu. **Esiteks**, olgu  $A \subset X$  selline, et iga  $B \in \mathcal{C}$  korral pere  $(x_\gamma)$  riivab sageli hulka  $A \cap B$ . Olgu

$$\mathcal{F}' := \{C \subset X \mid \exists B \in \mathcal{C} : A \cap B \subset C\},$$

siis  $(x_\gamma)$  riivab sageli iga hulka  $C \in \mathcal{F}'$  (selgitada!)  $\blacksquare$ . Seejuures, kui  $C, C' \in \mathcal{F}'$ , siis leiduvad  $B, B' \in \mathcal{C}$ , et  $A \cap B \subset C$  ja  $A \cap B' \subset C'$ , järelikult

$$A \cap (B \cap B') \subset C \cap C'.$$

Seose  $B \cap B' \in \mathcal{C}$  tõttu  $C \cap C' \in \mathcal{F}'$ . Tähendab,  $\mathcal{F}' \in \Phi$ , ja kuna  $A \in \mathcal{F}'$  (põhjendada!)  $\blacksquare$ , siis  $B \in \mathcal{F}'$  iga  $B \in \mathcal{C}$  korral ehk  $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}'$ . Kuid kuna  $\mathcal{C}$  on maksimaalne, siis  $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}'$ , järelikult  $A \in \mathcal{C}$ .

**Teiseks** vaatleme alternatiivset juhtu, kus mingi  $B_0 \in \mathcal{C}$  korral  $(x_\gamma)$  ei riiva sageli hulka  $A \cap B_0$ , s.t.  $(x_\gamma)$  on põhiliselt hulgas  $X \setminus (A \cap B_0) =: D$ . Kuna  $(x_\gamma)$  riivab sageli iga hulka  $B \in \mathcal{C}$ , siis ka hulka  $D \cap B$ . Kordame eelmise juhu arutelu, võttes hulga  $A$  asemel hulga  $D$ , saame, et  $D \in \mathcal{C}$ . Pidades silmas, et suvalise  $B \in \mathcal{C}$  korral  $D \cap B \cap B_0 \in \mathcal{C}$  ja

$$\begin{aligned} D \cap B \cap B_0 &= (X \setminus (A \cap B_0)) \cap B \cap B_0 = ((X \setminus A) \cup (X \setminus B_0)) \cap (B \cap B_0) \\ &= ((X \setminus A) \cap B \cap B_0) \cup ((X \setminus B_0) \cap B \cap B_0) \\ &= (X \setminus A) \cap B \cap B_0 \quad (\text{sest } (X \setminus B_0) \cap B \cap B_0 = \emptyset), \end{aligned}$$

saame, et  $(x_\gamma)$  riivab sageli hulka  $(X \setminus A) \cap B$  iga  $B \in \mathcal{C}$  puhul. Korrates veel korda esimesel juhul esitatud arutelu hulga  $X \setminus A$  korral, saame, et  $X \setminus A \in \mathcal{C}$ . Lemma on tõestatud. ■

**Osapered. Definitsioon.** Olgu  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  pere hulgas  $X$  ning olgu  $\Delta$  suunatud hulk. Ütleme, et pere  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$  on esialgse pere  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  osapere, kui on täidetud järgmine tingimus:

$$\forall \gamma \in \Gamma \exists \beta \in \Delta \forall \beta' \geq \beta \exists \gamma' \geq \gamma : y_{\beta'} = x_{\gamma'}. \quad \text{Diagram: } \mathcal{F}_{(\gamma)} \xrightarrow{\exists \beta} \mathcal{F}_{(\beta)} \xrightarrow{\exists \gamma'} \mathcal{F}_{(\gamma')}$$

Märgime, et jada osapere ei pruugi olla osajada: näiteks on  $(3, 2, 4, 6, \dots, 2n, \dots)$  naturaalarvude jada  $(1, 2, 3, \dots)$  osapere, kuid ei ole osajada.

**Lemma 1.3.** Olgu  $(x_\gamma)$  pere hulgas  $X$  ja olgu  $\mathcal{A}$  selline alamhulkade  $A \subset X$  hulk, et

(i)  $(x_\gamma)$  riivab sageli iga hulka  $A \in \mathcal{A}$ ,

(ii) suvaliste  $A, B \in \mathcal{A}$  puhul leidub selline  $C \in \mathcal{A}$ , et  $C \subset A \cap B$ .

Siis leidub perel  $(x_\gamma)$  niisugune osapere  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$ , mis on põhiliselt hulgas  $A$  iga  $A \in \mathcal{A}$  korral.

**Tõestus.** Defineerime hulgas  $\mathcal{A}$  osalise järjestuse sisalduvuse järgi nii, et

$$A \leq B : \Leftrightarrow B \subset A,$$

tänu eeldusele (ii) on  $\mathcal{A}$  suunatud hulk. Tähistame

$$\Delta := \{(\gamma, A) \mid \gamma \in \Gamma, A \in \mathcal{A}, x_\gamma \in A\}$$

ning defineerime hulgas  $\Delta$  osalise järjestuse

$$(\gamma, A) \leq (\gamma', A') : \Leftrightarrow [\gamma \leq \gamma', A \leq A']$$

(kontrollida!) **✗**. Näitame, et  $\Delta$  on suunatud hulk. Suvaliste  $(\gamma, A), (\gamma', A') \in \Delta$  puhul leidame kõigepealt  $A_0 \in \mathcal{A}$ , et  $A_0 \subset A \cap A'$  (vrd. tingimus (ii)), ning seejärel (tingimust (i) ja hulga  $\Gamma$  suunatust kasutades) sellise  $\gamma_0 \in \Gamma$ , et  $\gamma, \gamma' \leq \gamma_0$  ja  $x_{\gamma_0} \in A_0$ . Siis  $(\gamma_0, A_0) \in \Delta$  ning  $(\gamma, A), (\gamma', A') \leq (\gamma_0, A_0)$ , järelkult on  $\Delta$  suunatud hulk.

Olgu  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$  pere, kus iga  $\beta := (\gamma, A) \in \Delta$  korral  $y_\beta := x_\gamma$ , siis  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$  on pere  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  osapere. Tõepoolest, suvalise  $\gamma \in \Gamma$  puhul valime  $A \in \mathcal{A}$  nii, et  $x_\gamma \in A$ , siis  $\beta := (\gamma, A) \in \Delta$ , ja kui  $\beta' := (\gamma', A') \in \Delta$  ning  $\beta' \geq \beta$ , siis  $\gamma' \geq \gamma$  ja  $A' \subset A$ , seejuures  $y_{\beta'} = x_{\gamma'}$ .

Osutub, et suvalise  $A \in \mathcal{A}$  korral on  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$  põhiliselt hulgas  $A$ . Nimelt leidub eelduse (i) põhjal selline  $\gamma \in \Gamma$ , et  $x_\gamma \in A$ , seega  $\beta = (\gamma, A) \in \Delta$ . Seejuures iga  $\beta' = (\gamma', A') \geq \beta$  korral  $y_{\beta'} = x_{\gamma'} \in A' \subset A$ . Lemma on tõestatud. ■

**Ultrapered. Definitsioon.** *Ultrapererek* (ehk universaalseks perek) hulgas  $X$  nimetaakse sellist peret, mis iga alamhulga  $E \subset X$  korral on põhiliselt kas hulgas  $E$  või selle täiendis  $X \setminus E$ .

Lemmade 1.2 ja 1.3 abil tõestame järgmiste lause.

$\mathcal{F}_{(\gamma_n)}$  - ultrafilter

**Lause 1.4.** Iga pere sisaldab osapere, mis on ultrapere.

**Tõestus.** Olgu  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  pere hulgas  $X$ , olgu  $\mathcal{C}$  alamhulkade  $C \subset X$  hulk, mis rahuldab lemma 1.2 tingimusi (i), (ii) ja (iii). Siis rahuldab  $\mathcal{C}$  ka lemma 1.3 eeldusi (i) ja (ii), niisiis saame moodustada sellise osapere  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$ , et iga  $C \in \mathcal{C}$  korral  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$  on põhiliselt hulgas  $C$  või hulgas  $X \setminus C$ . Kuna suvalise  $A \subset X$  puhul kas  $A \in \mathcal{C}$  või  $X \setminus A \in \mathcal{C}$ , siis  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$  on põhiliselt kas hulgas  $A$  või hulgas  $X \setminus A$ . Seega on  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$  ultrapere. ■

✓ filter is contained in an ultrafilter

**Pere koonduvus TR-s. Definitsioon.** Olgu  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  pere TR-s  $(X, \tau)$ . Punkt  $x \in X$  nimetatakse pere  $(x_\gamma)$  piirväärtuseks (ütleme ka, et pere  $(x_\gamma)$  koondub punktiks  $x$ ), kui punkti  $x$  iga ümbruse  $U \in \mathfrak{B}_x$  puhul leidub selline indeks  $\gamma_0 \in \Gamma$ , et  $x_\gamma \in U$  iga  $\gamma \geq \gamma_0$  korral. Sel juhul kirjutame  $\lim_{\gamma \in \Gamma} x_\gamma = x$  (lühemalt  $\lim_\gamma x_\gamma = x$ ) või  $x_\gamma \rightarrow x$ , aga ka  $x_\gamma \rightarrow x(\tau)$ , kui on vaja rõhutada, millises topoloogias koonduvus aset leiab.

Lihtne on veenduda, et kui pere  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  koondub TR-s  $X$  mingiks punktiks  $x$ , siis samaks punktiks koondub ka iga tema osapere  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$  (kontrollida!)  $\blacksquare$ .

**Pere kuhjumispunkt TR-s.** Esitatud definitsiooni kohaselt  $x_\gamma \rightarrow x$  parajasti siis, kui punkti  $x$  iga ümbruse  $U$  korral pere  $(x_\gamma)$  on põhiliselt hulgas  $U$ .

**Definitsioon.** Kui  $(x_\gamma)$  on pere TR-s  $X$  ja  $x \in X$  selline punkt, mille iga ümbrust  $U$  see pere riivab sageli, siis öeldakse, et  $x$  on pere  $(x_\gamma)$  kuhjumispunkt.  $\text{cluster point}$

**Lause 1.5.** Punkt  $x$  on pere  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  kuhjumispunkt TR-s  $X$  parajasti siis, kui leidub selline osapere  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$ , et  $y_\beta \rightarrow x$ .

**Tõestus.** Tarvilikkus. Eeldame, et  $x$  on pere  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  kuhjumispunkt. Olgu  $\mathfrak{B}_x$  punkti  $x$  mingi ümbruste baas, siis  $\mathcal{A} := \mathfrak{B}_x$  rahuldab lemma 1.3 eeldusi (i) ja (ii) (selgitada!)  $\blacksquare$ . Lemma väite kohaselt leidub perel  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  selline osapere  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$ , mis on põhiliselt hulgas  $U$  iga  $U \in \mathfrak{B}_x$  korral. Seega  $y_\beta \rightarrow x$ .

**Piisavus.** Olgu  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$  pere  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  selline osapere, mis koondub punktiks  $x$  ja olgu  $U \in \mathfrak{B}_x$ . Peame veenduma, et iga  $\gamma \in \Gamma$  puhul leidub  $\gamma' \in \Gamma$ , et  $\gamma' \geq \gamma$  ja  $x_{\gamma'} \in U$ . Osapere definitsiooni kohaselt saame valida niisuguse  $\beta(\gamma) \in \Delta$ , mis rahuldab tingimust

$$\forall \beta' \geq \beta(\gamma) \exists \gamma' \geq \gamma : y_{\beta'} = x_{\gamma'}.$$

Edasi, lähtudes koonduvusest  $y_\beta \rightarrow x$ , saame leida  $\beta_1 \in \Delta$  omadusega

$$\beta' \geq \beta_1 \Rightarrow y_{\beta'} \in U.$$

Valides nüüd  $\beta' \in \Delta$  nii, et  $\beta' \geq \beta(\gamma)$  ja  $\beta' \geq \beta_1$ , saamegi soovitud seose  $x_{\gamma'} = y_{\beta'} \in U$ . ■

**Lause 1.6.** Ultrapere koondub parajasti siis, kui tal on kuhjumispunkt.

**Tõestus.** Iseseisvalt!  $\blacksquare$

*Separated, T<sub>2</sub>*

**Eralduvad TR-d ehk Hausdorff ruumid.** Koonduvuse mõistel topoloogilises ruumis on oluline puudus meetriliste ruumidega võrreldes: koonduva pere (või jada) piirväärtus ei ole üldjuhul üheselt määratud. Selles on lihtne veenduda järgmise triviale näite varal. Olgu  $X = \{a, b, c\}$  kolme-elemendiline hulk topoloogiaga  $\tau := \{X, \{a, b\}, \emptyset\}$  (veenduda, et see on topoloogia!)  $\blacksquare$ . Kuna punktidel  $a$  ja  $b$  on ühed ja samad ümbrused, siis jadad  $(a, a, \dots)$  ja  $(b, b, \dots)$  koonduvad mõlemad nii punktiks  $a$  kui ka punktiks  $b$ .

Et vältida sellist paljude probleemiasetuste puhul vastuvõetamatut olukorda, vaadeldakse enamasti *eralduvaid* topoloogilisi ruume ehk *Hausdorffi ruume*. Nii nimetatakse TR-i  $X$  järgmisse omadusega:

kui  $x \neq y$ ,  $x, y \in X$ , siis leiduvad  $U \in \mathfrak{B}_x$  ja  $V \in \mathfrak{B}_y$ , et  $U \cap V = \emptyset$ .

Kehtib järgmine lause.



$\tau = \{X, \emptyset\}$   
 $X = \{a, b\}$  - not Hausdorff.

$$\mathcal{W}_a = \mathcal{W}_b = \{X\} \subseteq \mathcal{F}$$

**Lause 1.7.** TR  $X$  on eralduv parajasti siis, kui igal koonduval perel on selles ruumis vaid üks piirväärtus.

**Tõestus.** Iseseisvalt (vt. ülesanne 1.1)  $\blacksquare$ .

**Kinniste alamhulkade ja kujutuste pidevuse kirjeldamine koonduvate perede abil.** Punkti  $x \in X$  ümbruste baas  $\mathfrak{B}_x$  TR-s  $X$  on sisalduvuse järgi suunatud hulk. Tõepoolest, kui defineerime

$$V \leq V' : \Leftrightarrow V' \subset V,$$

siis  $\mathfrak{B}_x$  rahuldab kõiki suunatud hulga definitsiooni tingimusi (kontrollida!)  $\blacksquare$ . Edasi, kui fikseerime suvaliselt iga  $V \in \mathfrak{B}_x$  korral elemendi  $x_V \in V$ , siis saame suunatud pere  $(x_V)_{V \in \mathfrak{B}_x}$ . Seejuures  $\lim_{V \in \mathfrak{B}_x} x_V = x$ : kui  $U \in \mathfrak{B}_x$ , siis iga  $V \geq U$  korral kehtib  $x_V \in V \subset U$ . See tähelepanek võimaldab koonduvate perede abil kirjeldada topoloogilisi seoseid TR-s  $X$  samamoodi, nagu seda meetriliste ruumide juhul saab teha koonduvate jadade abil.

**Lause 1.8.** Olgu  $(X, \tau)$  ja  $(Y, \tau')$  TR-d.

(a) Element  $x \in X$  on alamhulga  $E \subset X$  puutepunkt parajasti siis, kui leiduvad selline suunatud hulk  $\Gamma$  ja hulga  $E$  minge elementide pere  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$ , mis koondub piirväärtuseks  $x$  ruumis  $X$ . Lühidalt:

$$x \in \overline{E} \Leftrightarrow [\exists (x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma} : x_\gamma \in E \text{ ja } x_\gamma \rightarrow x(\tau)]. \quad \Rightarrow \exists \exists \subset P(E) \exists \rightarrow x$$

(b) Alamhulk  $E \subset X$  on kinnine parajasti siis, kui ta sisaldab kõigi oma koonduvate perede piirväärtused. Lühidalt:

$$E = \overline{E} \Leftrightarrow [x_\gamma \in E \ (\gamma \in \Gamma), \ x_\gamma \rightarrow x(\tau) \Rightarrow x \in E].$$

(c) Kujutus  $f: X \rightarrow Y$  on pidev punktis  $x \in X$  parajasti siis, kui kehtib implikatsioon

$$x_\gamma \rightarrow x(\tau) \Rightarrow f(x_\gamma) \rightarrow f(x)(\tau').$$

$$\exists \rightarrow x \Rightarrow f(\exists) \rightarrow f(x)$$

Ülesanne 1.1. Tõestada lause 1.7.

$\times$  Ülesanne 1.2. Tõestada lause 1.8(a).

Ülesanne 1.3. Tõestada lause 1.8(b).

Ülesanne 1.4. Tõestada lause 1.8(c).

$$\begin{cases} f(F) & | F \in \mathcal{J} \end{cases}$$

### 1.3 Kompaktsed topoloogilised ruumid

**Kompaktsed TR-d.** Olgu  $\{E_\alpha\}_{\alpha \in A}$  hulga  $X$  alamhulkade süsteem. Ütleme, et  $\{E_\alpha\}$  on *tsentreeritud süsteem*, kui iga tema lõpliku osasüsteemi ühisosa on mittetühi, s.t.

$$\bigcap_{k=1}^n E_{\alpha_k} \neq \emptyset \text{ suvaliselt valitud } n \in \mathbb{N} \text{ ja } \alpha_1, \dots, \alpha_n \in A \text{ korral.} \quad (1.1)$$

Kui  $\bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha = X$ , siis öeldakse, et  $\{E_\alpha\}$  on hulga  $X$  *kate*.

TR-i  $(X, \tau)$  nimetatakse kompaktseks, kui iga tema lahtistest hulkadest moodustatud kate sisaldab lõpliku osakatte, s.t. kui kehtib implikatsioon

$$\left[ G_\alpha \in \tau \quad (\alpha \in A), \quad \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha = X \right] \Rightarrow X = \bigcup_{k=1}^n G_{\alpha_k} \text{ mingite } \alpha_1, \dots, \alpha_n \in A \text{ korral.}$$

$P \Rightarrow Q$   
 $\neg Q \Rightarrow \neg P$

Vahetu kontroll näitab, et  $X$  on kompaktne parajasti siis, kui tema iga kinniste alamhulkade tsentreeritud süsteemi ühisosa on mittetühi, s.t. kui tingimusest (1.1), kus  $E_\alpha = \overline{E_\alpha}$  iga  $\alpha \in A$  korral, järeltub, et  $\bigcap_{\alpha \in A} E_\alpha \neq \emptyset$  (veenduda!)  $\blacksquare$ .

**Teoreem 1.9.** TR-i  $(X, \tau)$  puhul on järgmised väited samaväärsed:

- (a)  $X$  on kompaktne,
- (b) igal suunatud perel on TR-s  $X$  vähemalt üks kuhjumispunkt,  $\forall \text{ filter } \mathcal{F} \text{ has a cluster point}$
- (c) iga suunatud pere sisaldab koonduva osapere,  $\exists \mathcal{F} \ni \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{F}, \mathcal{C} \text{ converges}$
- (d) iga ultrapere on koonduv.  $\forall \text{ ultrafilter is convergent}$

**Tõestus.** Seos (b)  $\Leftrightarrow$  (c) on tõestatud lauses 1.5.

(a)  $\Rightarrow$  (b) Eeldame, et  $X$  on kompaktne TR, olgu  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  suvaline elementide pere ruumis  $X$ . Defineerime iga  $\gamma \in \Gamma$  korral hulga  $\Delta_\gamma := \{x_{\gamma'} \mid \gamma' \geq \gamma\}$ , siis  $\Delta_{\gamma_1} \subset \Delta_{\gamma_2}$ , kui  $\gamma_1 \geq \gamma_2$ , ja  $\Delta_\gamma \neq \emptyset$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral. Seejuures on  $\{\Delta_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma}$  tsentreeritud süsteem. Nimelt, kui võtame suvalised  $\Delta_{\gamma_1}, \dots, \Delta_{\gamma_n}$  ja leiate  $\gamma_0 \in \Gamma$  omadusega  $\gamma_1, \dots, \gamma_n \leq \gamma_0$  (see on võimalik, sest  $\Gamma$  on suunatud hulk), siis  $\bigcap_{i=1}^n \Delta_{\gamma_i} \supset \Delta_{\gamma_0} \neq \emptyset$ . Muidugi on siis ka süsteem  $\{\overline{\Delta_\gamma}\}_{\gamma \in \Gamma}$  tsentreeritud, kompaktsusest järeltub, et  $\bigcap_{\gamma \in \Gamma} \overline{\Delta_\gamma} \neq \emptyset$ . Võtame mingi punkti  $x \in \bigcap_{\gamma \in \Gamma} \overline{\Delta_\gamma}$  ja näitame, et  $x$  on pere  $(x_\gamma)$  kuhjumispunkt.  $\mathcal{F} = \{F\} \ni \mathcal{C} = \{F\} \ni x \in \bigcap_{\gamma \in \Gamma} F$

Olgu  $U \in \mathfrak{B}_x$  ja  $\gamma_0 \in \Gamma$  suvalised. Kuna  $x \in \overline{\Delta_{\gamma_0}}$ , siis  $U \cap \Delta_{\gamma_0} \neq \emptyset$ , seega leidub  $\gamma \in \Gamma$  omadusega  $\gamma \geq \gamma_0$  ja  $x_\gamma \in U$ . Teiste sõnadega, pere  $(x_\gamma)$  riivab sageli punkti  $x$  suvalist ümbrust  $U$ , s.t.  $x$  on selle pere kuhjumispunkt.

(b)  $\Rightarrow$  (a) Eeldame, et TR-i  $X$  iga elementide pere omab kuhjumispunkti. Olgu  $\mathcal{F}$  suvaline kinniste alamhulkade tsentreeritud süsteem, moodustame hulga

$$\Omega = \text{centered system of closed sets in } \Gamma \approx \{A \mid \exists S \in \mathcal{F} \subset A\}, \quad \Omega = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$$

siis iga  $S \in \Omega$  korral  $\overline{S} = S \neq \emptyset$ . Defineerides hulgast  $\Omega$  seose  $S \leq S'$  : $\Leftrightarrow S \supset S'$ , saame suunatud hulga (kontrollida!)  $\blacksquare$ . Fikseerime iga  $S \in \Omega$  korral vabalt  $x_S \in S$  ning moodustame pere  $(x_S)_{S \in \Omega}$ . Eelduse kohaselt on sel perel vähemalt üks kuhjumispunkt  $x \in X$ . Näitame, et  $x \in \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$ .

Olgu  $U \in \mathfrak{B}_x$  ja  $S_0 \in \Omega$  suvalised. Kuna  $x$  on pere  $(x_S)_{S \in \Omega}$  kuhjumispunkt, siis leidub  $S_1 \in \Omega$  omadusega  $S_1 \geq S_0$  ja  $x_{S_1} \in U$ . Samal ajal  $x_{S_1} \in S_1$ , mistõttu  $x_{S_1} \in U \cap S_0$ . Niisiis,  $U \cap S_0 \neq \emptyset$  iga  $U \in \mathfrak{B}_x$  korral, s.t.  $x \in \overline{S_0} = S_0$ . Kuna  $S_0 \in \Omega$  oli suvaliselt valitud, siis  $x \in \bigcap_{S \in \Omega} S = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$ . Seega on suvaliselt valitud kinnistest alamhulkadest tsentreeritud süsteemi  $\mathcal{F}$  ühisosa mittetühi hulk, s.t.  $X$  on kompaktne.

Implikatsioon (b)  $\Rightarrow$  (d) järeltub vahetult lausest 1.6 (kontrollida!)  $\blacksquare$ , (d)  $\Rightarrow$  (c) aga lausest 1.4. Teoreem on tõestatud. ■

$$\forall U \in \mathfrak{N}_x \quad U \cap S \neq \emptyset \Leftrightarrow \forall S \in \Omega \quad x \in \overline{S} = S \Rightarrow \forall F \in \mathcal{F} \quad x \in F$$

$$(X, \tau) \times (Y, \sigma)$$

Märgime tõestusesta järgmist lihtsat erijuhtu tundud **Tihhonovi teoreemist**:

- suvalise lõpliku arvu kompaktsete topoloogiliste ruumide korrutis on kompaktne.

**Suhteliselt kompaktsed hulgad.** Edaspidi, kõneldes TR-i  $X$  alamhulgast  $X_0$ , nime-tame teda kompaktseks, kui  $(X_0, \tau_0)$  on kompaktne TR ( $\tau_0$  on alamruumi topoloogia). Alam-hulka  $X_0$  nimetame *suhteliselt kompaktseks*, kui  $\overline{X_0}$  on kompaktne alamhulk.

Esitame mõned lihtsalt kontrollitavad **kompaktsusega seotud omadused**:

- kompaktse topoloogilise ruumi kinnine alamruum on kompaktne,
- eralduva topoloogilise ruumi kompaktne alamruum on kinnine,
- kui  $f$  on pidev kujutus TR-st  $X$  TR-i  $Y$ , siis iga kompaktse alamruumi  $X_0$  puhul on  $f(X_0)$  kompaktne alamruum ruumis  $Y$ .

## 2 Topoloogilised vektorruumid

$\mathbb{C}$   $\mathbb{R}^n$   $\mathbb{R}$

### 2.1 Topoloogilise vektorruumi mõiste

//

**Vektorruumi tehted.** Olgu  $X$  vektorruum üle korpuuse  $\mathbb{K}$ . Tema tehted on defineeritud kujutustena

$$\begin{aligned} T: X \times X &\rightarrow X, \quad (x, y) \mapsto x + y \text{ (liitmine)}, \\ S: \mathbb{K} \times X &\rightarrow X, \quad (\lambda, x) \mapsto \lambda x \text{ (skalaariga korrutamine)}, \end{aligned}$$

kus  $X \times X$  ning  $\mathbb{K} \times X$  on vastavad otsekorrutised. Kui vektoruumis  $X$  on määratud mingi topoloogia  $\tau$ , siis korrutisruumis  $X \times X$  on defineeritud vastav korrutistopolooogia  $\tau_{X \times X}$  (vt. art. 1.1). Edasi, korpuses  $\mathbb{K}$  on määratud tema loomulik topoloogia, seega on ka otsekorrutis  $\mathbb{K} \times X$  varustatud korrutistopolooogiaga  $\tau_{\mathbb{K} \times X}$ .

**Topoloogiline vektorruum. Definitsioon.** *Topoloogiliseks vektorruumiks* ehk lineaarseks topoloogiliseks ruumiks nimetatakse niisugust vektorruumi  $X$ , milles on määratud selline topoloogia  $\tau$ , et vektorruumi tehted

$$T: (X \times X, \tau_{X \times X}) \rightarrow (X, \tau) \text{ ja } S: (\mathbb{K} \times X, \tau_{\mathbb{K} \times X}) \rightarrow (X, \tau)$$

on pidevad.

Niisiis on topoloogiline vektorruum (*edaspidi lühidalt TVR*) selline hulk, milles on määratud kaks struktuuri: 1) algebraline, s.o. vektorruumi struktuur, ja 2) topoloogia, kusjuures nende struktuuride kooskõla tagatakse nõudega tehete pidevusest. Korrutistopolooogia definitsioonist lähtudes (vt. art. 1.1) kirjeldame kujutuste  $T$  ja  $S$  pidevust täpsemalt.

**Liitmise pidevuseks** saame järgmise tarviliku ja piisava tingimuse (kontrollida!):

$$\forall x \in X \forall y \in X \forall W \in \mathcal{B}_{x+y} \exists U \in \mathcal{B}_x \exists V \in \mathcal{B}_y : U + V \subset W. \quad (2.1)$$

*Skalaariga korrutamise pidevuse* tingimuse leidmiseks peame silmas, et TR-s  $\mathbb{K}$  moodustavad punkti  $\lambda \in \mathbb{K}$  ümbruste baasi hulgad

$$U_\delta := \{\mu \in \mathbb{K} \mid |\mu - \lambda| \leq \delta\} \quad (\delta > 0). \quad \approx \bar{B}(x, \delta) \quad \boxed{[m-\delta, m+\delta]}$$

Seega on skalaariga korrutamine pidev parajasti siis, kui

$$\forall x \in X \forall \lambda \in \mathbb{K} \forall W \in \mathcal{B}_{\lambda x} \exists V \in \mathcal{B}_x \exists \delta > 0 : |\mu - \lambda| \leq \delta \Rightarrow \mu V \subset W \quad (2.2)$$

(kontrollida!).

$$\bar{B}(x, \delta) \cdot V \subset W$$

**Nihe ja homoteetia TVR-s.** Järgnevalt vaatleme kahte spetsiifiliste kujutuste klassi, mis edaspidistes aruteludes mängivad tähtsat rolli. Olgu  $X$  TVR ning oltu  $x_0 \in X$  ja  $\lambda_0 \in \mathbb{K}$  fikseeritud elemendid, seejuures eeldame, et  $\lambda_0 \neq 0$ . Defineerime kujutused

$$\begin{aligned} T_{x_0}: X &\rightarrow X, \quad x \mapsto x + x_0 \text{ (nihe)}, \\ S_{\lambda_0}: X &\rightarrow X, \quad x \mapsto \lambda_0 x \text{ (homoteetia)}. \end{aligned}$$

Nende kujutuste pidevus tuleneb otseselt kujutuste  $T$  ja  $S$  pidevusest. **Nihke  $T_{x_0}$  pidevuse kontrollimiseks** vabalt valitud punktis  $x \in X$  võtame suvalise  $W \in \mathfrak{B}_{x+x_0}$  ja leiame vastavalt tingimusele (2.1) ümbrused  $U \in \mathfrak{B}_x$  ja  $V \in \mathfrak{B}_{x_0}$  omadusega  $U + V \subset W$ . Siis  $T_{x_0}(U) = U + x_0 \subset U + V \subset W$ , seega on kujutus  $T_{x_0}$  punktis  $x$  pidev. Analoogiliselt tõestatakse seose (2.2) abil homoteetia  $S_{\lambda_0}$  pidevus (vt. ülesanne 2.1)  $\blacksquare$ .

Mõlemad vaadeldavad kujutused on **pööratavad**, kusjuures

$$T_{x_0}^{-1} = T_{-x_0} \text{ ja } S_{\lambda_0}^{-1} = S_{1/\lambda_0}.$$

Tõepoolest, iga  $x \in X$  puhul

$$\begin{aligned} T_{x_0} \circ T_{-x_0}(x) &= T_{x_0}(x - x_0) = x - x_0 + x_0 = x, \\ T_{-x_0} \circ T_{x_0}(x) &= T_{-x_0}(x + x_0) = x + x_0 - x_0 = x, \end{aligned}$$

niisiis  $T_{x_0} \circ T_{-x_0} = T_{-x_0} \circ T_{x_0} = i_X$  (ühikkujutus vektorruumis  $X$ ). See tähendabki, et  $T_{-x_0}$  on kujutuse  $T_{x_0}$  pöördkujutus. Samamoodi veendutakse, et  $S_{\lambda_0}^{-1} = S_{1/\lambda_0}$  (kontrollida!)  $\blacksquare$ .

Kuna pöördkujutused  $T_{x_0}^{-1}$  ja  $S_{\lambda_0}^{-1}$  kui vastavalt nihe ja homoteetia on samuti pidevad, siis on iga lahtise (kinnise) hulga  $G \subset X$  puhul kujutishulgad

$$T_{x_0}(G) = x_0 + G = G - (-x_0) = T_{-x_0}(G)$$

ja

$$S_{\lambda_0}(G) = \lambda_0 G = \frac{1}{1/\lambda_0} G = S_{1/\lambda_0}^{-1}(G)$$

kui lahtise (kinnise) hulga originaalid pidevate kujutuste  $T_{x_0}^{-1}$  ja  $S_{\lambda_0}^{-1}$  suhtes lahtised (kinnised). Kokkuvõttes oleme tõestanud järgmise väite.

**Lause 2.1.** Kui  $G$  on lahtine (kinnine) alamhulk TVR-s  $X$ , siis ka hulgad  $x + G$ ,  $\lambda G$  ja  $\lambda G + x$  on iga  $x \in X$  ja  $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$  puhul lahtised (kinnised).

**Ülesanne 2.1.** Tõestada, et homoteetia  $S_{\lambda_0}$  on pidev.

**Ülesanne 2.2.** Veenduda, et  $S_{\lambda_0}^{-1} = S_{1/\lambda_0}$ .

**TVR-i nullüümbruste baas.** Nagu me eelmises peatükis märkisime (vrd. teoreem 1.1), on üheks topoloogia määramise võimaluseks defineerida iga punkti jaoks tema üümbruste baas. Topoloogilise vektorruumi oluline eelis teiste topoloogiliste ruumide ees on selles, et piisab defineerida vaid nullpunktüümbruste baas, sellega on määratud üümbruste baas kõigil ülejäänud punktidel. Nullpunktüümbrusi nimetame edaspidi **nullüümbrusteks**.

Kehtib järgmine lause.

$$\omega = \omega_0 \times \text{nullüümbruste füüs} \Leftrightarrow x + \omega = \omega_x$$

**Lause 2.2.** Kui  $\mathfrak{B}$  on nullüümbruste baas TVR-s  $(X, \tau)$ , siis moodustavad hulgad  $x + U$ , kus  $U \in \mathfrak{B}$  punkti  $x \in X$  üümbruste baasi.

$$\{x + U \mid U \in \mathfrak{B}\}$$

**Tõestus.** Kõigepealt märgime, et  $x + U$  on punkti  $x$  üümbrus iga  $U \in \mathfrak{B}$  korral. Tõepoolest, et  $U$  on punkti 0 üümbrus, leidub  $G \in \tau$  omadusega  $0 \in G \subset U$ , mistõttu  $x \in x + G \subset x + U$ . Lause 2.1 kohaselt  $x + G \in \tau$ , seega  $x + U$  on punkti  $x$  üümbrus.

Näitame nüüd, et  $\mathfrak{B}_x := \{x + U \mid U \in \mathfrak{B}\}$  on punkti  $x$  üümbruste baas. Kui  $V$  on selle punkti suvaline üümbrus, siis  $x \in C \subset V$  mängi  $C \in \tau$  puhul. Seejuures järeltub seostest

$$x = x + 0 \in x + C \subset x + U$$

$$x + (-x + V) \subseteq V \in \mathfrak{N}_x \Leftrightarrow -x + V \in \mathfrak{N}_{x-x} = \mathfrak{N}_0$$

$0 = -x + x \in -x + C \subset -x + V$  ja  $-x + C \in \tau$ , et  $-x + V$  on nulliumbrus, mistõttu leidub  $U \in \mathfrak{B}$  omadusega  $U \subset -x + V$  ehk  $x + U \subset V$ . ■

**Lepime siinkohal kokku** tähistada (ilmata seda iga kord spetsiaalselt mainimata) järgnevas nulliumbruste baasi gooti tähega  $\mathfrak{B}$ .

Lausetest 2.1 ja 2.2 saame lihtsalt järgmised väited, mis jätame lugejale kontrollida:

- kui  $V$  on nulliumbrus  $TVR$ -s  $X$ , siis ka  $\lambda V$  on nulliumbrus iga  $\lambda \neq 0$  korral (tõestada!)☒,
- kui  $V_1, \dots, V_n$  on nulliumbrused, siis ka  $V_1 \cap \dots \cap V_n$  on nulliumbrus (tõestada!)☒,
- elementide pere  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Gamma}$  koondub piirväärtuseks  $x$   $TVR$ -s  $X$  parajasti siis, kui  $x_\alpha - x \rightarrow 0$  (tõestada!)☒,
- punkt  $x \in X$  on alamhulga  $E$  puutepunkt parajasti siis, kui tema kõik ümbrused  $x + U$  ( $U \in \mathfrak{B}$ ) lõikavad hulka  $E$  (tõestada!)☒,
- lineaarne kujutus  $A$   $TVR$ -st  $X$   $TVR$ -i  $Z$  on pidev parajasti siis, kui ta on pidev nulpunktis (tõestada!)☒.

Nagu iga teise matemaatilise struktuuri puhul kõneldakse ka topoloogiliste vektorruumide puhul nende **isomorfismist**.  $TVR$ -e  $X$  ja  $Z$  nimetatakse *isomorfseteks*, kui leidub selline bijektiivne lineaarne kujutus  $T: X \rightarrow Z$ , mis on pidev ja mille pöördkujutus  $T^{-1}$  on samuti pidev. Seega on isomorfism pidev ja samal ajal lahtine kujutus, s.t. iga lahtise hulga  $G \subset X$  korral on  $T(G) \subset Z$  lahtine (veenduda!)☒.

## 2.2 Vektorruumide topologiseerimise põhiteoreem

Lisaks topoloogiliste vektorruumide sellele eelisele tavaliste topoloogiliste ruumide ees, mida kirjeldab lause 2.2, on veel teine oluline eelis. See väljendub võimaluses komplekteerida nulliumbruste baas hulkadest, mis on vektorruumi vahenditega lihtsalt kirjeldatavad.

**Neelavad ja tasakaalus alamhulgad. Definitsioon.** Öeldakse, et vektorruumi  $X$  mittetühi alamhulk  $E$  neelab hulga  $A \subset X$ , kui leidub selline  $\delta > 0$ , et

$$|\mu| \leq \delta \Rightarrow \mu A \subset E. \quad A \subset \bigcup_{\mu} E \quad | \quad \overline{B(0, \delta)} \cdot A \subset E$$

Alamhulka  $E$  nimetatakse *neelavaks*, kui ta neelab iga ühe-elemendilise hulga  $\{x\}$ , kus  $x \in X$ .

**Definitsioon.** Öeldakse, et vektorruumi  $X$  alamhulk  $E$  on *tasakaalus*, kui kas  $E = \emptyset$  või  $\lambda E \subset E$  iga  $\lambda \in \mathbb{K}$  korral, mis rahuldab tingimust  $|\lambda| \leq 1$ .

$$\overline{B(0, 1)} \cdot E \subset E$$

Märgime mõned definitsioonidest **vahetult järelduvad väited**:  $\overline{\{E=1, E\}}$

- mittetühi tasakaalus hulk  $E$  sisaldab nullelementi ja on sümmeetiline (tõestada!)☒,
- tasakaalus hulkade ühisosa on tasakaalus (tõestada!)☒,
- kui  $E_1, \dots, E_n$  on tasakaalus hulgad, siis ka  $E_1 + \dots + E_n$  on tasakaalus (tõestada!)☒,
- lõpliku arvu neelavate hulkade ühisosa on neelav (tõestada!)☒,
- kui  $E$  on tasakaalus hulk, siis  $\alpha E$  on tasakaalus iga  $\alpha \in \mathbb{K}$  korral (tõestada!)☒,
- kui  $E$  on neelav hulk, siis  $\alpha E$  on neelav iga  $\alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$  korral (tõestada!)☒,
- tasakaalus hulk  $E$  on neelav parajasti siis, kui iga  $x \in X$  korral leidub selline  $\delta > 0$ , et  $\delta x \in E$  (tõestada!)☒.

Rõhutame, et nii alamhulga neelavus kui ka tasakaalustatus on *algebraised* mõisted. Nende tähtsus topoloogiliste vektorruumide jaoks selgub järgmisest lausest.

$$U \in \mathcal{W}$$

$$\forall x \in X \exists \delta$$

$$\overline{B}(0, \delta) \{x\} \subset U$$

- Lause 2.3.** (a) TVR-i  $X$  iga nulliumbrus on neelav hulk.  
 (b) TVR-i  $X$  iga nulliumbrus sisaldab tasakaalus nulliumbrust.

**Tõestus.** Olgu  $U$  nulliumbrus TVR-s  $X$  ja olgu  $x \in X$ . Tänu seosele  $0x = 0$  ja skalaariga korrutamise pidevusele leiduvad punkti  $x$  ümbrus  $V$  ja  $\delta > 0$ , et kehtib implikatsioon

$$|\mu| \leq \delta \Rightarrow \mu V \subset U$$

$$\forall \mu \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \exists V \in \mathcal{W}_x \\ \overline{B}(0, \delta) \cdot \overline{B}(0, \delta) \cdot V \subset U,$$

(vrd. (2.2)). Väite (a) tõestuseks märgime, et kuna  $x \in V$ , siis  $\mu x \in U$  iga skalaari  $\mu$  korral, mis rahuldab tingimust  $|\mu| \leq \delta$ , s.t.  $U$  on neelav hulk.

Väite (b) kontrollimiseks rakendame seost (2.3) juhul  $x = 0$ . Sellele vastavalt leiame suvalise nulliumbruse  $U$  puhul nulliumbruse  $V$  ning moodustame hulga  $W := \bigcup \{\mu V \mid |\mu| \leq \delta\}$ . Seosest (2.3) tuleneb vahetult, et  $W \subset U$ . Seejuures on  $W$  nulliumbrus, kuna ta sisaldab nulliumbrust  $\delta V$ . Jääb veenduda, et  $W$  on tasakaalus hulk. Tõepoolest, iga  $x \in W$  on esitav kujul  $x = \mu u$ , kus  $|\mu| \leq \delta$  ning  $u \in V$ , ja kui  $|\alpha| \leq 1$ , siis  $|\alpha \mu| \leq |\mu| \leq \delta$ , mistõttu  $\alpha x = \alpha \mu u \in W$ . ■

$$\overline{B}(0, \delta) \cdot V \subset U$$

**Järeldus 2.4.** Igas TVR-s on tasakaalus neelavatest hulkadest koosnev nulliumbruste baas.

**Tõestus.** See järeltub vahetult lausest 2.3. ■

Järgnevalt tööstame selle peatüki **põhitulemuse**, mis kirjeldab vektorruumide topologiseerimist.

$$(\overline{B}(0,1) \cdot \overline{B}(0, \delta)) \cdot V \subset \overline{B}(0, \delta) \cdot V$$

**Teoreem 2.5.** Igas TVR-s  $X$  leidub nulliumbruste baas  $\mathfrak{B}$  järgmiste omadustega:

(NB1) suvaliste  $V_1, V_2 \in \mathfrak{B}$  korral leidub selline  $V \in \mathfrak{B}$ , et  $V \subset V_1 \cap V_2$ ,

$$\overline{B}(0,1) \cdot \overline{B}(0, \delta) \cdot V \subset \overline{B}(0, \delta) \cdot V$$

(NB2) iga  $V \in \mathfrak{B}$  on tasakaalus,

(NB3) iga  $V \in \mathfrak{B}$  on neelav,

(NB4) iga  $V \in \mathfrak{B}$  korral leidub  $U \in \mathfrak{B}$  omadusega  $U + U \subset V$ .

Vastupidi, kui vektorruumis  $X$  on määratud mittetühi alamhulkade süsteem  $\mathfrak{B}$  omadustega

(NB1) - (NB4), siis  $X$  on TVR, milles punkti  $x \in X$  ümbruste baasiks on

$$\mathfrak{B}_x := \{x + V \mid V \in \mathfrak{B}\}.$$

**Tõestus. Tarvilikkus.** Olgu  $\mathfrak{B}$  TVR-i  $X$  kõigi tasakaalus nulliumbruste süsteem. Järelduse 2.4 põhjal on  $\mathfrak{B}$  nulliumbruste baas, samuti on selge, et tingimused (NB2) ja (NB3) on rahuldatud. Kuna tasakaalus hulkade ühisosa on tasakaalus ja antud punkti kahe ümbruse ühisosa on samuti selle punkti ümbrus, siis kehtib (NB1). Tingimus (NB4) tuleneb liitmise pidevusest: kuna  $0+0=0$ , siis iga  $V \in \mathfrak{B}$  puhul leiduvad  $U_1, U_2 \in \mathfrak{B}$  omadusega  $U_1 + U_2 \subset V$  (vrd. (2.1)), ja tingimuse (NB1) kohaselt saame valida  $U \in \mathfrak{B}$  nii, et  $U \subset U_1 \cap U_2$ , seega  $U + U \subset V$ .

**Piisavus.** Olgu vektorruumis  $X$  fikseeritud selline alamhulkade süsteem  $\mathfrak{B}$ , mis rahuldab tingimusi (NB1) - (NB4). Näitame kõigepealt, et  $X$  on TR, kus  $\mathfrak{B}_x := \{x + V \mid V \in \mathfrak{B}\}$  on punkti  $x \in X$  ümbruste baas. Teiste sõnadega, peame veenduma, et  $\mathfrak{B}_x$  rahuldab teoreemi 1.1 tingimusi (B1) - (B3).

Esiteks, kuna  $V \in \mathfrak{B}$  on tasakaalus hulk, siis  $0 \in V$  ja seega  $x = x + 0 \in x + V$  iga  $V \in \mathfrak{B}$  korral. Teiseks, kui  $V_1, V_2 \in \mathfrak{B}$  on suvalised ning  $V \in \mathfrak{B}$  on selline, et  $V \subset V_1 \cap V_2$  (vrd. (NB1)), siis  $x + V \subset x + V_1 \cap V_2 \subset (x + V_1) \cap (x + V_2)$ .

Kolmandaks peame näitama, et iga  $x \in X$  ja  $W \in \mathfrak{B}_x$  puhul leidub selline  $W' \in \mathfrak{B}_x$ , et  $W' \subset W$  ja suvalise  $y \in W'$  jaoks leidub  $Q \in \mathfrak{B}_y$  omadusega  $Q \subset W$ . Olgu  $x \in X$  suvaline ja  $W := x + V \in \mathfrak{B}_x$ , kus  $V \in \mathfrak{B}$ . Vastavalt tingimusele (**NB4**) valime  $U \in \mathfrak{B}$  omadusega  $U + U \subset V$  ja võtame  $W' = x + U$ . Siis  $W' = x + 0 + U \subset x + U + U \subset x + V$ , s.t.  $W' \subset W$ . Kui  $y \in x + U$ , siis  $Q := y + U \subset x + U + U \subset x + V = W$ .

Niisiis on vektorruum  $X$  TR, näitame, et *vektorruumi tehted on pidevad*.

*Liitmise pidevus* tuleneb vahetult tingimusest (**NB4**): suvalise  $W := x + y + V \in \mathfrak{B}_{x+y}$  korral, kus  $x, y \in X$  ning  $V \in \mathfrak{B}$ , valime  $U \in \mathfrak{B}$  omadusega  $U + U \subset V$  ja tähistame  $U_1 := x + U$  ja  $U_2 := y + U$ , seejuures  $U_1 \in \mathfrak{B}_x$ ,  $U_2 \in \mathfrak{B}_y$  ning  $U_1 + U_2 \subset x + y + V = W$ . Vastavalt seosele (2.1) tähendab see liitmise pidevust.

*Skalaariga korrutamise pidevuse* kontrollimiseks tõestame kõigepealt järgmise väite:

$$(*) \quad \forall U \in \mathfrak{B} \quad \forall \lambda_0 \in \mathbb{K} \quad \exists U_0 \in \mathfrak{B} : \lambda_0 U_0 \subset U.$$

Olgu  $U \in \mathfrak{B}$  ja  $\lambda_0 \in \mathbb{K}$  suvalised. Peame silmas, et iga  $E \subset X$  korral kehtib seos  $2E \subset E + E$ , seetõttu saame tänu tingimusele (**NB4**) leida  $V^{(1)} \in \mathfrak{B}$  omadusega

$$2V^{(1)} \subset V^{(1)} + V^{(1)} \subset U.$$

Edasi leiame  $V^{(2)} \in \mathfrak{B}$ , et

$$2V^{(2)} \subset V^{(2)} + V^{(2)} \subset V^{(1)}, \text{ siis } 2^2V^{(2)} \subset 2V^{(1)} \subset U$$

jne. Üldiselt võime iga  $n \in \mathbb{N}$  korral valida  $V^{(n)} \in \mathfrak{B}$  omadusega

$$2^n V^{(n)} \subset U.$$

Fikseerime  $n \in \mathbb{N}$  nii, et  $|\lambda_0| \leq 2^n$ , ja tähistame  $U_0 := V^{(n)}$ . Hulga  $U$  tasakaalustatuse tõttu

$$\lambda_0 U_0 = \frac{\lambda_0}{2^n} 2^n V^{(n)} \subset \frac{\lambda_0}{2^n} U \subset U.$$

Väide (\*) on tõestatud.

Võtame nüüd suvalised  $x_0 \in X$  ja  $\lambda_0 \in \mathbb{K}$ , olgu  $W := \lambda_0 x_0 + V$  punkti  $\lambda_0 x_0$  ümbrus, kus  $V \in \mathfrak{B}$ . Meie eesmärgiks on näidata, et leiduvad  $\delta > 0$  ja  $Q = x_0 + U_0 \in \mathfrak{B}_{x_0}$  omadusega

$$|\lambda - \lambda_0| \leq \delta \Rightarrow \lambda Q \subset W.$$

Vastavalt tingimusele (**NB4**) leiame nulliumbruse  $U \in \mathfrak{B}$ , et  $U + U + U \subset V$ . Rakendame väidet (\*) ja fikseerime  $U_0 \in \mathfrak{B}$  omadusega  $\lambda_0 U_0 \subset U$ . Seejuures võime eeldada, et

$$U_0 \subset U$$

(vajaduse korral võtame nulliumbruse  $U_0$  asemel  $U_1 \in \mathfrak{B}$  omadusega  $U_1 \subset U_0 \cap U$ , siis  $\lambda_0 U_1 \subset \lambda_0 U_0 \subset U$ ). Edasi, kuna  $U$  on neelav hulk, siis saab valida  $\delta \in (0, 1]$  nii, et

$$|\mu| \leq \delta \Rightarrow \mu x_0 \in U. \tag{2.4}$$

Olgu  $\lambda \in \mathbb{K}$  suvaline arv omadusega  $|\lambda - \lambda_0| \leq \delta$  ja olgu  $x$  element punkti  $x_0$  ümbrusest  $x_0 + U_0$ . Kuna  $x - x_0 \in U_0 \subset U$  ja  $|\lambda - \lambda_0| \leq 1$ , siis hulga  $U$  tasakaalustatuse tõttu

$$(\lambda - \lambda_0)(x - x_0) \in (\lambda - \lambda_0)U \subset U.$$

Tänu eeldusele  $|\lambda - \lambda_0| \leq \delta$  kehtib (vrd. (2.4))  $(\lambda - \lambda_0)x_0 \in U$  ja seose  $x - x_0 \in U_0$  tõttu

$$\lambda_0(x - x_0) \in \lambda_0 U_0 \subset U.$$

Kokkuvõttes,

$$\begin{aligned} \lambda x - \lambda_0 x_0 &= (\lambda - \lambda_0)(x - x_0) + (\lambda - \lambda_0)x_0 + \lambda_0(x - x_0) \\ &\subset U + U + U \subset V. \end{aligned}$$

Niisiis,

$$\forall W := \lambda_0 x_0 + V \in \mathfrak{B}_{\lambda_0 x_0} \exists Q := x_0 + U_0 \exists \delta > 0 : |\lambda - \lambda_0| \leq \delta \Rightarrow \lambda Q \subset W,$$

seega on skalaariga korrutamine TVR-s  $X$  pidev iga  $x_0 \in X$  ja  $\lambda_0 \in \mathbb{K}$  korral (vrd. (2.2)). Teoreem on töestatud. ■

Nulliumbruste baasi moodustamiseks on veel teisigi võimalusi. Ilmne on, et selle saab alati moodustada lahtistest alamhulkadest (põhjendada!)☒. Teisalt kehtib järgmine väide.

**Lause 2.6.** *Igas TVR-s on kinnitest taskaalus nulliumbrustest koosnev baas.*

**Tõestus.** Olgu  $\mathfrak{B}$  TVR-i  $X$  nulliumbruste baas omadustega (**NB1**) - (**NB4**). Tähistame  $\mathfrak{B}_1 := \{\bar{V} \mid V \in \mathfrak{B}\}$ . Allpool ülesandes 2.3 sõnastatud väite kohaselt on süsteemi  $\mathfrak{B}_1$  elemendid kinnised tasakaalus hulgad, jääb üle veenduda, et ta on nulliumbruste baas. Kahtlemata on  $\bar{V}$  iga  $V \in \mathfrak{B}$  korral nulliumbrus. Valime suvalise nulliumbruse  $W \subset X$  puhul sellise  $V \in \mathfrak{B}$ , et  $V \subset W$ . Tingimuse (**NB4**) põhjal saab leida  $U \in \mathfrak{B}$  omadusega  $U + U \subset V$ . Näitame, et  $\bar{U} \subset W$ . Olgu  $x \in \bar{U}$ , siis  $U \cap (x + U) \neq \emptyset$ , mistõttu leidub  $z \in U \cap (x + U)$ . Seega  $z = x + u$ ,  $u \in U$  ja  $z \in U$ , järelikult  $x = z - u \in U - U = U + U \subset V \subset W$ . Niisiis, iga nulliumbruse  $W$  jaoks saab leida sellise  $\bar{U} \in \mathfrak{B}_1$ , et  $\bar{U} \subset W$ , s.t.  $\mathfrak{B}_1$  on nulliumbruste baas TVR-s  $X$ . ■

**Ülesanne 2.3.** Tõestada, et tasakaalus hulga sulund TVR-s on tasakaalus hulk.

**Ülesanne 2.4.** Tõestada, et vektoralamruumi sulund TVR-s on vektoralamruum.

Nagu näitab järgmine lause, saab nulliumbruste baasi abil lihtsalt kirjeldada **topoloogilise vektorruumi eralduvust**.

**Lause 2.7.** *TVR-i  $X$  puhul on järgmised väited samaväärsed:*

- (a)  *$X$  on eralduv,*
- (b) *iga nulliumbruste baasi  $\mathfrak{B}$  korral kehtib seos*

$$\bigcap \{V \mid V \in \mathfrak{B}\} = \{0\}; \quad (2.5)$$

- (c) *leidub nulliumbruste baas  $\mathfrak{B}$  omadusega (2.5).*

**Tõestus.** (a)  $\Rightarrow$  (b) Kui  $X$  on eralduv ja  $x \in X \setminus \{0\}$ , siis suvalise nulliumbruste baasi  $\mathfrak{B}$  korral leiduvad sellised  $U, W \in \mathfrak{B}$ , et  $U \cap (x + W) = \emptyset$ . Tähendab,  $x \notin U$ , mistõttu  $x \notin \bigcap \{V \mid V \in \mathfrak{B}\}$ . Seega kehtib seos (2.5).

(b)  $\Rightarrow$  (c) on ilmne.

(c)  $\Rightarrow$  (a) Olgu  $\mathfrak{B}$  TVR-i  $X$  nulliumbruste baas omadusega (2.5), teoreemi 2.5 kohaselt võime eeldada, et  $\mathfrak{B}$  rahuldab tingimusi **(NB1)** - **(NB4)**. Kui  $x, y \in X$  ning  $x \neq y$ , siis  $x - y \notin \{V \mid V \in \mathfrak{B}\}$ , seega leidub  $W \in \mathfrak{B}$ , et  $x - y \notin W$ . Rakendame tingimust **(NB4)** ja leiame  $U \in \mathfrak{B}$  omadusega  $U + U \subset W$ . Osutub, et  $(x + U) \cap (y + U) = \emptyset$ : kui leiduks  $z \in (x + U) \cap (y + U)$ , siis  $x - y = (z - y) - (z - x) \in U - U = U + U \subset W$ , mis oleks vastuolus nulliumbruse  $W$  valikuga. ■

Me piirdume siin vaid ühe lihtsa näitega topoloogiliste vektorruumide kohta. Keerulisemaid näiteid vaatleme järgnevates peatükkides.

**Näide 2.1.** Lihtne on veenduda, et iga normeeritud ruum  $(X, \| \cdot \|)$  on TVR. Olgu  $B$  selle ruumi ühikkera, s.t.  $B := \{x \in X \mid \|x\| \leq 1\}$ . Vahetu kontroll näitab, et alamhulkade süsteem

$$\mathfrak{B} := \left\{ \frac{1}{n} B \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$

rahuldab tingimusi **(NB1)** - **(NB4)**. Teoreemi 2.5 kohaselt on  $X$  TVR.

### 3 Tõkestatud ja kompaktsed alamhulgad topoloogilises vektorruumis

#### 3.1 Tõkestatud ja täielikult tõkestatud alamhulgad

**Tõkestatud hulgad TVR-s.** Meenutame, et normeeritud ruumis  $(X, \|\cdot\|)$  nimetatakse tõkestatuks alamhulka, milles norm on tõkestatud. Teiste sõnadega, alamhulk  $E \subset X$  on tõkestatud parajasti siis, kui leidub mingi arv  $M > 0$ , et  $E \subset MB$  (ehk  $\frac{1}{M}E \subset B$ ), kus  $B$  on ühikkera. Niisiis on tõkestatud parajasti need alamhulgad, mis on neelatavad ühikkera poolt (vrd. art. 2.2). Lähtudes sellest ja pidades silmas, et hulgad  $\lambda B$ , kus  $\lambda > 0$ , moodustavad nulliumbruse baasi normeeritud ruumis  $X$  (vrd. näide 2.1), defineerime järgnevalt tõkestatud hulgad topoloogilises vektorruumis.

**Definitsioon.** TVR-i  $X$  alamhulka  $E$  nimetatakse *tõkestatuks*, kui ta on neelatav iga nulliumbruse poolt ruumis  $X$ .

Lihtne on veenduda, et alamhulk  $E \subset X$  on TVR-s  $X$  parajasti siis tõkestatud, kui ta on neelatav nulliumbruse baasi iga elemendi poolt, s.t. kui

$$\forall U \in \mathfrak{B} \exists \delta > 0 : |\mu| \leq \delta \Rightarrow \mu E \subset U \quad (3.1)$$

(kontrollida!)  $\blacksquare$ . Kui baas  $\mathfrak{B}$  koosneb tasakaalus nulliumbrustest (teoreemi 2.5 põhjal selline baas leidub), siis võib tingimuse (3.1) asendada lihtsama tingimusega

$$\forall U \in \mathfrak{B} \exists \mu > 0 : \mu E \subset U \quad (3.2)$$

(põhjendada!)  $\blacksquare$ .

**Täielikult tõkestatud hulgad. Definitsioon.** TVR-i  $X$  alamhulka  $E$  nimetatakse *täielikult tõkestatuks* ehk *prekompaktseks*, kui iga nulliumbruse  $U$  korral leidub selline *lõplik* alamhulk  $E_0 \subset X$ , et  $E \subset E_0 + U$ .

Nii nagu tõkestatud hulkade defineerimisel, võime ka selles definitsioonis piirduda *nulliumbrustega baasist*. Niisiis, alamhulk  $E$  on täielikult tõkestatud TVR-s  $X$  parajasti siis, kui

$$\forall U \in \mathfrak{B} \exists n \in \mathbb{N} \exists \{x_1, \dots, x_n\} \subset X : E \subset \bigcup_{k=1}^n (x_k + U).$$

Tähelepanuväärsne on, et täieliku tõkestatuse definitsioonis võime vajaduse korral eeldada, et  $E_0 \subset E$ . Kontrollime seda väidet.

Olgu  $V \in \mathfrak{B}$  suvaline ja  $U \in \mathfrak{B}$  omadusega  $U + U \subset V$ . Kui  $E \subset X$  on täielikult tõkestatud, siis leidub definitsiooni kohaselt selline  $\{x_1, \dots, x_n\} \subset X$ , et  $E \subset \bigcup_{k=1}^n (x_k + U)$ .

Seejuures võime eeldada, et  $(x_k + U) \cap E \neq \emptyset$  iga  $k = 1, \dots, n$  korral, olgu  $z_k \in (x_k + U) \cap E$ . Kuna  $z_k \in x_k + U$ , siis  $x_k - z_k \in U$  ning

$$z_k + V \supset z_k + U + U \supset z_k + x_k - z_k + U = x_k + U \quad (k = 1, \dots, n),$$

mistõttu  $E \subset \bigcup_{k=1}^n (z_k + V)$ , kus  $E_0 := \{z_1, \dots, z_n\} \subset E$ .

Veendume, et iga täielikult tõkestatud hulk  $E \subset X$  on tõkestatud. Olgu  $V \in \mathfrak{B}$ , valime vastavalt tingimusele (**NB4**) nulliumbruse  $U \in \mathfrak{B}$  omadusega  $U+U \subset V$ . Fikseerime lõpliku alamhulga  $E_0 \subset X$  omadusega  $E \subset E_0 + U$ . Kuna  $E_0$  on tõkestatud, siis saame valida  $\delta > 0$  nii, et  $\delta \leq 1$  ja  $\delta E_0 \subset U$ . Seega

$$\delta E \subset \delta E_0 + \delta U \subset U + U \subset V,$$

tähendab,  $E$  on tõkestatud.

Me formuleerime järgnevalt rea definitsioonidest **vahetult tulenevaid fakte**:

- iga lõplik alamhulk on täielikult tõkestatud (ja seega tõkestatud) (tõestada!)☒,
- (täielikult) tõkestatud alamhulga alamhulk on (täielikult) tõkestatud (tõestada!)☒,
- lõpliku arvu (täielikult) tõkestatud alamhulkade ühend on (täielikult) tõkestatud (tõestada!)☒,
- kui  $E$  on (täielikult) tõkestatud alamhulk, siis ka  $\alpha E$  on iga  $\alpha \in \mathbb{K}$  korral (täielikult) tõkestatud (tõestada!)☒,
- (täielikult) tõkestatud alamhulkade  $E_1, \dots, E_n$  summa  $E_1 + \dots + E_n$  on (täielikult) tõkestatud (tõestada!)☒.

Lisaks ülaltoodutele tõestame me veel **kaks tähtsat omadust**.

**Lause 3.1.** *Tõkestatud (täielikult tõkestatud) alamhulga  $E \subset X$  sulund  $\overline{E}$  on TVR-s  $X$  tõkestatud (täielikult tõkestatud).*

**Tõestus.** Tõestuseks kasutame sisalduvust  $\lambda \overline{E} \subset \overline{\lambda E}$ , mida on kerge vahetult kontrollida (vt. ülesanne 3.1)☒. Olgu  $\mathfrak{B}$  TVR-i  $X$  nulliumbruste baas, mis koosneb kinnistest tasakaalus hulkadest (vrd. lause 2.6). Kui  $E$  on tõkestatud, siis iga  $U \in \mathfrak{B}$  jaoks leidub  $\mu > 0$  omadusega  $\mu E \subset U$ . Siit saamegi, et  $\mu \overline{E} \subset \overline{\mu E} \subset \overline{U} = U$ , s.t.  $\overline{E}$  on tõkestatud.

Kui  $E$  on täielikult tõkestatud ning  $x_1, \dots, x_n \in X$  on sellised, et  $E \subset \bigcup_{k=1}^n (x_k + U)$ , siis, pidades silmas, et hulgad  $x_k + U$  ja ka nende ühend  $\bigcup_{k=1}^n (x_k + U)$  on kinnised (selgitada!)☒, saame sisalduvuse

$$\overline{E} \subset \overline{\bigcup_{k=1}^n (x_k + U)} = \bigcup_{k=1}^n (x_k + U),$$

s.t.  $\overline{E}$  on täielikult tõkestatud. ■

**Lause 3.2.** *TVR-i  $X$  alamhulk  $E$  on tõkestatud parajasti siis, kui iga selle hulga elementide jada  $(x_n)$  ning suvalise nulliks koonduva arvjada  $(\lambda_n)$  korral  $\lambda_n x_n \rightarrow 0$  ruumis  $X$ .*

**Tõestus.** Tarvilikkus. Olgu  $E \subset X$  tõkestatud alamhulk ja  $\mathfrak{B}$  tasakaalus nulliumbrustest koosnev baas TVR-s  $X$ . Fikseeritud  $V \in \mathfrak{B}$  korral leidub siis  $\lambda > 0$  omadusega  $\lambda E \subset V$ . Nulliks koonduva arvjada  $(\lambda_n)$  jaoks leiame  $N \in \mathbb{N}$  nii, et  $|\lambda_n| \leq \lambda$  iga  $n > N$  puhul. Tänu nulliumbruse  $V$  tasakaalustusele saame suvalise elementide jada  $(x_n)$  korral hulgast  $E$  seose

$$\lambda_n x_n \in \lambda_n E = \frac{\lambda_n}{\lambda} \lambda E \subset \frac{\lambda_n}{\lambda} V \subset V,$$

kui  $n > N$ . Niisiis,  $\lambda_n x_n \rightarrow 0$ .

*Piisavus.* Eeldame, et alamhulk  $E$  rahuldab tingimust

$$[x_n \in E \ (n \in \mathbb{N}), \lambda_n \rightarrow 0] \Rightarrow \lambda_n x_n \rightarrow 0,$$

ja oletame vastuväiteliselt, et  $E$  ei ole tõkestatud. Siis leidub selline (tasakaalus) nullümbur  $U$ , et  $(\lambda E) \setminus U \neq \emptyset$  iga  $\lambda > 0$  korral, muuhulgas kehtib  $E \setminus (nU) \neq \emptyset$  iga  $n \in \mathbb{N}$  korral. Valime  $z_n \in E \setminus (nU)$  ja paneme tähele, et jada  $(\frac{1}{n} z_n)$  ei koondu nulliks TVR-s  $X$  (kontrollida!)  $\blacksquare$ , kuigi  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ . Saime vastuolu eeldusega. ■

**Ülesanne 3.1.** Tõestada, et sisalduvus  $\lambda \overline{E} \subset \overline{\lambda E}$  kehtib TVR-s  $X$  iga alamhulga  $E$  ja  $\lambda \in \mathbb{K}$  korral.

## 3.2 Kompaktsed alamhulgad topoloogilises vektorruumis

Meenutame, et topoloogilise ruumi alamhulk on kompaktne parajasti siis, kui iga selle hulga elementidest moodustatud pere sisaldab osapere, mis koondub selle hulga punktiks. Viimane tingimus on samavärne kõigi selle hulga ultraperede koonduvusega (vt. lause 1.9).

Oma kogemustest meetriliste ruumide teorias teame, et kompaktsus on tihedalt seotud täielikkuse mõistega. Seejuures ei ole täielikkus üldjuhul topoloogia abil kirjeldatav, tema defineerimiseks vajatakse nn. ühtlaste ruumide struktuuri, mis meetrilises ruumis on loomulikul viisil olemas. Saab veenduda, et ka igas topoloogilises vektorruumis on olemas loomulik nihke suhtes invariantne ühtlane struktuur. See võimaldab defineerida täielikud alamhulgad topoloogilises vektorruumis põhimõtteliselt samal viisil, kui meetrilises ruumis.

**Definitsioon.** TVR-i  $X$  elementide peret  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Gamma}$  nimetatakse *Cauchy perek*, kui iga nullüümbruse  $U$  korral leidub selline  $\alpha_0 \in \Gamma$ , et

$$\alpha, \alpha' \geq \alpha_0 \Rightarrow x_\alpha - x_{\alpha'} \in U.$$

Alamhulka  $E \subset X$  nimetatakse *täielikuks*, kui tema elementide iga Cauchy pere koondub selle hulga mingiks elemendiks.

Siinkohal huvitab meid eeskätt täielikkuse seos kompaktsusega. Alustame järgmise lihtsalt tõestatava väitega.

**Lause 3.3.** *Kompaktne alamhulk  $E$  TVR-s  $X$  on täielikult tõkestatud.*

**Tõestus.** Eeldame, et  $E \subset X$  on kompaktne, olgu  $\mathfrak{B}$  ruumi  $X$  selline nullüümbruste baas, mis koosneb lahtistest hulkadest. Fikseerime suvalise  $V \in \mathfrak{B}$  ja moodustame alamhulkade süsteemi  $\{x + V\}_{x \in E}$ , see on hulga  $E$  lahtine kate. Vastavalt kompaktsuse definitsioonile leidub lõplik osakate  $\{x_1 + V, x_2 + V, \dots, x_n + V\}$ . Seega

$$E \subset \bigcup_{k=1}^n (x_k + V),$$

mis tähendabki, et  $E$  on täielikult tõkestatud. ■

**Lause 3.4.** *Kompaktne alamhulk  $E$  TVR-s  $X$  on täielik.*

**Tõestus.** Olgu  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Gamma}$  Cauchy pere kompaktses alamhulgas  $E$  ja olgu  $\mathfrak{B}$  ruumi  $X$  nulliumbruste baas omadustega **(NB1)** - **(NB4)**. Võtame suvalise  $V \in \mathfrak{B}$  ja niisuguse  $U \in \mathfrak{B}$ , et  $U + U \subset V$ . Vastavalt Cauchy pere definitsioonile leidub  $\alpha_0 \in \Gamma$ , et  $x_\alpha - x_{\alpha'} \in U$ , kui  $\alpha, \alpha' \geq \alpha_0$ . Hulga  $E$  kompaktsusest järeltub, et  $(x_\alpha)$  sisaldab koonduva osapere  $(y_\beta)_{\beta \in \Delta}$ , oltu  $x \in E$  selle osapere piirväärtus. Seega saab fikseerida  $\beta_0 \in \Delta$  omadusega

$$\beta \geq \beta_0 \Rightarrow y_\beta - x \in U.$$

Osapere definitsioonist lähtudes võime leida  $\beta_1 \in \Delta$  nii, et

$$\forall \beta' \geq \beta_1 \exists \alpha' \in \Gamma : \alpha' \geq \alpha_0, y_{\beta'} = x_{\alpha'}.$$

Võtame seejuures  $\beta' \geq \beta_0, \beta_1$ , siis  $x_\alpha - x = x_\alpha - x_{\alpha'} + y_{\beta'} - x \in U + U \subset V$ , tähendab,  $x_\alpha \rightarrow x$ . ■

Me leidsime kaks tarvilikku tingimust – täielikkus ja täielik tõkestatus – alamhulga kompaktsuseks TVR-s. Järgnevas on meie eesmärgiks tõestada, et nimetatud tingimused on kompaktsuseks ka piisavad. Selleks vajame me kahte järgnevat lemmat.

**Lemma 3.5.** Olgu  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  ultrapere mingis hulgas  $X$ . Kui  $X = \bigcup_{k=1}^n X_k$ , siis leidub selline  $k_0 \in \{1, \dots, n\}$ , et  $(x_\gamma)$  on põhiliselt hulgas  $X_{k_0}$ .

**Tõestus.** Vastuväiteline oletus

$$\exists \gamma_0 \in \Gamma : \gamma \geq \gamma_0 \Rightarrow x_\gamma \in \bigcap_{k=1}^n (X \setminus X_k)$$

on vastuolus tõsiasjaga

$$\bigcap_{k=1}^n (X \setminus X_k) = X \setminus \bigcup_{k=1}^n X_k = \emptyset$$

(selgitada!) ✕. ■

**Lemma 3.6.** TVR-i  $X$  alamhulk  $E$  on täielikult tõkestatud parajasti siis, kui iga nulliumbruse  $U \in \mathfrak{B}$  korral saab valida sellised  $n \in \mathbb{N}$  ja alamhulgad  $S_1, \dots, S_n \subset E$ , et

$$S_k - S_k \subset U \quad (k = 1, \dots, n) \quad \text{ja} \quad E = \bigcup_{k=1}^n S_k. \quad (3.3)$$

**Tõestus.** Tarvilikkus. Eeldame, et  $E$  on täielikult tõkestatud. Olgu  $U \in \mathfrak{B}$ , leiame  $V \in \mathfrak{B}$  omadusega  $V - V \subset U$ . Vastavalt täieliku tõkestatuse definitsioonile valime sellise lõpliku alamhulga  $\{x_1, \dots, x_n\} \subset E$ , et  $E \subset \bigcup_{k=1}^n (x_k + V)$ , siis

$$(x_k + V) - (x_k + V) = V - V \subset U.$$

Seega, kui  $S_k := (x_k + V) \cap E$  iga  $k = 1, \dots, n$  korral, siis tingimused (3.3) on täidetud.

*Piisavus.* Olgu  $U \in \mathfrak{B}$  fikseeritud, eelduse kohaselt leiduvad  $S_1, \dots, S_n \subset E$  omadustega (3.3), olgu  $S_k \neq \emptyset$ , kui  $k = 1, \dots, n$ . Võtame suvaliselt  $x_k \in S_k$ , siis  $S_k - x_k \subset S_k - S_k \subset U$  ehk  $S_k \subset x_k + U$ , mistõttu

$$E = \bigcup_{k=1}^n S_k \subset \bigcup_{k=1}^n (x_k + U),$$

s.t.  $E$  on täielikult tõkestatud. ■

Järgnevalt tõestame selle artikli põhitulemuse.

**Teoreem 3.7.** *Alamhulk  $E$  TVR-s  $X$  on kompaktne parajasti siis, kui ta on täielikult tõkestatud ja täielik.*

**Tõestus.** Tarvilikkus tuleneb lausetest 3.3 ja 3.4.

*Piisavus.* Olgu  $E$  täielik täielikult tõkestatud alamhulk TVR-s  $X$ , näitame (vrd. lause 1.9), et suvaliselt valitud ultrapere  $(x_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$  hulgas  $E$  on selles hulgas koonduv. Olgu  $U$  suvaline nulliumbrus ruumis  $X$ , lemma 3.6 kohaselt saame leida alamhulgad  $S_1, \dots, S_n$ , et  $\bigcup_{k=1}^n S_k = E$  ning  $S_k - S_k \subset U$ . Valime vastavalt lemmale 3.5 arvu  $k_0 \in \{1, \dots, n\}$  nii, et  $(x_\gamma)$  on põhiliselt hulgas  $S_{k_0}$ , s.t.

$$\exists \gamma_0 \in \Gamma : \gamma \geq \gamma_0 \Rightarrow x_\gamma \in S_{k_0},$$

siis

$$\gamma, \gamma' \geq \gamma_0 \Rightarrow x_\gamma - x_{\gamma'} \in S_{k_0} - S_{k_0} \subset U.$$

Niisiis on  $(x_\gamma)$  Cauchy pere, seega vastavalt eeldusele koonduv hulgas  $E$ . ■

## 4 Metriseeruvad topoloogilised vektorruumid

Olgu  $Z$  meetriline ruum meetrikaga  $d$ . Almhulgat  $E \subset Z$  sisepunktiks nimetatakse sellist punkti  $x \in E$ , mille jaoks leidub ümbrus  $B(x, r) := \{z \in Z \mid d(x, z) < r\}$  omadusega  $B(x, r) \subset E$ . Kui almhulk  $E$  koosneb ainult oma sisepunktidest, siis nimetatakse teda lahtiseks. Kõigi niiviisi defineeritud lahtiste hulkade süsteem  $\tau_d$  on topoloogia hulgas  $Z$ , s.t. ta rahuldab topoloogia aksioome **(T1)** – **(T3)** (vt. art. 1.1). Seda topoloogiat nimetatakse meetrika  $d$  poolt määratud *meetriliseks topoloogiaks*.

Öeldakse, et topoloogilise ruumi  $X$  topoloogia  $\tau$  on *metriseeruv*, kui hulgas  $X$  saab defineerida niisuguse meetrika  $d$ , et  $\tau$  langeb kokku meetrika  $d$  poolt määratud meetrilise topoloogiaga. Sel juhul keraad  $B(x, 1/n)$ , kus  $n \in \mathbb{N}$ , moodustavad punkti  $x$  ümbruste baasi. Niisiis, *kui  $TR X$  on metriseeruv, siis igal punktil on olemas loenduv ümbruste baas*.

### 4.1 Metriseeruvad topoloogilised vektorruumid

TVR-i  $(X, \tau)$  nimetame **metriseeruvaks**, kui tema topoloogia  $\tau$  on metriseeruv. Eelpoolöeldu põhjal saab sellises TVR-s fikseerida loenduva nullüümbruste baasi. Me näitame järgnevalt, et

- 1) *topoloogiat  $\tau$  määräava meetrika saab defineerida teatava üldistatud normi abil*, mida nimetatakse pseudonormiks, ja
- 2) *loenduva nullüümbruste baasi olemasolu eralduvas TVR-s garanteerib tema metriseeruvuse.*

**Pseudonormid. Definitsioon.** Olgu  $X$  vektorruum. Funktsiooni  $|| : X \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto |x|$  nimetatakse *pseudonormiks*, kui ta rahuldab tingimusi

- (i)  $x = 0 \Leftrightarrow |x| = 0$ ,
- (ii)  $|\lambda x| \leq |x|$ , kui  $x \in X$  ja  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,  $|\lambda| \leq 1$ ,
- (iii)  $|x + y| \leq |x| + |y|$ .

Paneme tähele, et iga norm on pseudonorm (selgitada!)☒. Tähtsaim vahetu järeldus definitsioonist on, et seosega  $d(x, y) := |x - y|$  on vektorruumis  $X$  määratud meetrika (kontrollida!)☒, kusjuures see on invariantne nihke suhtes:

$$d(x + z, y + z) = |(x + z) - (y + z)| = |x - y| = d(x, y).$$

Sellega defineeritud topoloogiat nimetame *pseudonormi  $||$  poolt määratud topoloogiaks*.

**Lause 4.1.** *Kui eralduvas TVR-s  $(X, \tau)$  on loenduv nullüümbruste baas, siis saab tema topoloogia määräta pseudonormiga.*

**Tõestus.** Olgu  $\mathcal{B} = \{V_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  nullüümbruste baas TVR-s  $(X, \tau)$ . Vastavalt teoreemile 2.5 võime eeldada, et hulgad  $V_n$  on tasakaalus ja

$$V_{n+1} + V_{n+1} \subset V_n \quad (n \in \mathbb{N}) \tag{4.1}$$

(põhjendada!)☒. Pseudonormi defineerimiseks tähistame iga *lõpliku* mittetühja almhulgat  $J \subset \mathbb{N}$  korral

$$q_J := \sum_{k \in J} 2^{-k} \text{ ning } V_J := \sum_{k \in J} V_k.$$

Paneme tähele, et  $0 < q_J < 1$  ja

$$q_J < 2^{-r} \Rightarrow r < \min \{l \mid l \in J\} \Rightarrow V_J \subset V_r. \quad (4.2)$$

Esimese implikatsiooni kehtivus on ilmne. Teise tõestamiseks eeldame, et  $J$  koosneb naturaalarvudest  $k_1 < k_2 < \dots < k_n$ , ning võtame suvalise  $r \in \mathbb{N}$  omadusega  $r < k_1$ . Tänu seosele (4.1)

$$\begin{aligned} V_r &\supset V_{r+1} + V_{r+1} \supset V_{k_1} + V_{k_1} \supset V_{k_1} + V_{k_1+1} + V_{k_1+1} \\ &\supset V_{k_1} + V_{k_2} + V_{k_2} \supset V_{k_1} + V_{k_2} + V_{k_2+1} + V_{k_2+1} \\ &\supset V_{k_1} + V_{k_2} + V_{k_3} + V_{k_3} \supset \dots \supset \sum_{i=1}^n V_{k_i} = V_J. \end{aligned}$$

Defineerime nüüd ruumis  $X$  pseudonormi  $\|\cdot\|$  järgmiselt. Olgu  $|x| := 1$ , kui  $x \notin V_J$  kõigi lõplike alamhulkade  $J \subset \mathbb{N}$  korral, vastupidisel juhul olgu

$$|x| := \inf \{q_J \mid x \in V_J\}. \quad (4.3)$$

Näitame, et funktsioon  $\|\cdot\|$  rahuldab tõepoolest pseudonormi definitsiooni tingimusi (i) – (iii).

Tingimuse (i) põhjendamiseks paneme tähele, et ühelt poolt kehtib ilmselt  $|0| = 0$  (selgitada!) $\blacksquare$ , teisalt, kui  $|x| = 0$ , siis  $x \in V_n$  kõikide  $n \in \mathbb{N}$  korral (vrd. (4.2)) ja tänu ruumi  $X$  eralduvusele on sel juhul  $x = 0$  (vrd. lause 2.7). Tingimuse (ii) puhul on selge, et kui  $|x| = 1$ , siis  $|\lambda x| \leq |x|$  iga  $\lambda \in \mathbb{K}$  korral. Olgu  $|x| < 1$ . Kuna  $V_J$  kui lõpliku arvu tasakaalus hulkade  $V_k$  ( $k \in J$ ) summa on tasakaalus (kontrollida!) $\blacksquare$ , siis eeldusel  $|\lambda| \leq 1$  saame soovitud võrratuse

$$|\lambda x| = \inf \{q_J \mid \lambda x \in V_J\} \leq \inf \{q_J \mid x \in V_J\} = |x|.$$

Tingimuse (iii) kontrollimiseks võtame  $x, y \in X$ . Kui  $|x| + |y| \geq 1$ , siis on tingimus (iii) täidetud. Kui  $|x| + |y| < 1$ , siis valime  $\varepsilon > 0$  selliselt, et  $|x| + |y| + 2\varepsilon < 1$ , ja seejärel (seosest (4.3) ning infimumi definitsioonist lähtudes) lõplikud alamhulgad  $J \subset \mathbb{N}$  ning  $I \subset \mathbb{N}$  nii, et

- 1)  $x \in V_J$  ja  $q_J < |x| + \varepsilon$  ning
- 2)  $y \in V_I$  ja  $q_I < |y| + \varepsilon$ .

Edasi leiame (üheselt määratud) lõpliku alamhulga  $K \subset \mathbb{N}$  omadusega  $q_K = q_J + q_I$  (veenduda hulga  $K$  olemasolus!) $\blacksquare$ , sel juhul  $V_J + V_I \subset V_K$  (selgitada!) $\blacksquare$ . Seega  $x + y \in V_K$ , mistõttu  $|x + y| \leq q_K = q_J + q_I < |x| + |y| + 2\varepsilon$ . Kuna  $\varepsilon$  võib olla ükskõik kui väike positiivne arv, saamegi tingimuse  $|x + y| \leq |x| + |y|$ .

Lõpuks jäääb veel veenduda, et pseudonorm  $\|\cdot\|$  määrab vektorruumis  $X$  esialgse topoloogia  $\tau$ . Olgu  $d$  pseudonormiga  $\|\cdot\|$  määratud meetrika ja olgu  $\tau'$  selle meetrikaga (s.o. pseudonormiga  $\|\cdot\|$ ) määratud topoloogia. Näitame, et  $\tau = \tau'$ , s.t. ühikkujutused

$$i: (X, \tau) \rightarrow (X, \tau') \quad \text{ja} \quad i^{-1}: (X, \tau') \rightarrow (X, \tau) \quad \text{on pidevad.}$$

Teatavasti moodustavad topoloogia  $\tau'$  nulliumbruste baasi  $\mathfrak{B}'$  hulgad

$$B_\varepsilon := \{x \in X \mid |x| < \varepsilon\} \quad (\varepsilon > 0),$$

veendume, et

$$B_{2^{-k}} \subset V_k \subset B_{2^{-(k-1)}} \quad (k \in \mathbb{N}). \quad (4.4)$$

Esimese sisalduvuse põhjendamiseks valemis märgime, et kui  $x \in B_{2^{-k}}$ , siis leidub selline  $J \subset \mathbb{N}$ , et  $x \in V_J$  ja  $q_J < 2^{-k}$ , millest seoste (4.2) põhjal järeltub  $x \in V_k$ . Teine sisalduvus on ilmne: kui  $x \in V_k$ , siis funktsiooni  $\|\cdot\|$  definitsioonist tuleneb  $|x| \leq 2^{-k}$ .

Olgu  $B_\varepsilon \in \mathfrak{B}'$ , võtame  $k \in \mathbb{N}$  nii suure, et  $2^{-(k-1)} < \varepsilon$ , siis seostest (4.4) järeltub  $V_k \subset B_\varepsilon$ . Seega on  $i: (X, \tau) \rightarrow (X, \tau')$  pidev kujutus. Olgu nüüd, vastupidi, fikseeritud mingi  $V_n \in \mathfrak{B}$ . Kui  $\varepsilon < 2^{-n}$ , siis  $B_\varepsilon \subset V_n$ , niisiis on ka kujutus  $i^{-1}: (X, \tau') \rightarrow (X, \tau)$  pidev. Lause on tõestatud. ■

**Teoreem 4.2.** *Eralduva TVR-i  $(X, \tau)$  korral on järgmised väited samaväärsed:*

- (a) *ruumis  $(X, \tau)$  on loenduv nulliumbruste baas,*
- (b) *topoloogia  $\tau$  saab määrata pseudonormiga,*
- (c) *topoloogia  $\tau$  saab määrata nihete suhtes invariantse meetrikaga,*
- (d) *topoloogia  $\tau$  on metriseeruv.*

**Tõestus.** Implikatsioon (a)  $\Rightarrow$  (b) tuleneb vahetult lausest 4.1, ülejäänud implikatsioonide (b)  $\Rightarrow$  (c)  $\Rightarrow$  (d)  $\Rightarrow$  (a) kehtivus on selge. ■

Meetriliste ruumide teooria kõige tähelepanuväärsed tulemused (Baire'i teoreem, Banachi püsipunktiprintsiip jt.) on seotud **täielike** meetriliste ruumidega. Eelmises peatükis toodud definitsiooni kohaselt on topoloogiline vektorruum täielik, kui iga tema elementidest moodustatud Cauchy pere on selles ruumis koonduv.

On selge, et Cauchy jadad (kui Cauchy perede eriliigi) saame defineerida igas TVR-s  $(X, \tau)$ : elementide jada  $(x_n)$  on Cauchy jada parajasti siis, kui iga nulliumbruse  $V \in \mathfrak{B}$  korral leidub selline  $N \in \mathbb{N}$ , et  $x_n - x_m \in V$  kõikide  $m, n \geq N$  korral. Kui  $X$  on seejuures metriseeruv ning tema topoloogia on määratud nihke suhtes invariantse meetrikaga  $d$ , siis võime nulliumbruste baasiks  $\mathfrak{B}$  võtta alamhulkade süsteemi

$$B_\delta := \{x \in X \mid d(x, 0) < \delta\} \quad (\delta > 0).$$

Seetõttu (tänu seosele  $d(x_n, x_m) = d(x_n - x_m, 0)$ ) on jada  $(x_n)$  Cauchy jada topoloogias  $\tau$  parajasti siis, kui ta on meetrika  $d$  suhtes Cauchy jada, s.t. kui  $\lim_{n, m \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) = 0$  (kontrollida!)☒. Seega kehtib järgmine väide.

**Lause 4.3.** *Olgu  $(X, \tau)$  eralduv TVR ja olgu  $d_1$  ja  $d_2$  nihke suhtes invariantsed meetrikad vektorruumis  $X$ , mis mõlemad määrevad topoloogia  $\tau$ . Neil meetrikatel on ühed ja samad Cauchy jadad ning meetrika  $d_1$  on täielik parajasti siis, kui meetrika  $d_2$  on täielik.*

Metriseeruva TVR-i täielikkuse kirjeldamiseks tõestame järgmise lause.

**Lause 4.4.** *Metriseeruv TVR  $X$  on täielik parajasti siis, kui tema topoloogia saab määrata täieliku nihke suhtes invariantse meetrikaga. Teisisõnu, metriseeruv TVR on täielik parajasti siis, kui iga tema Cauchy jada on selles ruumis koonduv.*

**Tõestus.** Tarvilikkus tuleneb sellest, et iga jada, mis on Cauchy jada vaadeldava meetrika mõttes, on Cauchy jada ka TVR-s  $X$ .

*Piisavus.* Olgu  $(X, \tau)$  selline metriseeruv TVR, milles iga Cauchy jada on koonduv. Olgu  $\mathfrak{B} = \{V_n \mid n \in \mathbb{N}\}$   $\tau$ -nulliumbruste baas omadusega  $V_{n+1} + V_{n+1} \subset V_n$ . Olgu  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Gamma}$  suvaline Cauchy pere ruumis  $X$ , meie eesmärk on näidata, et  $(x_\alpha)$  on koonduv ruumis  $X$ .

Vastavalt Cauchy pere definitsioonile saab iga  $V_n \in \mathfrak{B}$  korral leida sellise  $\alpha'_n \in \Gamma$ , et kui  $\alpha, \beta \geq \alpha'_n$ , siis  $x_\alpha - x_\beta \in V_n$ . Moodustame indeksite jada  $(\alpha_n)$  nii, et

$$\alpha_n \geq \alpha'_n \text{ ja } \alpha_n \geq \alpha_{n-1} \quad (n \in \mathbb{N}), \quad (4.5)$$

ning paneme tähele, et  $(x_{\alpha_n})$  on Cauchy jada: suvalise  $V_m \in \mathfrak{B}$  korral valime  $k, l \geq m$ , siis  $\alpha_k, \alpha_l \geq \alpha_m \geq \alpha'_m$ , mistõttu  $x_{\alpha_k} - x_{\alpha_l} \in V_m$ . Et eelduse kohaselt on iga Cauchy jada koonduv, siis eksisteerib piirväärus  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{\alpha_n} =: x$ . Näitame, et ka pere  $(x_\alpha)$  koondub piirvääruseks  $x$ .

Olgu  $V_m \in \mathfrak{B}$ . Kuna  $x_{\alpha_n} \rightarrow x$ , siis saab valida  $n_0 \geq m+1$  nii, et  $x_{n_0} - x \in V_{m+1}$ . Võtame  $\alpha \geq \alpha_{n_0}$ , siis  $\alpha \geq \alpha_{n_0} \geq \alpha_{m+1} \geq \alpha'_{m+1}$  (vrd. (4.5)), seega  $x_\alpha - x_{\alpha_{n_0}} \in V_{m+1}$ . Kokkuvõttes, kui  $\alpha \geq \alpha_{n_0}$ , siis

$$x_\alpha - x = (x_\alpha - x_{\alpha_{n_0}}) + (x_{\alpha_{n_0}} - x) \in V_{m+1} + V_{m+1} \subset V_m,$$

s.t.  $x_\alpha \rightarrow x$ . ■

**Definitsioon.** TVR-i  $X$  nimetatakse

- 1) *lokaalselt tõkestatuks*, kui tal leidub tõkestatud nullüümbrus, ja
- 2) *lokaalselt kompaktseks*, kui tal leidub kompaktne nullüümbrus.

Lokaalselt tõkestatud ruumide tüüpiliseks näiteks on normmeeritud ruum, kuid peale nende leidub ka teisi (vt. art. 7.3, näide 7.2). Siinkohal märgime järgmist olulist fakti.

**Lause 4.5.** *Iga lokaalselt tõkestatud eralduv TVR on metriseeruv.*

**Tõestus.** Iseseisvalt! Kasutada ülesannet 4.1. ■

**Ülesanne 4.1.** Näidata, et kui  $B$  on tõkestatud nullüümbrus TVR-s  $X$ , siis hulgad  $r_n B$ , kus  $r_1 > r_2 > \dots > r_n \dots$  ja  $r_n \rightarrow 0$ , moodustavad ruumis  $X$  nullüümbruste baasi.

## 4.2 Lõplikumõõtmelised topoloogilised vektorruumid

**Lõplikumõõtmeline vektorruum.** Lokaalselt kompaktsed eralduvad topoloogilised vektorruumid osutuvad, nagu me peagi veendume, lõplikumõõtmelisteks. Meenutame (vt. sissejuhatuse), et vektorruumi  $X$  nimetatakse  $n$ -mõõtmeliseks (kirjutame  $\dim X = n$ ), kui tal leidub  $n$  elemendist koosnev baas, s.o. selline lineaarselt sõltumatu alamhulk  $\{e_1, \dots, e_n\}$ , et iga element  $x \in X$  on (üheselt) esitatav kujul  $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$ , kus  $\lambda_k \in \mathbb{K}$ . Kui vektorruumi  $X$  puhul see tingimus on mingi  $n \in \mathbb{N}$  korral täidetud, siis öeldakse, et  $X$  on lõplikumõõtmeline ja märgitakse  $\dim X < \infty$ .

**Eralduvad  $n$ -mõõtmelised TVR-d on omavahel isomorfsed.** Teatavasti on lõplikumõõtmelises vektorruumis kõik normid ekvivalentsed. Järgmisse lause kohaselt võib sedasama väita ka selliste eralduvate topoloogiate kohta, mis muudavad lõplikumõõtmelise vektorruumi topoloogiliseks vektorruumiks. Me tähistame sümboliga  $m_n$  kõigi  $n$ -mõõtmeliste vektorite  $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$  normmeeritud ruumi, kus norm on defineeritud seosega  $\|\xi\| := \max_{1 \leq i \leq n} |\xi_i|$ . Olgu

$C$  selle normmeeritud ruumi lahtine ühikkera, s.t.  $C := \left\{ \xi \in m_n \mid \max_{1 \leq i \leq n} |\xi_i| < 1 \right\}$ .

**Lause 4.6.** Olgu  $X$  suvaline  $n$ -mõõtmeline vektorruum üle korpuse  $\mathbb{K}$ . Kui  $\tau$  on selline topoloogia, et  $(X, \tau)$  on eralduv TVR, siis  $(X, \tau)$  on isomorfne TVR-ga  $m_n$ , mis on defineeritud üle sama korpuse  $\mathbb{K}$ .

**Tõestus.** Olgu  $\{e_1, \dots, e_n\}$  vektorruumi  $X$  baas. Näitame, et kujutus

$$T: m_n \rightarrow X, \quad \xi \mapsto \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$$

korraldab TVR-de  $m_n$  ja  $X$  vahel isomorfismi. Ilmselt on  $T$  lineaarne ja bijektiivne (põhjendada!)☒. Liitmise ja skalaariga korrutamise pidevusest TVR-s  $X$  tuleneb kujutuse  $T$  pidevus: kui  $\xi^{(\alpha)} \rightarrow 0_{m_n}$  (s.t. vektorite pere  $(\xi^{(\alpha)})_{\alpha \in \Gamma}$  koondub nullelementiks  $0_{m_n}$  ruumis  $m_n$ ), siis iga  $i \in \{1, \dots, n\}$  korral  $\xi_i^{(\alpha)} \rightarrow 0$ , mistõttu  $\xi_i^{(\alpha)} e_i \rightarrow 0 e_i = 0_X$  ja seega

$$T(\xi^{(\alpha)}) = \sum_{i=1}^n \xi_i^{(\alpha)} e_i \rightarrow 0_X.$$

Pöördkujutuse  $T^{-1}$  pidevuse kontrollimiseks näitame, et leidub selline  $\tau$ -nullüümbrus  $U$ , mille  $T^{-1}$  teisendab ruumi  $m_n$  ühikkerasse  $C$ , s.t.  $U \subset T(C) = \{x \in X \mid \|T^{-1}(x)\| < 1\}$ . Kuna  $T$  on pidev ja  $\left\{ \xi \in m_n \mid \max_{1 \leq i \leq n} |\xi_i| = 1 \right\}$  kui tõkestatud kinnine alamhulk (kontrollida!)☒ lõplikumõõtmelises normeeritud ruumis  $m_n$  on kompaktne, siis  $S := \{x \in X \mid \|T^{-1}(x)\| = 1\}$  on kompaktne ning seega kinnine ruumis  $(X, \tau)$ . Nullelement hulka  $S$  ei kuulu, seetõttu saab valida tasakaalus lahtise nullüümbruse  $U$  omadusega  $U \cap S = \emptyset$ . Osutub, et  $U \subset T(C)$ . Tõepoolest, kui oletada, et leidub mingi  $x \in U \setminus T(C)$ , siis  $\|T^{-1}(x)\| \geq 1$  ja  $\frac{x}{\|T^{-1}(x)\|} \in S \cap U$  (põhjendada!)☒, mis on vastuolus nullüümbruse  $U$  valikuga. ■

**Järeldus 4.7.** Eralduvas TVR-s  $(X, \tau)$  on iga lõplikumõõtmeline vektoralamruum  $Y \subset X$  kinnine.

**Tõestus.** Olgu  $x$  alamruumi  $Y$  puutepunkt TVR-s  $X$ , moodustame  $Y_0 := \text{span}(Y \cup \{x\})$ . Kuna  $\dim Y_0 < \infty$ , siis lause 4.6 põhjal on TVR  $(Y_0, \tau|_{Y_0})$  isomorfne TVR-ga  $m_n$  mingi  $n \in \mathbb{N}$  korral: leidub selline bijektiivne lineaarne kujutus  $T: m_n \rightarrow (Y_0, \tau|_{Y_0})$ , mis on pidev ja mille pöördkujutus on pidev. Tähistame  $\xi := T^{-1}(x)$  ning  $L := T^{-1}(Y)$ , siis  $m_n = \text{span}(L \cup \{\xi\})$ . Kui  $\xi \in L$ , siis  $m_n = L$ , vastasel juhul  $m_n = L \oplus \langle \xi \rangle$ , kuid igal juhul on  $L$  kinnine vektoralamruum normeeritud ruumis  $m_n$ . Kuna  $T$  on topoloogiline isomorfism, siis  $Y = T(L)$  on kinnine TVR-s  $Y_0$ . Väite tõestuseks jäääb näidata, et  $x$  on alamruumi  $Y$  puutepunkt ka TVR-s  $(Y_0, \tau|_{Y_0})$ , sel juhul  $Y = Y_0$ , s.t.  $x \in Y$ , mistõttu  $Y$  on kinnine TVR-s  $X$ .

Olgu  $U$  punkti  $x$  ümbrus TVR-s  $Y_0$ , siis leidub  $V \subset X$ , mis on punkti  $x$  ümbrus TVR-s  $X$  ja rahuldab tingimust  $U = V \cap Y_0$  (selgitada!)☒, seejuures

$$U \cap Y = (V \cap Y_0) \cap Y = V \cap (Y_0 \cap Y) = V \cap Y.$$

Seega, kuna  $x \in \overline{Y}$  ruumis  $X$ , siis  $U \cap Y = V \cap Y \neq \emptyset$ , järelikult  $x \in \overline{Y}$  ka ruumis  $Y_0$ . ■

**Lokaalselt kompaktne eralduv TVR on lõplikumõõtmeline.** Funktsionaalanalüüs kurusest teame, et lõplikumõõtmelises normeeritud ruumis on iga kinnine tõkestatud alamhulk (muuhulgas ka kinnine ühikkera) kompaktne. Seega on selline ruum lokaalselt kompaktne. Järgmine lause ütleb, et lokaalne kompaktsus on omane ainult lõplikumõõtmelistele topoloogilistele vektoruumidele.

**Lause 4.8.** *Iga lokaalselt kompaktne eralduv TVR  $X$  on lõplikumõõtmeline.*

**Tõestus.** Olgu  $V$  kompaktne nulliumbris TVR-s  $X$ , üldisust kitsendamata võime eeldada, et  $V$  on tasakaalus (põhjendada!) $\blacksquare$ . Kuna  $V$  on tõkestatud hulk, siis  $\mathfrak{B} := \{2^{-n}V \mid n \in \mathbb{N}\}$  on nulliumbruste baas (vrd. ülesanne 4.1). Et  $V$  on täielikult tõkestatud (vrd. teoreem 3.7), siis saab valida sellised  $x_1, \dots, x_m \in V$ , et  $V \subset \bigcup_{i=1}^m (x_i + \frac{1}{2}V) = \{x_1, \dots, x_m\} + \frac{1}{2}V$ . Moodustame lõplikumõõtmelise vektoralamruumi  $Y := \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}$  ja näitame, et  $V \subset Y$ , millest hulga  $V$  neelavuse tõttu tuleneb  $X = Y$  (selgitada!) $\blacksquare$  ning järelikult ka  $\dim X < \infty$ .

Järelduse 4.7 kohaselt on  $Y$  kinnine alamruum TVR-s  $X$ , kusjuures  $V \subset Y + \frac{1}{2}V$ . Pidades silmas, et  $\lambda Y = Y$  iga  $\lambda \neq 0$  korral, saame seose  $\frac{1}{2}V \subset Y + \frac{1}{4}V$ , seega

$$V \subset Y + \frac{1}{2}V \subset Y + Y + \frac{1}{4}V = Y + \frac{1}{4}V.$$

Nii jätkates saame sisalduvuse

$$V \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} (Y + 2^{-n}V) =: Z.$$

Paneme tähele, et  $Z \subset \overline{Y}$ . Tõepooltest, kui  $x \in Z$  ja  $W := 2^{-n}V \in \mathfrak{B}$ , siis  $x \in Y + W$ , mistõttu  $x = y + w$ , kus  $y \in Y$  ja  $w \in W$ . Kuna  $x - w \in (x + W) \cap Y$ , siis punkti  $x$  iga ümbris lõikab hulka  $Y$ , tähendab,  $x \in \overline{Y}$ . Niisiis,  $V \subset Z \subset \overline{Y} = Y$ . Lause on tõestatud. ■

### 4.3 Näiteid

Selle peatüki lõpetame kolme olulise näitega topoloogilistest vektorruumidest.

**Näide 4.1.** Olgu  $C(\mathbb{C})$  kõigi komplekstasandil  $\mathbb{C}$  pidevate funktsioonide hulk, s.t.

$$C(\mathbb{C}) := \{x = x(t) \mid x: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{K} \text{ on pidev}\}.$$

Ilmselt on  $C(\mathbb{C})$  vektorruum, milles liitmine ja skalariga korrutamine on defineeritud punktviisi: suvaliste  $x, y \in C(\mathbb{C})$  ja  $\lambda \in \mathbb{K}$  puhul  $(x + y)(t) := x(t) + y(t)$  ja  $(\lambda x)(t) := \lambda x(t)$ . Tähistame

$$V_{n,i} := \{x \in C(\mathbb{C}) \mid |x(t)| \leq 1/i, \text{ kui } |t| \leq n\}$$

ja näitame, et alamhulkade süsteem  $\mathfrak{B} := \{V_{n,i} \mid n, i \in \mathbb{N}\}$  rahuldab tingimusi **(NB1)** – **(NB4)**. Nende kontrollimiseks paneme kõigepealt tähele, et (kontrollida!) $\blacksquare$

$$n \leq m \Rightarrow V_{m,i} \subset V_{n,i} \quad (i \in \mathbb{N}) \quad \text{ja} \quad i \leq j \Rightarrow V_{n,j} \subset V_{n,i} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

**(NB1):** Hulkade  $V_{k,j}$  ja  $V_{l,r}$  korral tähistame  $n := \max\{k, l\}$  ning  $i := \max\{j, r\}$ , siis  $V_{n,i} \subset V_{k,j} \cap V_{l,r}$ .

**(NB2):** Kui  $|\lambda| \leq 1$ , siis iga  $x \in V_{n,i}$  korral

$$|(\lambda x)(t)| = |\lambda| |x(t)| \leq |x(t)| \leq 1/i \quad (|t| \leq n),$$

s.t.  $\lambda x \in V_{n,i}$ . Tähendab,  $V_{n,i}$  on tasakaalus hulk.

**(NB3):** Olgu  $x \in C(\mathbb{C}) \setminus \{0\}$ , tähistame  $M := \max\{|x(t)| \mid |t| \leq n\}$  ja  $\delta := \frac{1}{Mi}$  fikseeritud  $V_{n,i} \in \mathfrak{B}$  korral. Siis

$$|(\delta x)(t)| = \frac{1}{Mi} |x(t)| \leq \frac{1}{i} \quad (|t| \leq n),$$

s.t.  $\delta x \in V_{n,i}$ . Seega on  $V_{n,i}$  neelav hulk.

(NB4): Olgu  $V_{n,i} \in \mathfrak{B}$  ja  $U := V_{n,2i}$ , siis  $U + U \subset V_{n,i}$ . Tõepoolest, kui  $x, y \in U$ , siis

$$|(x+y)(t)| \leq |x(t)| + |y(t)| \leq \frac{1}{2i} + \frac{1}{2i} = \frac{1}{i} \quad (|t| \leq n),$$

s.t.  $x + y \in V_{n,i}$ .

Kokkuvõttes oleme töestanud, et  $C(\mathbb{C})$  on TVR nulliumbruste baasiga  $\mathfrak{B}$ . Kuna  $\mathfrak{B}$  on loenduv süsteem ja  $\bigcap \{V_{n,i} \mid n, i \in \mathbb{N}\} = \{0\}$ , siis  $C(\mathbb{C})$  on metriseeruv. Vahetu kontroll näitab, et TVR  $C(\mathbb{C})$  on täielik, s.t. iga tema Cauchy jada on koonduv.

**Näide 4.2.** Olgu  $S[a, b]$  kõigi lõigus  $[a, b]$  Lebesgue'i mõttes mõõtuvate peaaegu kõikjal lõplike reaalsete väärustega funktsionide hulk. Kui peaaegu kõikjal lõplikud funktsionid  $x = x(t)$  ja  $y = y(t)$  on mõõtuvad lõigus  $[a, b]$ , siis ka  $x + y$  ja  $\lambda x$ , kus  $\lambda \in \mathbb{R}$ , on peaaegu kõikjal lõplikud ja mõõtuvad. Teiste sõnadega,  $S[a, b]$  on vektorruum. Lepime kokku, et me samastame selle ruumi punktidena funktsionid, mis langevad kokku peaaegu kõikjal:

$$x = y : \Leftrightarrow \text{mes} \{t \in [a, b] \mid x(t) \neq y(t)\} = 0.$$

Tähistame

$$V_{n,i} := \{x \in S[a, b] \mid \text{mes} \{t \in [a, b] \mid |x(t)| > 1/n\} < 1/i\} \quad (n, i \in \mathbb{N}),$$

siis (kontrollida!)  $\blacksquare$

$$n \leq m \Rightarrow V_{m,i} \subset V_{n,i} \quad (i \in \mathbb{N}) \quad \text{ja} \quad i \leq j \Rightarrow V_{n,j} \subset V_{n,i} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Näitame, et süsteem  $\mathfrak{B} := \{V_{n,i} \mid n, i \in \mathbb{N}\}$  rahuldab tingimusi (NB1) – (NB4).

(NB1): Kui  $V_{k,j}, V_{l,r} \in \mathfrak{B}$  ja  $n := \max \{k, l\}$  ning  $i := \max \{j, r\}$ , siis  $V_{n,i} \subset V_{k,j} \cap V_{l,r}$ .

(NB2): Kui  $|\lambda| \leq 1$ , siis iga  $x \in V_{n,i}$  korral

$$\{t \in [a, b] \mid |\lambda x(t)| > 1/n\} \subset \{t \in [a, b] \mid |x(t)| > 1/n\},$$

mistõttu

$$\text{mes} \{t \in [a, b] \mid |\lambda x(t)| > 1/n\} \leq \text{mes} \{t \in [a, b] \mid |x(t)| > 1/n\} < 1/i.$$

Tähendab,  $\lambda x \in V_{n,i}$  ja seega  $V_{n,i}$  on tasakaalus hulk.

(NB3): Olgu  $x \in S[a, b] \setminus \{0\}$  ja  $V_{n,i} \in \mathfrak{B}$  fikseeritud. Kuna  $x = x(t)$  on peaaegu kõikjal lõplik funktsioon, siis leidub selline  $n_0 \in \mathbb{N}$ , et  $\text{mes} \{t \in [a, b] \mid |x(t)| > n_0\} < \frac{1}{i}$ . Võtame  $\delta := \frac{1}{nn_0}$ , siis

$$\begin{aligned} \text{mes} \{t \in [a, b] \mid |\delta x(t)| > 1/n\} &= \text{mes} \left\{ t \in [a, b] \mid \frac{1}{nn_0} |x(t)| > 1/n \right\} \\ &= \text{mes} \{t \in [a, b] \mid |x(t)| > n_0\} < \frac{1}{i}, \end{aligned}$$

järelikult  $\delta x \in V_{n,i}$ . Niisiis on hulk  $V_{n,i}$  neelav.

(NB4): Tähistame hulga  $V_{n,i}$  korral  $U := V_{2n,2i}$ . Osutub, et  $U + U \subset V_{n,i}$ . Tõepoolest, lähtudes suvaliste  $x, y \in U$  korral seostest

$$\{t \in [a, b] \mid |x(t) + y(t)| > 1/n\} \subset \left\{ t \in [a, b] \mid |x(t)| > \frac{1}{2n} \right\} \cup \left\{ t \in [a, b] \mid |y(t)| > \frac{1}{2n} \right\}$$

(paneme tähele, et kui  $|x(t)| \leq \frac{1}{2n}$  ja  $|y(t)| \leq \frac{1}{2n}$ , siis  $|x(t) + y(t)| \leq |x(t)| + |y(t)| \leq 1/n$ ), saame mõõdu aditiivsuse tõttu

$$\begin{aligned} \text{mes} \{t \in [a, b] \mid |x(t) + y(t)| > 1/n\} \\ &\leq \text{mes} \left\{ t \in [a, b] \mid |x(t)| > \frac{1}{2n} \right\} + \text{mes} \left\{ t \in [a, b] \mid |y(t)| > \frac{1}{2n} \right\} \\ &\leq \frac{1}{2i} + \frac{1}{2i} = \frac{1}{i} \end{aligned}$$

ehk  $x + y \in V_{n,i}$ .

Kuna  $\bigcap \{V_{n,i} \mid n, i \in \mathbb{N}\} = \{0\}$  (selgitada!) $\blacksquare$ , siis kokkuvõttes oleme tõestanud, et  $S[a, b]$  on metriseeruv TVR nulliumbruste baasiga  $\mathfrak{B}$ . Lihtne on veenduda, et elementide jada  $(x_m)$  koondub nulliks TVR-s  $S[a, b]$  parajasti siis, kui

$$\forall n, i \in \mathbb{N} \quad \exists N \in \mathbb{N} : m \geq N \Rightarrow \text{mes} \{t \in [a, b] \mid |x_m(t)| > 1/n\} < \frac{1}{i}.$$

Viimane tingimus tähendab funktsioonide jada  $(x_m)$  koonduvust nulliks *mõõdu järgi*. Niisiis, TVR-i  $S[a, b]$  topoloogiline koonduvus langeb kokku funktsionaaljada mõõdu järgi koonduvusega lõigus  $[a, b]$ .

Märgime, et ruumis  $S[a, b]$  defineeritud topoloogia  $\tau$  saab esitada teisel kujul. Defineerime selles vektorruumis veel topoloogia  $\tau_0$  pseudonormiga  $\|\cdot\|$ , kus

$$\|x\| := \int_a^b \frac{|x(t)|}{|x(t)| + 1} dt \quad (x \in S[a, b]).$$

Kui  $(x_n)$  on elementide jada vektorruumis  $S[a, b]$ , siis, nagu näitab vahetu kontroll,

$$x_n \rightarrow 0 \text{ TVR-s } (S[a, b], \tau_0) \Leftrightarrow x_n(t) \rightarrow 0 \text{ mõõdu järgi} \Leftrightarrow x_n \rightarrow 0 \text{ TVR-s } (S[a, b], \tau).$$

Seetõttu on pidevad nii ühikkujutus  $i$ :  $(S[a, b], \tau) \rightarrow (S[a, b], \tau_0)$  kui ka tema pöördkujutus  $i^{-1}$ :  $(S[a, b], \tau_0) \rightarrow (S[a, b], \tau)$ , mis tähendab, et TVR-d  $(S[a, b], \tau)$  ja  $(S[a, b], \tau_0)$  on isomorfsed ehk  $\tau = \tau_0$ . Osutub, et TVR  $(S[a, b], \tau)$  (ja seega ka  $(S[a, b], \tau_0)$ ) on täielik.

**Näide 4.3.** Olgu  $\omega$  kõigi arvjadade  $x = (x_k)$  hulk, s.t.

$$\omega = \{x = (x_k) \mid x_k \in \mathbb{K} \ (k \in \mathbb{N})\}.$$

Hulk  $\omega$  on vektorruum, kui defineerida vektorruumi tehted selles hulgas koordinaaditi:

$$x + y := (x_k + y_k), \quad \lambda x := (\lambda x_k) \quad (x, y \in \omega, \lambda \in \mathbb{K}).$$

Tähistame

$$V_{n,i} := \left\{ x \in \omega \mid |x_k| \leq \frac{1}{i} \quad (k = 1, \dots, n) \right\}, \quad (4.6)$$

siis

$$m \leq n \Rightarrow V_{n,i} \subset V_{m,i} \quad (i \in \mathbb{N}) \quad \text{ja} \quad i \leq j \Rightarrow V_{n,j} \subset V_{n,i} \quad (n \in \mathbb{N})$$

(veenduda!)  $\blacksquare$ . Vahetu kontroll näitab (vrd. ülesanne 4.2), et  $\mathfrak{B} := \{V_{n,i} \mid n, i \in \mathbb{N}\}$  on nullümburstest baas mingis topoloogias  $\tau_\omega$ , kusjuures  $(\omega, \tau_\omega)$  on meetriline TVR.

**Ülesanne 4.2.** Kontrollida, et seosega (4.6) määratud  $\mathfrak{B} := \{V_{n,i} \mid n, i \in \mathbb{N}\}$  rahuldab tingimusi **(NB1)** – **(NB4)**.

**Ülesanne 4.3.** Tõestada, et TVR-s  $(\omega, \tau_\omega)$  on koonduvus samaväärne koonduvusega koordinaatide järgi, s.t.

$$x^{(n)} \rightarrow 0 \text{ ruumis } (\omega, \tau_\omega) \Leftrightarrow x_k^{(n)} \rightarrow 0 \text{ iga } k \in \mathbb{N} \text{ korral.}$$

**Ülesanne 4.4.** Tõestada, et TVR  $(\omega, \tau_\omega)$  on täielik.

## 5 Kumerad hulgad ja poolnormid

### 5.1 Kumerad alamhulgad vektorruumis

**Kumera hulga** mõiste on algebrailine ega sõltu topoloogiast. Sellest hoolimata mängivad kumerad hulgad topoloogiliste vektorruumide teorias erakordselt tähtsat rolli.

**Definitsioon.** Vektorruumi  $X$  mittetühja alamhulka  $E$  nimetatakse *kumeraks*, kui iga elementide paari  $x, y \in E$  puhul kõik elemendid  $\lambda x + (1 - \lambda)y$ , kus  $0 \leq \lambda \leq 1$ , kuuluvad hulka  $E$ . Lisaks loeme ka tühja alamhulga kumeraks.

Tasakaalus kumerat hulka nimetatakse *absoluutsest kumeraks*.

Seega on alamhulk  $E \subset X$  kumer parajasti siis, kui  $\lambda E + (1 - \lambda)E \subset E$  iga  $\lambda \in [0, 1]$  korral. Geomeetriliselt tähendab hulga  $E$  kumerus seda, et koos iga oma kahe punktiga  $x$  ja  $y$  sisaldb  $E$  ka neid punkte ühendava sirglõigu  $\{\lambda x + (1 - \lambda)y \mid \lambda \in [0, 1]\}$  vektorruumis  $X$ .

**Lause 5.1.** *Vektorruumi  $X$  alamhulk  $E$  on absoluutsest kumer parajasti siis, kui  $\lambda x + \mu y \in E$  iga elementide paari  $x, y \in E$  ja arvude paari  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  korral, mis rahuldavad tingimust  $|\lambda| + |\mu| \leq 1$ .*

**Tõestus.** *Tarvilikkus.* Olgu  $E$  tasakaalus kumer hulk. Võtame punktid  $x, y \in E$  ning arvud  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  omadusega  $|\lambda| + |\mu| \leq 1$ . Ilmselt  $\lambda x + \mu y \in E$ , kui üks arvudest  $\lambda$  ja  $\mu$  on null (selgitada!)☒. Eeldame, et mõlemad arvud on nullist erinevad, sel juhul  $\frac{\lambda}{|\lambda|}x, \frac{\mu}{|\mu|}y \in E$ . Peale selle

$$\frac{|\lambda|}{|\lambda| + |\mu|} + \frac{|\mu|}{|\lambda| + |\mu|} = 1,$$

millest hulga  $E$  kumeruse tõttu saame seose

$$\frac{1}{|\lambda| + |\mu|} (\lambda x + \mu y) = \frac{|\lambda|}{|\lambda| + |\mu|} \frac{\lambda}{|\lambda|} x + \frac{|\mu|}{|\lambda| + |\mu|} \frac{\mu}{|\mu|} y \in E.$$

Kasutades veel kord asjaolu, et hulk  $E$  on tasakaalus, jõuame tänu võrratusele  $|\lambda| + |\mu| \leq 1$  seoseni  $\lambda x + \mu y \in (|\lambda| + |\mu|)E \subset E$ .

*Piisavus* tuleneb vahetult vastavatest definitsioonidest (kontrollida!)☒. ■

Järgmised vaadeldavate mõistetega seotud omadused **järelduvad vahetult definitsioonidest**:

- kui vektorruumi  $X$  alamhulgad  $E_\alpha$  on kumerad (absoluutsest kumerad), siis ka  $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} E_\alpha$  on kumer (absoluutsest kumer) hulk suvalise indeksite hulga  $\Gamma$  puhul; kui alamhulgad  $E_1$  ja  $E_2$  on kumerad (absoluutsest kumerad), siis ka hulgad  $E_1 + E_2$  ning  $\delta E_1$  on kumerad (absoluutsest kumerad) suvalise  $\delta \in \mathbb{K}$  korral (tõestada!)☒,
- kui  $E \subset X$  on (absoluutsest) kumer ja  $T : X \rightarrow Z$  lineaarne kujutus vektorruumist  $X$  vektorruumi  $Z$ , siis ka  $T(E) \subset Z$  on (absoluutsest) kumer (tõestada!)☒.

**Alamhulga (absoluutsest) kumer kate.** Vektorruumi antud alamhulga puhul otsime vastust küsimusele, kuidas sellele (minimaalse hulga) elementide juurdelisamise teel konstrueerida kumer hulk. Niisuguse nn. kumera (vastavalt absoluutsest kumera) katte kirjeldamisel on lähtekohaks järgmine lemma.

**Lemma 5.2.** *Olgu  $E$  vektorruumi  $X$  alamhulk.*

- (a) *Kui  $E$  on kumer ja  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  on sellised mittenegatiivsed reaalarvud, et  $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$ , siis  $\lambda_1x_1 + \dots + \lambda_nx_n \in E$  suvaliste punktide  $x_1, \dots, x_n \in E$  korral.*
- (b) *Kui  $E$  on absoluutsest kumer ning  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  on sellised skalaarid, et  $|\lambda_1| + \dots + |\lambda_n| \leq 1$ , siis  $\lambda_1x_1 + \dots + \lambda_nx_n \in E$  suvaliste punktide  $x_1, \dots, x_n \in E$  korral.*

**Tõestus.** Esitame siinkohal väite (a) tõestuse, väide (b) tõestatakse analoogiliselt, mõlemal juhul kasutatakse matemaatilise induktsiooni meetodit. Juhul  $n = 2$  väide ilmselt kehtib, sel juhul taandub ta kumera hulga definitsioonile. Oletame, et väide on õige, kui  $n = m - 1$ , ja näitame, et siis kehtib ta ka juhul  $n = m$ .

Olgu  $\lambda_1, \dots, \lambda_m \geq 0$  ning  $\lambda_1 + \dots + \lambda_m = 1$ , tähistame  $\lambda := \lambda_1 + \dots + \lambda_{m-1}$ . Kui  $\lambda = 0$ , siis suvaliste  $x_1, \dots, x_m \in E$  puhul  $\lambda_m = 1$  ning  $\lambda_1x_1 + \dots + \lambda_mx_m = \lambda_mx_m = x_m \in E$ . Kui  $\lambda \neq 0$ , siis seose  $\sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{\lambda} = 1$  tõttu

$$\sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{\lambda} x_i \in E$$

ning tänu hulga  $E$  kumerusele ja võrdusele  $\lambda + \lambda_m = 1$  saame, et

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i = \lambda \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{\lambda} x_i + \lambda_m x_m \in E.$$

Seega on väide (a) tõestatud. ■

**Definitsioon.** Vektorruumi  $X$  mittetühja hulga  $E$  kumeraks katteks nimetatakse hulka

$$\text{conv}E := \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0, \lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1, x_1, \dots, x_n \in E, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Hulka

$$\text{absconv}E := \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, |\lambda_1| + \dots + |\lambda_n| \leq 1, x_1, \dots, x_n \in E, n \in \mathbb{N} \right\}$$

nimetatakse hulga  $E$  absoluutsest kumeraks katteks.

**Ülesanne 5.1.** Veenduda, et  $E \subset \text{conv}E \subset \text{absconv}E \subset \text{span}E$ .

Märgime, et  $\text{conv}E$  on kumer ning  $\text{absconv}E$  on absoluutsest kumer hulk. Et veenduda näiteks hulga  $\text{conv}E$  kumeruses, võtame tema suvalised punktid  $x = \lambda_1x_1 + \dots + \lambda_nx_n$  ja  $y = \mu_1y_1 + \dots + \mu_my_m$ , kus

$$0 \leq \lambda_i, \mu_k \leq 1, \quad x_i, y_k \in E \quad (i = 1, \dots, n; k = 1, \dots, m), \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{k=1}^m \mu_k = 1.$$

Kui  $\lambda$  ja  $\mu$  on mittenegatiivsed reaalarvud omadusega  $\lambda + \mu = 1$ , siis

$$\lambda x + \mu y = \sum_{i=1}^n \lambda \lambda_i x_i + \sum_{k=1}^m \mu \mu_k y_k,$$

kusjuures  $\lambda\lambda_i \geq 0$ ,  $\mu\mu_k \geq 0$  ja  $\sum_{i=1}^n \lambda\lambda_i + \sum_{k=1}^m \mu\mu_k = \lambda + \mu = 1$ . Niisiis,  $\lambda x + \mu y \in \text{conv } E$ , mis tähendabki, et  $\text{conv } E$  on kumer hulk.

Pole raske tõestada, et  $\text{conv } E$  on **vähim** kumer hulk, mis sisaldab hulka  $E$ . Tõepoolest, kui  $F$  on kumer  $E \subset F$ , siis iga  $x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n \in \text{conv } E$  puhul, kus

$$0 \leq \lambda_i \leq 1, \quad x_i \in E \subset F \quad (i = 1, \dots, n), \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1,$$

kehtib lemma 5.2(a) põhjal soovitud seos  $x \in F$ . Samamoodi veendutakse, et  $\text{absconv } E$  on **vähim** absoluutselt kumer hulk, mis sisaldab hulka  $E$ .

**Ülesanne 5.2.** Näidata, et kui  $E$  on tasakaalus hulk vektorruumis  $X$ , siis ka  $\text{conv } E$  on tasakaalus ja  $\text{absconv } E = \text{conv } E$ .

**Kumera hulga sulund on kumer.** Siiani vaatlesime kumeraid ja absoluutselt kumeraid hulki suvalises vektorruumis. Näitame järgnevalt, et topoloogilises vektorruumis kanduvad alamhulga kumerus ja absoluutne kumerus üle ka tema sulundile.

**Lause 5.3.** *Kui  $E$  on TVR-i  $X$  kumer alamhulk, siis ka tema sulund  $\overline{E}$  on kumer.*

**Tõestus.** Võtame  $x, y \in \overline{E}$  ning  $\lambda, \mu \in [0, 1]$ , et  $\lambda + \mu = 1$ , ja tähistame  $z := \lambda x + \mu y$ . Liitmise pidevuse tõttu saab punkti  $z$  iga ümbruse  $V_z$  jaoks leida punktide  $\lambda x$  ja  $\mu y$  ümbrused  $V_{\lambda x} = \lambda x + U$  ja  $V_{\mu y} = \mu y + V$  nii, et  $V_{\lambda x} + V_{\mu y} \subset V_z$  ning  $U$  ja  $V$  on tasakaalus nulliumbrused TVR-s  $X$ . Eelduse kohaselt

$$(x + U) \cap E \neq \emptyset, \quad (y + V) \cap E \neq \emptyset,$$

seega leiduvad hulgas  $E$  punktid  $x'$  ja  $y'$ , et  $x' \in x + U$  ning  $y' \in y + V$ . Kuna  $E$  on kumer, siis  $\lambda x' + \mu y' \in E$ , teisalt (peame silmas, et  $\lambda U \subset U$  ja  $\mu V \subset V$ )

$$\lambda x' + \mu y' \in (\lambda x + \lambda U) + (\mu y + \mu V) \subset (\lambda x + U) + (\mu y + V) \subset V_z.$$

Niisiis,  $\lambda x' + \mu y' \in V_z \cap E \neq \emptyset$ , mis ütlebki, et  $z \in \overline{E}$ . Seega on  $\overline{E}$  kumer hulk. ■

**Järeldus 5.4.** *Absoluutselt kumera hulga sulund on absoluutselt kumer.*

**Tõestus.** Kui  $E$  on absoluutselt kumer hulk, siis  $\overline{E}$  on kumer ja tasakaalus (vrd. ülesanne 2.3), seega absoluutselt kumer. ■

Olgu  $E_1, \dots, E_n$  absoluutselt kumerad hulgad vektorruumis  $X$ . Näitame, et

$$\text{absconv} \bigcup_{i=1}^n E_i = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mid \sum_{i=1}^n |\lambda_i| \leq 1, x_i \in E_i \right\}. \quad (5.1)$$

Tähistame parempoolse hulga seoses (5.1) tähega  $E$ , lihtne on näha, et  $E \subset \text{absconv} \bigcup_{i=1}^n E_i$

(selgitada!)☒. Olgu  $x = \sum_{k=1}^m \lambda_k x_k$  hulga  $\text{absconv} \bigcup_{i=1}^n E_i$  suvaline element, seega  $\sum_{k=1}^m |\lambda_k| \leq 1$  ja

$x_k \in \bigcup_{i=1}^n E_i$ , seejuures eeldame, et  $x_k \neq 0$  ja  $\lambda_k \neq 0$ . Siis

$$\sum_{k=1}^m \lambda_k x_k = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{k_i} \lambda_j^i x_j^i,$$

kus  $x_j^i \in E_i$  ja  $\lambda_j^i$  on elemendi  $x_j^i$  kordaja summas  $\sum_{k=1}^m \lambda_k x_k$ . Tähistame  $\alpha_i := \sum_{j=1}^{k_i} |\lambda_j^i|$  ning  $z_i := \sum_{j=1}^{k_i} \frac{\lambda_j^i}{\alpha_i} x_j^i$  (peame silmas, et  $\alpha_i \neq 0$  iga  $i = 1, \dots, n$  puhul (selgitada!) $\blacksquare$ ), siis

$$\sum_{i=1}^n |\alpha_i| = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{k_i} |\lambda_j^i| = \sum_{k=1}^m |\lambda_k| \leq 1$$

ja  $z_i \in E_i$  iga  $i = 1, \dots, n$  korral (kontrollida!) $\blacksquare$ , seetõttu

$$\sum_{k=1}^m \lambda_k x_k = \sum_{i=1}^n \alpha_i \left( \sum_{j=1}^{k_i} \frac{\lambda_j^i}{\alpha_i} x_j^i \right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i z_i \in E.$$

Valem (5.1) on tõestatud.

**Lause 5.5.** *Kui  $E_1, \dots, E_n$  on kompaktsed absoluutsest kumerad alamhulgad TVR-s  $X$ , siis on ka  $\text{absconv} \bigcup_{i=1}^n E_i$  kompaktne hulk.*

**Tõestus.** Vaatleme kõigi  $n$ -mõõtmeliste vektorite  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  Banachi ruumi  $\ell_n^1$ , kus norm on defineeritud seosega  $\|\lambda\| := \sum_{k=1}^n |\lambda_k|$ , tema ühikkera

$$B := \left\{ \lambda \in \ell_n^1 \mid \sum_{k=1}^n |\lambda_k| \leq 1 \right\}$$

on kompaktne alamhulk. Moodustame korrutisruumi  $Z := \ell_n^1 \times X \times \dots \times X$ , milles TVR  $X$  esineb komponendina  $n$  korda. Kuna alamhulk  $B \times E_1 \times \dots \times E_n$  on Tihhonovi teoreemi (vt. art. 1.3) põhjal kompaktne korrutisruumis  $Z$  ning kujutus

$$\Phi: Z \rightarrow X, \quad ((\lambda_1, \dots, \lambda_n), x_1, \dots, x_n) \mapsto \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$$

on pidev (kontrollida!) $\blacksquare$ , siis kujutis  $\Phi(B \times E_1 \times \dots \times E_n)$  on kompaktne ruumis  $X$ . Tänu seosele (5.1) kehtib võrdus

$$\Phi(B \times E_1 \times \dots \times E_n) = \text{absconv} \bigcup_{i=1}^n E_i$$

(selgitada!) $\blacksquare$ , seetõttu ongi  $\text{absconv} \bigcup_{i=1}^n E_i$  TVR-s  $X$  kompaktne hulk. ■

## 5.2 Poolnormid ja Minkowski funktsionaalid

**Sublineaarne funktsionaal ja poolnorm.** Kumerate hulkade analüütiliseks kirjeldamiseks kasutatakse spetsiaalseid reaalsete väärustega funktsionaale.

**Definitsioon.** Olgu  $X$  vektorruum. Funktsionaali  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  omadustega

- 1)  $p(\lambda x) = \lambda p(x)$  iga  $x \in X$  ja  $\lambda \geq 0$  korral,
- 2)  $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$  iga  $x, y \in X$  korral

nimetatakse *sublineaarseks*. Kui funktsionaal  $p$  rahuldab tingimusi 2) ja

- 1')  $p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$  iga  $x \in X$  ja  $\lambda \in \mathbb{K}$  korral,  
siis nimetatakse teda *poolnormiks*.

**Ülesanne 5.3.** Näidata, et

- a) suvalise sublineaarse funktsionaali  $p$  puhul  $p(0) = 0$  ja

$$|p(x) - p(y)| \leq \max \{p(x-y), p(y-x)\} \quad (x, y \in X), \quad (5.2)$$

- b) poolnormi  $p$  korral on  $p(x) \geq 0$  iga  $x \in X$  puhul ning

$$|p(x) - p(y)| \leq p(x-y) \quad (x, y \in X),$$

- c) kui  $p$  on poolnorm, siis  $\{x \in X \mid p(x) = 0\}$  on vektoralamruum vektorruumis  $X$ .

**Ülesanne 5.4.** Näidata, et kui  $p$  on poolnorm, siis tema ühikkerad  $\{x \in X \mid p(x) < 1\}$  ja  $\{x \in X \mid p(x) \leq 1\}$  vektorruumis  $X$  on absoluutsest kumerad ja neelavad.

**Hulga Minkowski funktsionaal. Definitsioon.** Olgu  $U$  neelav alamhulk vektorruumis  $X$ . Funktsionaali

$$p_U: X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \inf \{\mu > 0 \mid x \in \mu U\}$$

nimetatakse hulga  $U$  *Minkowski funktsionaaliks*.

**Ülesanne 5.5.** Näidata, et  $p_U(0) = 0$  ja  $0 \leq p_U(x) < \infty$  iga  $x \in X$  korral.

Minkowski funktsionaali kõige olulisemad ja tähelepanuväärsed omadused formulerrime järgmises lauses.

**Lause 5.6.** Olgu  $U$  vektorruumi  $X$  neelav alamhulk.

- (a) Iga  $x \in X$  ja  $\lambda \geq 0$  korral  $p_U(\lambda x) = \lambda p_U(x)$ .
- (b) Kui  $U$  on tasakaalus, siis  $p_U(\lambda x) = |\lambda| p_U(x)$  iga  $x \in X$  ja  $\lambda \in \mathbb{K}$  korral.
- (c) Kui  $U$  on kumer, siis

$$p_U(x+y) \leq p_U(x) + p_U(y) \quad (x, y \in X) \quad (5.3)$$

ning

$$\{x \in X \mid p_U(x) < 1\} \subset U \subset \{x \in X \mid p_U(x) \leq 1\}. \quad (5.4)$$

**Tõestus.** (a) Kui  $\lambda = 0$ , siis  $0 = p_U(0x) = 0p_U(x)$ . Juhul  $\lambda > 0$  saame, et

$$p_U(\lambda x) = \inf \{\mu > 0 \mid \lambda x \in \mu U\} = \inf \left\{ \mu > 0 \mid x \in \frac{\mu}{\lambda} U \right\}$$

$$= \lambda \inf \left\{ \frac{\mu}{\lambda} > 0 \mid x \in \frac{\mu}{\lambda} U \right\} = \lambda p_U(x).$$

(b) Selge, et väide kehtib juhul  $\lambda = 0$ . Tasakaalus hulga  $U$  ja suvalise nullist erineva arvu  $\lambda$  korral kehtib seos  $\lambda U = |\lambda| U$ , seetõttu

$$\begin{aligned} p_U(\lambda x) &= \inf \left\{ \mu > 0 \mid x \in \frac{\mu}{\lambda} U \right\} = \inf \left\{ \mu > 0 \mid x \in \frac{\mu}{|\lambda|} U \right\} \\ &= |\lambda| \inf \left\{ \frac{\mu}{|\lambda|} > 0 \mid x \in \frac{\mu}{|\lambda|} U \right\} = |\lambda| p_U(x) \quad (x \in X). \end{aligned}$$

(c) Eeldame, et  $U$  on kumer hulk. Kontrollime kõigepealt sisalduvusi (5.4). Kui  $p_U(x) < 1$ , siis saame leida  $\mu \in (0, 1)$  omadusega  $x \in \mu U$  ehk  $\frac{1}{\mu} x \in U$ . Hulga  $U$  kumeruse tõttu  $x = \mu \frac{1}{\mu} x + (1 - \mu) 0 \in U$  (peame silmas, et kuna  $U$  on neelav hulk, siis  $0 \in U$ ), niisiis kehtib esimene sisalduvustest (5.4). Teise tõestuseks märgime, et kui  $x \in U = 1U$ , siis  $p_U(x) \leq 1$ .

Seose (5.3) tõestuseks fikseerime elemendid  $x, y \in X$  ja arvu  $\varepsilon > 0$  ning valime  $\lambda > 0$  ning  $\mu > 0$  nii, et

$$p_U(x) < \lambda < p_U(x) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad p_U(y) < \mu < p_U(y) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Kuna  $p_U(x) < \lambda$ , siis  $x \in \lambda U$  (selgitada!) $\blacksquare$  ehk  $\frac{1}{\lambda} x \in U$ , samuti  $\frac{1}{\mu} y \in U$ . Seejuures tänu hulga  $U$  kumerusele

$$\frac{1}{\lambda + \mu} (x + y) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \frac{x}{\lambda} + \frac{\mu}{\lambda + \mu} \frac{y}{\mu} \in U.$$

Niisiis,  $x + y \in (\lambda + \mu) U$ , järelikult  $p_U(x + y) \leq \lambda + \mu \leq p_U(x) + p_U(y) + \varepsilon$  iga  $\varepsilon > 0$  korral, millest tulenebki (5.3). ■

Lauses 5.6 toodud omadustest (a) – (c) tuleneb järgmine väide.

**Järeldus 5.7.** Neelava kumera alamhulga  $U \subset X$  Minkowski funktsionaal  $p_U$  on positiivne sublineaarne funktsionaal, kusjuures kehtivad sisalduvused (5.4). Kui  $U$  on sealjuures tasakaalus, siis  $p_U$  on poolnorm.

**Lause 5.8.** Olgu  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  poolnorm ja  $U := \{x \in X \mid p(x) \leq 1\}$ . Siis hulga  $U$  Minkowski funktsionaal on  $p$ , s.t.  $p_U = p$ .

**Tõestus.** Iseseisvalt. ■

Topoloogilises vektorruumis iseloomustab kumera neelava alamhulga **Minkowski funktsionaali pidevus** selle hulga topoloogilisi omadusi. Nende seoste täpsemaks kirjeldamiseks vajame järgmist lemmat.

**Lemma 5.9.** Olgu  $X$  TVR. Kui sublineaarne funktsionaal  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  on pidev punktis 0, siis on ta pidev ruumis  $X$ .

**Tõestus.** Olgu  $\varepsilon > 0$ . Funktsionaali  $p$  pidevuse tõttu punktis 0 leidub niisugune tasa-kaalus nulliumbrus  $V$ , et  $|p(v)| \leq \varepsilon$  iga  $v \in V$  puhul. Suvalise  $x \in X$  puhul on  $W := x + V$  tema ümbrus ning  $x - z$  ja  $z - x$  kuuluvad nulliumbrusse  $V$  iga  $z \in W$  korral. Seega  $|p(x) - p(z)| \leq \max\{p(x - z), p(z - x)\} \leq \varepsilon$  (vrd. (5.2)), mis tähendabki funktsionaali  $p$  pidevust punktis  $x$ . ■

Lemma 5.9 abil töestame selle artikli **põhitulemuse**.

**Teoreem 5.10.** *TVR-i  $X$  neelav kumer alamhulk  $U$  on nulliumbrus parajasti siis, kui Minkowski funktsionaal  $p_U$  on pidev. Kui  $U$  on lahtine, siis kehtib seos  $U = \{x \in X \mid p_U(x) < 1\}$ , kui  $U$  on kinnine, siis  $U = \{x \in X \mid p_U(x) \leq 1\}$ .*

**Tõestus.** Eeldame, et  $U$  on kumer nulliumbrus TVR-s  $X$ , ning näitame, et  $p_U$  on pidev punktis 0, lemma 5.9 põhjal on ta sel juhul pidev kogu ruumis  $X$ . Tähistame suvalise  $\varepsilon > 0$  korral  $V := \varepsilon U$ . Kuna  $V$  on nulliumbrus ja  $p_U(x) = p_U(\varepsilon u) = \varepsilon p_U(u) \leq \varepsilon$ , kus  $x = \varepsilon u \in V$  ja  $u \in U$  (vrd. (5.4)), siis  $p_U$  on pidev punktis 0.

Vastupidi, kui eeldada, et kumera neelava alamhulga  $U$  Minkowski funktsionaal  $p_U$  on pidev, siis ruumis  $\mathbb{R}$  lahtise hulga  $(-1, 1)$  originaal  $p_U^{-1}((-1, 1))$  on lahtine. Seejuures (vrd. (5.4))

$$0 \in p_U^{-1}((-1, 1)) = \{x \in X \mid p_U(x) < 1\} \subset U,$$

niisiis on  $U$  nulliumbrus.

Kui eeldada, et  $U$  on lahtine, siis iga  $x \in U$  on tema sisepunkt, mistõttu leidub nulliumbrus  $V$  omadusega  $x + V \subset U$ . Kuna  $V$  on neelav, siis saame valida  $\delta > 0$  selliselt, et  $\delta x \in V$ , seega  $(1 + \delta)x = x + \delta x \in x + V \subset U$ . Niisiis,

$$p_U(x) \leq \frac{1}{1 + \delta} < 1 \text{ iga } x \in U \text{ puhul,}$$

s.t.  $U \subset \{x \in X \mid p_U(x) < 1\}$ . Lause 5.6(c) põhjal järeldub siit, et vaadeldavad hulgad langevad kokku.

Kui  $U$  on kinnine ja  $p_U(x) \leq 1$ , siis iga  $\mu \in (0, 1)$  korral  $p_U(\mu x) = \mu p_U(x) \leq \mu < 1$ , s.t.  $\mu x \in \{z \in X \mid p_U(z) < 1\} \subset U$ . Moodustame pere  $(\mu x)_{\mu \in (0,1)}$  ja paneme tähele, et  $\mu x \rightarrow 1x = x$  tänu skalaariga korrutamise pidevusele TVR-s  $X$ . Kuna  $\mu x \in U$  ( $\mu \in (0, 1)$ ), siis  $x \in \overline{U} = U$ . Me töestasime sisalduvuse  $\{x \in X \mid p_U(x) \leq 1\} \subset U$ , kust lause 5.6(c) põhjal tuleneb nende hulkade võrdus. ■

## 6 Hahn-Banachi teoreem

### 6.1 Hahn-Banachi teoreem reaalse vektorruumi puhul

Kõigepealt lepime kokku kahe olulise tähistuse osas, mis puudutavad lineaarseid funktsioonaale topoloogilises vektorruumis.

**TVR-i kaasruum.** Vektorruumi  $X$  *algebraiseks kaasruumiks* nimetatakse kõigi lineaarsete funktsionaalide  $f: X \rightarrow \mathbb{K}$  hulka, seda tähistame edaspidi sümboliga  $X^*$ . Lihtne on veenduda, et  $X^*$  on vektorruum, kui funktsionaalide liitmine ja skalaariga korrutamine defineerida punktiviisi, s.t.

$$(f_1 + f_2)(x) := f_1(x) + f_2(x), \quad (\lambda f_1)(x) := \lambda f_1(x) \quad (f_1, f_2 \in X^*, \lambda \in \mathbb{K}).$$

(kontrollida!)  $\blacksquare$ .

Lineaarsete funktsionaalide pidevuse kontrollimiseks on kasulik järgmine lause.

**Lause 6.1.** *Lineaarne funktsional  $f$  TVR-s  $X$  on pidev parajasti siis, kui ruumis  $X$  leidub selline nulliumbrus  $V$ , milles  $f$  on tõkestatud, s.t.*

$$\exists M > 0 : |f(x)| \leq M \text{ iga } x \in V \text{ korral.}$$

**Tõestus.** Olgu  $f$  lineaarne funktsional TVR-s  $X$ . Kui  $f$  on pidev punktis 0, siis pidevuse definitsiooni kohaselt leidub iga  $\varepsilon > 0$  puhul selline nulliumbrus  $V$ , et  $|f(x)| \leq \varepsilon$  iga  $x \in V$  korral. Seega on  $f$  nulliumbruses  $V$  tõkestatud.

Vastupidi, kui mingi nulliumbruse  $V$  jaoks leidub niisugune  $M > 0$ , et  $|f(x)| \leq M$  iga  $x \in V$  korral, siis tähistame fikseeritud  $\varepsilon > 0$  puhul  $U := \frac{\varepsilon}{M}V$  ning paneme tähele, et  $U$  on nulliumbrus TVR-s  $X$ . Iga  $x = \frac{\varepsilon}{M}v \in V$  korral, kus  $v \in V$ , kehtib võrratus

$$|f(x)| = \frac{\varepsilon}{M} |f(v)| \leq \frac{\varepsilon}{M} M = \varepsilon.$$

Tähendab,  $f$  on pidev punktis 0, kuid siis on ta pidev kogu ruumis  $X$  (vrd. art. 2.1). ■

Kui  $X$  on TVR, siis kõigi pidevate lineaarsete funktsionaalide  $f: X \rightarrow \mathbb{K}$  hulka tähistame  $X'$  ning nimetame TVR-i  $X$  *topoloogiliseks kaasruumiks*, tavaliselt lihtsalt *kaasruumiks*. Selge, et  $X' \subset X^*$ , vahetu kontroll näitab, et  $X'$  on vektorruumi  $X^*$  vektoralamruum (veenduda!)  $\blacksquare$ .

**Funktsionaali ahend ja jätk.** Kui  $X_0$  on vektorruumi  $X$  vektoralamruum ja  $f_0 \in X_0^*$  (s.t.  $f_0$  on lineaarne funktsional vektoralamruumis  $X_0$ ), siis funktsionaali  $f \in X^*$  omadusega

$$\forall x \in X_0 : f(x) = f_0(x)$$

nimetatakse funktsionaali  $f_0$  *jätkuks* (vektorruumi  $X$ ). Funktsionaali  $f_0$  nimetatakse sel juhul funktsionaali  $f$  *ahendiks* alamruumis  $X_0$ , seda asjaolu märgime  $f_0 = f|_{X_0}$ .

Käesoleva *peatiiki eesmärgiks* on tõestada Hahn-Banachi teoreem, millel topoloogiliste vektorruumide teoorias on võtmeroll. Seejuures vaatleme eraldi juhte  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ja  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ .

**Teoreem 6.2 (Hahn-Banachi teoreem juhul  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ).** Olgu  $X$  reaalne vektorruum ja  $X_0$  tema vektoralamruum. Olgu  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  sublineaarne funktsionaal. Kui funktsionaal  $f_0 \in X_0^*$  rahuldab tingimust

$$f_0(x) \leq p(x) \quad (x \in X_0),$$

siis leidub selline  $f \in X^*$ , et

$$f(x) = f_0(x) \quad (x \in X_0) \quad \text{ja} \quad f(x) \leq p(x) \quad (x \in X).$$

**Tõestus.** Tõestuse idee on järgmine. Me vaatleme kõigi selliste järjestatud paaride  $(L, g)$  hulka  $\mathcal{M}$ , kus 1)  $L \subset X$  on hulka  $X_0$  sisaldav vektoralamruum ja 2)  $g: L \rightarrow \mathbb{R}$  on funktsionaali  $f_0$  niisugune jätk, mis rahuldab tingimust  $g(x) \leq p(x)$  iga  $x \in L$  korral. Selles hulgas defineerime (loomulikul viisil) järjestuse ja veendume Zorni lemma abil, et ta sisaldab järjestuse suhtes maksimaalse elemendi  $(Y, h)$ . Osutub, et  $Y = X$  ja  $h$  ongi otsitav jätk  $f$ .

Niisiis, olgu  $\mathcal{M}$  kõigi selliste järjestatud paaride  $(L, g)$  hulk, kus  $L \subset X$  on hulka  $X_0$  sisaldav vektoralamruum ja  $g: L \rightarrow \mathbb{R}$  on selline lineaarne funktsionaal, et  $g|_{X_0} = f_0$  ja  $g(x) \leq p(x)$ , kui  $x \in L$ . Kuna  $(X_0, f_0) \in \mathcal{M}$ , siis  $\mathcal{M} \neq \emptyset$ . Defineerime hulgast  $\mathcal{M}$  järjestuse seosega

$$(L, g) \geq (M, r) : \Leftrightarrow [L \supset M \text{ ja } g|_M = r]$$

(kontrollida järjestusaksioomide täidetust!) $\blacksquare$ . Selle järjestuse suhtes leidub hulgast  $\mathcal{M}$  maksimaalne element. Et selles veenduda, näitame, et iga täielikult järjestatud alamhulk  $\mathcal{M}_0 \subset \mathcal{M}$  on ülalt tõkestatud.

Tähistame  $L_0 := \bigcup \{L \mid (L, g) \in \mathcal{M}_0\}$  ja paneme tähele, et  $L_0$  on vektoralamruum. Tõepoolest, kui  $x, y \in L_0$ , siis leiduvad paarid  $(L, g), (M, r) \in \mathcal{M}_0$  omadusega  $x \in L, y \in M$ . Kuna paarid  $(L, g)$  ja  $(M, r)$  on järjestuse mõttes võrreldavad, siis on vektoralamruumid  $L$  ja  $M$  võrreldavad sisalduvuse mõttes. Olgu  $M \subset L$ , siis  $x, y \in L$ , mistõttu  $x + y, \lambda x \in L \subset L_0$  iga  $\lambda \in \mathbb{R}$  puhul. Seega on  $L_0$  vektoralamruum. Edasi, kui  $x \in L_0$ , siis  $x \in L$ , kus  $(L, g)$  on hulga  $\mathcal{M}_0$  mingi element. Defineerime funktsionaali

$$g_0: L_0 \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto g(x)$$

ja märgime, et  $g_0(x)$  ei sõltu paari  $(L, g) \in \mathcal{M}_0$  valikust: kui ka  $(M, r) \in \mathcal{M}_0$  on selline, et  $x \in M$ , siis paaride  $(L, g)$  ja  $(M, r)$  võrreldavuse tõttu kehtib  $g(x) = r(x)$ . Funktsionaal  $g_0$  on lineaarne, ta on funktsionaali  $f_0$  jätk ja  $g_0(x) \leq p(x)$  iga  $x \in L_0$  puhul. Seega on  $(L_0, g_0)$  hulga  $\mathcal{M}_0$  ülemine tõke. Zorni lemma põhjal leidub hulgast  $\mathcal{M}$  maksimaalne element  $(Y, h)$ . Teoreemi tõestuse lõpuleviimiseks on vaja näidata, et  $Y = X$ , sel juhul  $h$  on otsitav jätk funktsionaalile  $f_0$ .

Oletame vastuväiteliselt, et leidub  $x_0 \in X \setminus Y$ , ja moodustame hulga

$$Y_1 := \{x = \lambda x_0 + y \mid \lambda \in \mathbb{R}, y \in Y\}.$$

See on vektoruumi  $X$  vektoralamruum, kusjuures iga  $x \in Y_1$  korral on tema komponendid  $\lambda$  ja  $y$  üheselt määratud. Tõepoolest, kui  $x = \lambda x_0 + y = \lambda' x_0 + y'$ , siis  $(\lambda - \lambda') x_0 + (y - y') = 0$  ja eeldusel  $\lambda \neq \lambda'$  saaksime  $x_0 = (\lambda - \lambda')^{-1} (y - y') \in Y$ . Näitame, et  $Y_1 = Y$ , see tähendabki seost  $Y = X$ .

Olgu  $y', y'' \in Y$ , siis

$$h(y') + h(y'') = h(y' + y'') \leq p(y' + y'') \leq p(x_0 + y') + p(y'' - x_0)$$

ehk

$$h(y'') - p(y'' - x_0) \leq -h(y') + p(x_0 + y').$$

Seega kehtib võrratus

$$A := \sup_{y'' \in Y} (h(y'') - p(y'' - x_0)) \leq \inf_{y' \in Y} (-h(y') + p(x_0 + y')) =: B.$$

Võtame suvalise  $t_0 \in [A, B]$  ja defineerime alamruumis  $Y_1$  funktsionaali  $h_1$  seosega

$$h_1(x) := \lambda t_0 + h(y) \quad (x = \lambda x_0 + y \in Y_1).$$

Paneme tähele, et  $h_1 \in Y_1^*$ : kui  $x_1 = \lambda_1 x_0 + y_1$  ja  $x_2 = \lambda_2 x_0 + y_2$  on hulgast  $Y_1$ , siis

$$x_1 + x_2 = (\lambda_1 + \lambda_2)x_0 + (y_1 + y_2), \quad \mu x_1 = (\mu \lambda_1)x_0 + (\mu y_1),$$

mistõttu

$$\begin{aligned} h_1(x_1 + x_2) &= (\lambda_1 + \lambda_2)t_0 + h(y_1 + y_2) \\ &= \lambda_1 t_0 + h(y_1) + \lambda_2 t_0 + h(y_2) = h_1(x_1) + h_2(x_2), \\ h_1(\mu x_1) &= \mu \lambda_1 t_0 + h(\mu y_1) = \mu(\lambda_1 t_0 + h(y_1)) = \mu h_1(x_1). \end{aligned}$$

Ilmselt  $h_1|_Y = h$ , näitame, et  $h_1(x) \leq p(x)$  iga  $x \in Y_1$  puhul. Selleks vaatleme eraldi kolme juhtu:

- 1)  $\lambda = 0$ , s.t.  $x \in Y$ , siis  $h_1(x) = h(x) \leq p(x)$ ;
- 2)  $\lambda > 0$ , siis

$$\begin{aligned} h_1(x) &= \lambda t_0 + h(y) \leq \lambda B + h(y) \leq \lambda \left( -h\left(\frac{y}{\lambda}\right) + p\left(x_0 + \frac{y}{\lambda}\right) \right) + h(y) \\ &= \lambda \left( -\frac{1}{\lambda}h(y) + \frac{1}{\lambda}p(\lambda x_0 + y) \right) + h(y) = p(\lambda x_0 + y) = p(x); \end{aligned}$$

- 3)  $\lambda < 0$ , siis

$$\begin{aligned} h_1(x) &= \lambda t_0 + h(y) \leq \lambda A + h(y) \\ &\leq \lambda \left( h\left(-\frac{y}{\lambda}\right) - p\left(-x_0 - \frac{y}{\lambda}\right) \right) + h(y) \quad [\text{tähistame } \mu := -\lambda] \\ &= -\mu \left( h\left(\frac{y}{\mu}\right) - p\left(-x_0 + \frac{y}{\mu}\right) \right) + h(y) \\ &= -\mu \left( \frac{1}{\mu}h(y) - \frac{1}{\mu}p(-\mu x_0 + y) \right) + h(y) \\ &= p(\lambda x_0 + y) = p(x). \end{aligned}$$

Niisiis,  $(Y_1, h_1) \in \mathcal{M}$ . Kui oletada, et leidub  $x_0 \in Y_1 \setminus Y$ , siis  $(Y_1, h_1) \not\geq (Y, h)$ , mis oleks vastuolus elemendi  $(Y, h)$  maksimaalsusega. Järelikult  $Y = X$  ning teoreem on töestatud. ■

**Järeldus 6.3.** Olgu  $X$  reaalne vektorruum. Iga sublineaarse funktsionaali  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  puhul leidub selline funktsionaal  $f \in X^*$ , et  $f(x) \leq p(x)$  iga  $x \in X$  korral.

**Tõestus.** Tõestuseks võtame  $X_0 := \{0\}$  ja rakendame Hahn-Banachi teoreemi. ■

## 6.2 Hahn-Banachi teoreem kompleksse vektorruumi puhul

Kui  $X$  on vektorruum üle korpuse  $\mathbb{C}$ , siis mõistame me skalaariga korrutamise all selles ruumis kompleksarvudega korrutamist. Jättes liitmise ruumis  $X$  samaks, kuid rakendades skalaaridega korrutamisel ainult reaalarve, saame reaalse vektorruumi, mille me tähistame  $X_{\mathbb{R}}$ . Hulkadena (ja Abeli rühmadena) langevad  $X$  ning  $X_{\mathbb{R}}$  kokku, vektorruumidena on nad erinevad. Näiteks suvalise  $x \in X \setminus \{0\}$  korral on  $ix$  mõlema vektorruumi element, kuid ruumis  $X_{\mathbb{R}}$  ei ole ta elemendi  $x$  kordne. Selliselt konstrueeritud reaalset vektorruumi vajame me järgneva teoreemi töestamisel.

**Teoreem 6.4 (Hahn-Banachi teoreem juhul  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ).** Olgu  $X$  vektorruum üle korpuse  $\mathbb{K}$ , kus  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  või  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , ja olgu  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  minge poolnorm. Olgu  $X_0 \subset X$  vektoralamruum ning  $f_0 \in X_0^*$  omadusega

$$|f_0(x)| \leq p(x) \quad (x \in X_0).$$

Siis leidub selline  $f \in X^*$ , et

$$f(x) = f_0(x) \quad (x \in X_0) \quad \text{ja} \quad |f(x)| \leq p(x) \quad (x \in X).$$

**Tõestus.** Vaatleme algul juhtu  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ . Kuna  $f_0(x) \leq |f_0(x)| \leq p(x)$ , kui  $x \in X_0$ , siis teoreemi 6.2 põhjal saame leida  $f \in X^*$ , mis on funktsionaali  $f_0$  jätk ning rahuldab tingimust  $f(x) \leq p(x)$  iga  $x \in X$  korral. Paneme tähele, et  $f(x) = -f(-x) \geq -p(-x) = -p(x)$  ehk  $-p(x) \leq f(x) \leq p(x)$ , seega  $|f(x)| \leq p(x)$  iga  $x \in X$  puhul.

Olgu nüüd  $X$  kompleksi vektorruum. Tähistame  $\varphi_0(x) := \operatorname{Re} f_0(x)$ , siis

$$\begin{aligned} f_0(x) &= \operatorname{Re} f_0(x) + i \operatorname{Im} f_0(x) = \operatorname{Re} f_0(x) - i \operatorname{Re}(if_0(x)) \\ &= \operatorname{Re} f_0(x) - i \operatorname{Re}(f_0(ix)) = \varphi_0(x) - i\varphi_0(ix) \quad (x \in X_0). \end{aligned}$$

Eelduse kohaselt

$$|\varphi_0(x)| = |\operatorname{Re} f_0(x)| \leq |f_0(x)| \leq p(x) \quad (x \in X_0).$$

Väite esimese osa põhjal saame funktsionaalile  $\varphi_0 : X_{0\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$  leida jätku  $\varphi : X_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$  omadusega  $|\varphi(x)| \leq p(x)$ , kui  $x \in X$ . Moodustame lineaarse funktsionaali

$$f : X \rightarrow \mathbb{C}, \quad x \mapsto \varphi(x) - i\varphi(ix)$$

ja märgime, et  $f(x) = f_0(x)$  iga  $x \in X_0$  korral.

Jääb veenduda, et  $|f(x)| \leq p(x)$  kõikide  $x \in X$  puhul. Kuna  $\left\{ \frac{|f(x)|}{f(x)} \mid f(x) \neq 0 \right\}$  sisaldub hulgas  $\{e^{it} \mid t \in \mathbb{R}\}$ , mis on ühikringjoon komplekstasandil  $\mathbb{C}$ , siis saab iga fikseeritud  $x \in X$  korral leida niisuguse  $t \in \mathbb{R}$ , et  $e^{it}f(x) = |f(x)|$  (juhul  $f(x) = 0$  võib  $t$  olla suvaline). Seega  $f(e^{it}x) = e^{it}f(x) \in \mathbb{R}$  ning järelikult

$$\begin{aligned} |f(x)| &= e^{it}f(x) = f(e^{it}x) = \varphi(e^{it}x) \leq p(e^{it}x) \\ &= |e^{it}|p(x) = p(x) \quad (x \in X). \end{aligned}$$

Teoreem on töestatud. ■

### 6.3 Eraldamisteoreemid

**Hüpertasand ja poolruumid TVR-s.** Olgu  $X$  reaalne vektorruum ning  $f \in X^* \setminus \{0\}$ . Tähistame reaalarvu  $\alpha$  puhul

$$[f = \alpha] := \{x \in X \mid f(x) = \alpha\}, \quad [f \leq \alpha] := \{x \in X \mid f(x) \leq \alpha\},$$

samal põhimõttel defineerime ka hulgad  $[f \geq \alpha]$ ,  $[f < \alpha]$ ,  $[f > \alpha]$ . Hulka  $H := [f = \alpha]$  nimetatakse (funktsionaaliga  $f$  ja skalaariga  $\alpha$  määratud) *hüpertasandiks*. Kuna  $f \neq 0$ , siis  $H_0 := [f = 0] \neq X$ , seose

$$H = z + H_0, \text{ kus } z \in H,$$

tõttu saame, et  $H \neq X$  (veenduda!)☒.

Iga hüpertasand määrab nn. *poolruumid*  $[f \leq \alpha]$  ja  $[f \geq \alpha]$  ning *ranged poolruumid*  $[f < \alpha]$  ja  $[f > \alpha]$ . Öeldakse, et hüpertasand  $[f = \alpha]$  eraldab alamhulgad  $A$  ja  $B$  vektorruumis  $X$ , kui kehtib kas võrratus  $A \subset [f \leq \alpha]$  ja  $B \subset [f \geq \alpha]$  või  $B \subset [f \leq \alpha]$  ja  $A \subset [f \geq \alpha]$ . Kui selles definitsioonis on poolruumid võimalik asendada rangete poolruumidega, siis öeldakse, et hüpertasand eraldab hulgad  $A$  ja  $B$  rangelt.

Edaspidi ütleme ka, et funktsionaal  $f \in X^* \setminus \{0\}$  eraldab (rangelt) hulgad  $A$  ja  $B$ , mõeldes seejuures, et hüpertasand  $[f = \alpha]$  mingi  $\alpha \in \mathbb{R}$  korral eraldab (rangelt)  $A$  ja  $B$ .

Topoloogilises vektorruumis on probleem püstitatud teravamalt: *millistel tingimustel saab mittelõikuaid alamhulki eraldada pidevate lineaarsete funktsionaalidega?* Nagu näitab järgmine lause, tähendab see alamhulkade eraldamist **kinniste** hüpertasanditega.

**Lause 6.5.** *Reaalses TVR-s  $X$  on hüpertasand  $H = [f = \alpha]$  kas kinnine või tihe, s.t. kas  $\overline{H} = H$  või  $\overline{H} = X$ . Seejuures on  $H$  kinnine parajasti siis, kui  $f$  on pidev.*

**Tõestus.** Pideva funktsionaali  $f$  korral on  $H$  kinnine, s.t.  $H = \overline{H}$  (kontrollida!)☒.

Näitame, et kui  $f \in X^* \setminus X'$ , siis  $\overline{H_0} = X$ , seega suvalise  $z \in H$  korral

$$\overline{H} = \overline{z + H_0} = z + \overline{H_0} = z + X = X$$

(selgitada!)☒. Kuna  $f$  ei ole pidev punktis 0, siis saame valida sellise pere  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Gamma}$  ja  $\varepsilon > 0$ , et  $x_\alpha \rightarrow 0$ , kuid  $|f(x_\alpha)| > \varepsilon$  iga  $\alpha \in \Gamma$  korral (selgitada!)☒. Olgu  $x \in X$  suvaline, võtame  $w_\alpha := x - \frac{f(x)}{f(x_\alpha)}x_\alpha$ , siis  $w_\alpha \in H_0$  ja  $w_\alpha \rightarrow x$  ruumis  $X$  (kontrollida!)☒. See tähendabki, et  $\overline{H_0} = X$ . ■

Hahn-Banachi teoreemi tegelik tähendus topoloogiliste vektorruumide teorias ilmneb **eraldamisteoreemides**. Arvukatest eraldamisteoreemidest tõestame siinkohal teoreemi 6.7, mis ilmekalt demonstreerib Hahn-Banachi teoreemi rolli seda tüüpiliste teoreemide tõestustes. Lause tõestamiseks vajame järgmist lemmat.

**Lemma 6.6.** *Kui  $G$  on TVR-i  $X$  lahtine alamhulk, siis iga  $f \in X^* \setminus \{0\}$  korral on kujutis-hulk  $f(G)$  lahtine ruumis  $\mathbb{K}$ .*

**Tõestus.** Olgu  $\alpha \in f(G)$  suvaline punkt, näitame, et ta on sisepunkt. Selleks leiame sellise  $\lambda > 0$ , et punkti  $\alpha$  ümbrus

$$\{\alpha + \mu \mid |\mu| \leq \lambda\}$$

sisaldub hulgas  $f(G)$ .

Olgu  $x \in G$  omadusega  $f(x) = \alpha$ . Kuna

$$0 = x - x \in G - x \text{ ja } G - x \text{ on lahtine hulk}$$

(põhjendada!)  $\blacksquare$ , siis  $G - x$  on nulliumbrus TVR-s  $X$ . Edasi, kuna  $f \neq 0$ , siis saab valida  $x_0 \in X$  omadusega  $f(x_0) = 1$ . Nulliumbrus  $G - x$  neelab punkti  $x_0$ :

$$\exists \lambda > 0 : |\mu| \leq \lambda \Rightarrow \mu x_0 \in G - x.$$

Seega, kui  $|\mu| \leq \lambda$ , siis  $\mu = f(\mu x_0) \in f(G - x) = f(G) - f(x)$  ehk  $\alpha + \mu = f(x) + \mu \in f(G)$ , mis tähendabki, et  $\{\alpha + \mu \mid |\mu| \leq \lambda\} \subset f(G)$ . ■

**Teoreem 6.7.** Olgu  $E$  ja  $G$  TVR-i  $X$  kumerad alamhulgad. Eeldame, et  $E \cap G = \emptyset$  ning  $G$  on lahtine. Siis leiduvad sellised  $f \in X'$  ja reaalarv  $t$ , et

$$\operatorname{Re} f(z) < t \leq \operatorname{Re} f(y) \quad \text{iga } z \in G \text{ ja } y \in E \text{ korral.}$$

**Tõestus.** Märgime kõigepealt, et piisab, kui töestame väite juhul  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ . Nimelt võib juhul  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  iga  $f \in X^*$  esitada kujul

$$f(x) = \varphi(x) - i\varphi(ix) \quad (x \in X),$$

kus  $\varphi(x) \in \mathbb{R}$ , ning  $f$  on pidev parajasti siis, kui  $\varphi$  on pidev. Käesoleva väite töestamiseks tulebki meil tegelikult kontrollida  $\varphi = \operatorname{Re} f$  olemasolu.

Valime vabalt punktid  $z_0 \in G$  ja  $y_0 \in E$  ning tähistame  $x_0 := y_0 - z_0$  ja  $C := G - E + x_0$ . Siis

- 1)  $C$  on kumer,
- 2)  $C$  on lahtine, sest  $C = \bigcup \{G - u + x_0 \mid u \in E\}$  ja  $G$  on lahtine,
- 3)  $x_0 \notin C$ , sest vastasel korral  $0 \in G - E$ , mis on võimalik vaid siis, kui  $G \cap E \neq \emptyset$ ,
- 4)  $0 = -x_0 + x_0 \in G - E + x_0$ .

Seega on  $C$  lahtine kumer nulliumbrus TVR-s  $X$ , järelduse 5.7 ja teoreemi 5.10 põhjal on tema Minkowski funktsionaal  $p := p_C$  pidev positiivne sublineaarne funktsionaal, seejuures  $p(x_0) \geq 1$  (vrd. 3)). Moodustame vektoralamruumi  $X_0 := \{x = \lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$  ja defineerime selles lineaarse funktsionaali

$$f_0: X_0 \rightarrow \mathbb{R}, \lambda x_0 \mapsto \lambda.$$

Osutub, et  $f_0(x) \leq p(x)$  iga  $x \in X_0$  puhul. Tõepoolest, juhul  $\lambda \geq 0$  on

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda \leq \lambda p(x_0) = p(\lambda x_0),$$

juhul  $\lambda < 0$  saame, et  $f_0(\lambda x_0) = \lambda < p(\lambda x_0)$ . Rakendades nüüd Hahn-Banachi teoreemi 6.2, jätkame funktsionaali  $f_0$  lineaarselt kogu ruumi  $X$  nii, et jätk  $f \in X^*$  rahuldaks tingimust  $f(x) \leq p(x)$  iga  $x \in X$  korral. Seejuures  $f \in X'$ . Et selles veenduda, paneme tähele, et  $V := C \cap (-C)$  on nulliumbrus TVR-s  $X$ . Kuna  $f(x) \leq p(x) < 1$ , kui  $x \in C$ , siis  $f(x) > -1$ , kui  $x \in (-C)$ , seega  $|f(x)| < 1$  iga  $x \in V$  korral, lausest 6.1 saame funktsionaali  $f$  pidevuse.

Olgu nüüd  $z \in G$  ja  $y \in E$  suvalised elemendid, siis

$$f(z) - f(y) + 1 = f(z - y + x_0) \leq p(z - y + x_0) < 1,$$

sest  $z - y + x_0 \in C$ . Niisiis,  $f(z) < f(y)$  suvaliste  $z \in G$  ja  $y \in E$  puhul. Kuna  $G$  on lahtine TVR-s  $X$ , siis on kujutishulk  $f(G)$  lahtine reaalarvude ruumis  $\mathbb{R}$  (vrd. lemma 6.6). Seepärast

$$f(z) < t \leq f(y) \quad (z \in G, y \in E),$$

kus  $t := \sup \{f(z) \mid z \in G\}$ . Teoreem on tõestatud. ■

**Järeldus 6.8.** *Kui TVR-s  $X$  on olemas mittetrigivialeid lahtisi kumeraid alamhulki, siis leidub selles ruumis määratud mittetrigivialeid pidevaid lineaarseid funktsionaale, s.o. funktsioonide  $f \in X' \setminus \{0\}$ .*

**Tõestus.** Isesisvalt! ■

## 7 Lokaalselt kumerad ruumid

### 7.1 Lokaalselt kumera topoloogia kirjeldamine nulliumbruste baasi ja poolnormide abil

Vaatamata oma elegantsusele, jätab topoloogiliste vektorruumide teooria palju soovida, siisuka teoria loomiseks on topoloogilise vektorruumi mõiste liiga üldine. Tulles korraks tagasi eraldamistoreemi 6.7 juurde, märgime, et selle näiliselt üldine iseloom on mõneti petlik, sest üldjuhul ei pruugi topoloogilises vektorruumis mittetrvialseid kumeraid lahtisi alamhulki olla. Nende olemasoluks on vaja, et selles ruumis oleks mittetrvialseid kumeraid nulliumbrusi. Järelduse 6.8 kohaselt on kumera nulliumbruse olemasolu tihedalt seotud mittetrvialsete pidevate lineaarsete funktsionaalide olemasoluga vaadeldavas ruumis. Allpool näeme (vrd. näide 7.3), et leidub selliseid TVR-e  $X$ , mille puhul  $X' = \{0\}$ .

Nendest märkustest lähtudes, vaatleme järgnevalt lokaalselt kumeraid ruume, nendele on pühendatud kogu ülejäänud osa käesolevast loengukursusest.

**Lokaalselt kumer ruum. Definitsioon.** TVR-i  $X$  nimetatakse *lokaalselt kumeraks ruumiks* (edaspidi lühidalt LKR), kui tal leidub kumeratest alamhulkadest koosnev nulliumbruste baas.

Olgu  $X$  LKR ja  $U$  suvaline nulliumbrus selles ruumis. Vastavalt lausele 2.6 leidub selline (tasakaalus) *kinnine* nulliumbrus  $U_1$ , et  $U_1 \subset U$ . Edasi valime *kumera* nulliumbruse  $V$  omadusega  $V \subset U_1$  ja rakendades veel kord lauset 2.6, leiame tasakaalus nulliumbruse  $U_2$ , mis sisaldub hulgas  $V$ . Tähistame  $W := \overline{\text{conv}U_2}$ , see on *kinnine absoluutsest kumer* nulliumbrus (põhjendada!✿, vrd. ülesanne 5.2 ja järelalus 5.4), kusjuures

$$W \subset \overline{V} \subset \overline{U_1} = U_1 \subset U.$$

Niisiis sisaldab lokaalselt kumeras ruumis iga nulliumbrus kinnist absoluutsest kumerat nulliumbrust. Seega oleme töostenud järgmise olulise väite.

**Lause 7.1.** *Igas LKR-s leidub selline nulliumbruste baas, mis koosneb kinnistest absoluutsest kumeratest hulkadest.*

**Lokaalselt kumera topoloogia defineerimine nulliumbruste (pre)baasi abil.** Olgu  $\mathfrak{B}_0$  neelavate absoluutsest kumerate alamhulkade mittetühi süsteem vektorruumis  $X$ , tähistame

$$\mathfrak{B} := \left\{ \varepsilon \bigcap_{i=1}^n V_i \mid \varepsilon > 0, \quad V_1, \dots, V_n \in \mathfrak{B}_0, \quad n \in \mathbb{N} \right\}. \quad (7.1)$$

Süsteemi  $\mathfrak{B}$  elemendid, s.o. süsteemi  $\mathfrak{B}_0$  elementide kõikvõimalike lõplike ühisade kordsed positiivsete kordajatega, on samuti absoluutsest kumerad alamhulgad. Vahetu kontroll näitab, et  $\mathfrak{B}$  rahuldab teoreemi 2.5 tingimusi **(NB1) – (NB4)** (vt. ülesanne 7.1). Seega on  $\mathfrak{B}$  mingi lokaalselt kumera topoloogia  $\tau$  nulliumbruste baas vektorruumis  $X$ , süsteemi  $\mathfrak{B}_0$  nimetatakse topoloogia  $\tau$  nulliumbruste *prebaasiks* ehk *eelbaasiks*. Pidades silmas lauset 2.7, on lihtne veenduda, et LKR ( $X, \tau$ ) on eralduv parajasti siis, kui

$$\bigcap \{\lambda V \mid \lambda > 0, \quad V \in \mathfrak{B}_0\} = \{0\}. \quad (7.2)$$

Tõepoolest, tingimusest (7.2) tuleneb topoloogia  $\tau$  eralduvus tänu seosele

$$\bigcap \{W \mid W \in \mathfrak{B}\} \subset \bigcap \{\lambda V \mid \lambda > 0, V \in \mathfrak{B}_0\},$$

teisalt, kui  $(X, \tau)$  on eralduv, siis lause 2.7 kohaselt saab suvalise  $x \in X \setminus \{0\}$  korral valida  $\varepsilon > 0$  ja  $V_1, \dots, V_n \in \mathfrak{B}_0$  nii, et  $x \notin \varepsilon \bigcap_{i=1}^n V_i$ . Siit järeltub tingimus (7.2).

Niisiis kehtib järgmine lause.

**Lause 7.2.** *Iga absoluutsest kumerate neelavate alamhulkade süsteem  $\mathfrak{B}_0$  vektorruumis  $X$  määrab selles lokaalselt kumera topoloogia, mis on eralduv parajasti siis, kui  $\mathfrak{B}_0$  rahuldab tingimust (7.2).*

**Ülesanne 7.1.** Veenduda, et eelpool defineeritud süsteem  $\mathfrak{B}$  rahuldab teoreemi 2.5 tingimusi **(NB1)** – **(NB4)**.

Lisame siinkohal olulise **märkuse**. Paneme tähele, et kui almhulkade süsteem  $\mathfrak{B}_0$  on lokaalselt kumera topoloogia  $\tau$  prebaas vektorruumis  $X$  (s.t. seosega (7.1) määratud süsteem  $\mathfrak{B}$  on  $\tau$ -nulliumbruste baas), siis süsteemi  $\mathfrak{B}$  iga alamsüsteem  $\mathfrak{C}_0$ , mis sisaldab süsteemi  $\mathfrak{B}_0$ , on samuti topoloogia  $\tau$  prebaas, s.t.

$$\mathfrak{C} := \left\{ \varepsilon \bigcap_{i=1}^n V_i \mid \varepsilon > 0, V_1, \dots, V_n \in \mathfrak{C}_0, n \in \mathbb{N} \right\}$$

on  $\tau$ -nulliumbruste baas. On selge, et  $\mathfrak{C}$  on mingi lokaalselt kumera topoloogia  $\tau'$  nulliumbruste baas. Lihtne on näha, et  $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{C}$ , seega  $\tau \subset \tau'$ . Vastupidise sisalduvuse töestamiseks võtame suvalise  $W \in \mathfrak{C}$  ja leiame  $V \in \mathfrak{B}$  omadusega  $V \subset W$ . Paneme tähele, et kuna  $\mathfrak{C}_0 \subset \mathfrak{B}$ , siis  $W$  on esitatav kujul

$$W = \varepsilon \bigcap_{i=1}^n \bigcap_{k=1}^{k_i} \varepsilon_i V_k^{(i)}, \text{ kus } \varepsilon > 0, \varepsilon_i > 0 \text{ ja } V_k^{(i)} \in \mathfrak{B}_0.$$

Tänu hulkade  $V_k^{(i)}$  tasakaalustatusele saame sisalduvuse

$$V := \varepsilon' \bigcap_{i=1}^n \bigcap_{k=1}^{k_i} V_k^{(i)} \subset W,$$

kus  $\varepsilon' := \varepsilon \min \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ . Seejuures  $V \in \mathfrak{B}$ .

**Lokaalselt kumera topoloogia defineerimine poolnormide abil.** Lokaalselt kumera ruumi üks tähelepanuväärsmaid omadusi on see, et tema topoloogiat saab kirjeldada ka analüütiliselt, nimelt poolnormide abil.

**Lause 7.3.** (a) *Iga poolnormide süsteem  $\{p_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma}$  vektorruumis  $X$  määrab selles ruumis lokaalselt kumera topoloogia  $\tau$  nulliumbruste baasiga*

$$\mathfrak{B} := \{W_{\varepsilon, \gamma_1, \dots, \gamma_n} \mid \varepsilon > 0, \gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma, n \in \mathbb{N}\}, \quad (7.3)$$

kus

$$W_{\varepsilon, \gamma_1, \dots, \gamma_n} := \left\{ x \in X \mid \max_{1 \leq i \leq n} p_{\gamma_i}(x) \leq \varepsilon \right\}.$$

Seejuures on poolnormid  $p_\gamma$  pidevad topoloogias  $\tau$ . Topoloogia  $\tau$  on eralduv parajasti siis, kui poolnormide süsteem  $\{p_\gamma\}$  eraldab punktid vektorrumis  $X$ , s.t. kui ta rahuldab tingimust

$$\forall x \in X \setminus \{0\} \quad \exists \gamma \in \Gamma : \quad p_\gamma(x) \neq 0. \quad (7.4)$$

(b) Iga lokaalselt kumera topoloogia saab määräata mingi poolnormide süsteemiga  $\{p_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma}$ .

**Tõestus.** (a) Olgu vektorrumis  $X$  määratud poolnormide süsteem  $\{p_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma}$  ning olgu alamhulkade süsteem  $\mathfrak{B}$  defineeritud seosega (7.3). Tähistame iga poolnormi  $p_\gamma$  puhul tema kinnise ühikkera sümboliga  $V_\gamma$ , s.t.

$$V_\gamma := \{x \in X \mid p_\gamma(x) \leq 1\}.$$

Kuna  $V_\gamma$  on absoluutsest kumer neelav alamhulk (vrd. ülesanne 5.4), siis  $\mathfrak{B}_0 := \{V_\gamma \mid \gamma \in \Gamma\}$  määrab vektorrumis  $X$  sellise lokaalselt kumera topoloogia, mille nulliumbruste baasi moodustavad alamhulgad

$$\varepsilon \bigcap_{i=1}^n V_{\gamma_i} = W_{\varepsilon, \gamma_1, \dots, \gamma_n} \quad (\varepsilon > 0, \quad \gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma, \quad n \in \mathbb{N}) \quad (7.5)$$

(vrd. lause 7.2). Seejuures rahuldab prebaas  $\mathfrak{B}_0$  LKR-i  $(X, \tau)$  eralduvuseks tarvilikku ja piisavat tingimust (7.2) parajasti siis, kui poolnormide süsteem  $\{p_\gamma\}$  rahuldab tingimust (7.4):

$$\begin{aligned} (7.2) \Leftrightarrow & \forall x \in X \setminus \{0\} \quad \exists \gamma \in \Gamma \quad \exists \lambda > 0 : \quad x \notin \lambda V_\gamma \\ \Leftrightarrow & \forall x \in X \setminus \{0\} \quad \exists \gamma \in \Gamma \quad \exists \lambda > 0 : \quad p_\gamma(x) > \lambda \quad \Leftrightarrow \quad (7.4). \end{aligned}$$

Poolnormide  $p_\gamma$  pidevus järeldub teoreemist 5.10, sest  $p_\gamma$  on hulga  $V_\gamma$  Minkowski funktsionaal:

$$\begin{aligned} p_{V_\gamma}(x) &= \inf \{\mu > 0 \mid x \in \mu V_\gamma\} = \inf \{\mu > 0 \mid p_\gamma(x) \leq \mu\} \\ &= p_\gamma(x) \quad (x \in X). \end{aligned}$$

(b) Olgu  $(X, \tau)$  LKR ja olgu  $\mathfrak{B}$  selle ruumi nulliumbruste baas, mis koosneb kinnistest absoluutsest kumeratest alamhulkadest. Moodustame hulkade  $V \in \mathfrak{B}$  Minkowski funktsionaalid  $p_V$ , need on pidevad poolnormid, kusjuures  $V = \{x \in X \mid p_V(x) \leq 1\}$  (vrd. teoreem 5.10). Väite (a) kohaselt määrab see poolnormide süsteem  $\{p_V\}_{V \in \mathfrak{B}}$  vektorrumis  $X$  lokaalselt kumera topoloogia  $\tau_1$  nulliumbruste baasiga

$$\mathfrak{B}_1 := \left\{ \varepsilon \bigcap_{i=1}^n V_i \mid \varepsilon > 0, \quad V_1, \dots, V_n \in \mathfrak{B}, \quad n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Kuna  $\mathfrak{B}$  on topoloogia  $\tau_1$  prebaas, siis määrvavad  $\mathfrak{B}$  ja  $\mathfrak{B}_1$  ühe ja sama topoloogia, s.t.  $\tau_1 = \tau$ . Teoreem on tõestatud. ■

**Lepime kokku** kasutada edaspidi väljendeid *lokaalselt kumer topoloogia on määratud (pre)baasiga  $\mathfrak{B}$  ja lokaalselt kumer topoloogia on määratud poolnormide süsteemiga  $\{p_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma}$*  just selles tähduses, nagu on kasutatud lausetes 7.2 ja 7.3.

Olgu  $\{p_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma}$  ja  $\{q_\delta\}_{\delta \in \Delta}$  kaks poolnormide süsteemi vektorruumis  $X$ . Paneme tähele, et kui  $\{p_\gamma\} \subset \{q_\delta\}$ , siis nende poolt määratud vastavad lokaalselt kumerad topoloogiad  $\tau$  ja  $\tau'$  rahuldavad seost  $\tau \subset \tau'$ . Et selles veenduda, fikseerime suvalise  $\tau$ -nulliumbruse  $W$  ning näitame, et ta on ka  $\tau'$ -nulliumbrus. Kuna hulgad (7.5) moodustavad topoloogias  $\tau$  nulliumbruste baasi, siis leiduvad sellised  $\varepsilon > 0$  ja  $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$ , et  $W_{\varepsilon, \gamma_1, \dots, \gamma_n} = \varepsilon \bigcap_{i=1}^n V_{\gamma_i} \subset W$ . Eelduse kohaselt  $p_{\gamma_1}, \dots, p_{\gamma_n} \in \{q_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ , seetõttu on hulgad  $V_{\gamma_1}, \dots, V_{\gamma_n}$  ka  $\tau'$ -nulliumbrused. Järelikult on  $W_{\varepsilon, \gamma_1, \dots, \gamma_n}$  ja seega ka hulk  $W$   $\tau'$ -nulliumbrus.

**Lause 7.4.** *Olgu  $(X, \tau)$  LKR ja olgu  $\mathcal{P}$  kõigi pidevate poolnormide  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  süsteem. Siis süsteemi  $\mathcal{P}$  poolt määratud lokaalselt kumer topoloogia langeb kokku esialgse topoloogiaga  $\tau$ .*

**Tõestus.** Olgu  $\tau_0$  poolnormide süsteemiga  $\mathcal{P}$  määratud lokaalselt kumer topoloogia, fikseerime mingi poolnormide süsteemi  $\{p_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma}$ , mis määrab lähtetopoloogia  $\tau$  (vrd. lause 7.3(b)). Kuna kõik poolnormid  $p_\gamma$  on lause 7.3(a) põhjal  $\tau$ -pidevad, siis  $\{p_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma} \subset \mathcal{P}$  ja eelneva märkuse kohaselt  $\tau \subset \tau_0$ . Vastupidise sisalduvuse kontrollimiseks paneme kõigepealt tähele, et  $p^{-1}((-1, 1))$  on iga  $p \in \mathcal{P}$  puhul lahtine hulk LKR-s  $(X, \tau)$  ja

$$0 \in p^{-1}((-1, 1)) \subset V_p := \{x \in X \mid p(x) \leq 1\},$$

järelikult on  $V_p$   $\tau$ -nulliumbrus iga  $p \in \mathcal{P}$  korral. Seega on ka kõik hulgad

$$\varepsilon \bigcap_{i=1}^n V_{p_i} (\varepsilon > 0, p_1, \dots, p_n \in \mathcal{P}, n \in \mathbb{N}),$$

mis moodustavad topoloogias  $\tau_0$  nulliumbruste baasi,  $\tau$ -nulliumbrused. See tähendabki sisalduvust  $\tau_0 \subset \tau$ . ■

## 7.2 Koonduvus ja tõkestatuse lokaalselt kumeras ruumis

Lokaalselt kumerat topoloogiat kirjeldavate poolnormide abil on lihtne uurida perede (s.h. jadade) koonduvust ning alamhulkade tõkestatust selles topoloogias.

**Lause 7.5.** *Olgu LKR-i  $(X, \tau)$  topoloogia määratud poolnormide süsteemiga  $\{p_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma}$ .*

(a) *Elementide pere  $(x_\alpha)_{\alpha \in A}$  koondub punktiks  $x$  ruumis  $X$  parajasti siis, kui*

$$\lim_{\alpha \in A} p_\gamma(x_\alpha - x) = 0 \text{ iga } \gamma \in \Gamma \text{ korral.} \quad (7.6)$$

(b) *Alamhulk  $E \subset X$  on tõkestatud ruumis  $X$  parajasti siis, kui iga poolnorm  $p_\gamma$  on selles hulgas tõkestatud, s.t. kui*

$$\sup_{x \in E} p_\gamma(x) < \infty \text{ iga } \gamma \in \Gamma \text{ korral.} \quad (7.7)$$

**Tõestus.** (a) *Tarvilikkus.* Kuna poolnormid  $p_\gamma$  on  $\tau$ -pidevad, siis eeldusest  $x_\alpha - x \rightarrow 0$  järeldub, et  $p_\gamma(x_\alpha - x) \rightarrow 0$  kõikide  $\gamma \in \Gamma$  korral.

*Piisavus.* Eeldame, et tingimus (7.6) on täidetud. Moodustame nulliumbruste baasi  $\mathfrak{B}$  nii nagu lauses 7.3(a). Olgu  $V = \left\{ x \in X \mid \max_{1 \leq i \leq n} p_{\gamma_i}(x) \leq \varepsilon \right\}$ , kus  $\varepsilon > 0$  ja  $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$ , baasi  $\mathfrak{B}$  mingi element. Iga  $i = 1, \dots, n$  puhul saame leida sellise indeksi  $\alpha_i \in A$ , et

$$\alpha \geq \alpha_i \Rightarrow p_{\gamma_i}(x_\alpha - x) \leq \varepsilon.$$

Kui  $\alpha_0 \geq \alpha_i$  iga  $i = 1, \dots, n$  korral, siis

$$\alpha \geq \alpha_0 \Rightarrow \max_{1 \leq i \leq n} p_{\gamma_i}(x_\alpha - x) \leq \varepsilon,$$

s.t.  $x_\alpha - x \in V$ , kui  $\alpha \geq \alpha_0$ . Niisiis,  $x_\alpha \rightarrow x$  LKR-s  $X$ .

(b) *Tarvilikkus.* Olgu  $E \subset X$  tõkestatud alamhulk. Tähistame suvalise  $\gamma \in \Gamma$  korral

$$V_\gamma := \{x \in X \mid p_\gamma(x) \leq 1\},$$

see on nulliumbrus tänu poolnormi  $p_\gamma$  pidevusele (selgitada!) $\blacksquare$ . Kuna  $E$  on tõkestatud, siis saab leida niisuguse  $\lambda > 0$ , et  $\lambda E \subset V_\gamma$ , s.t.

$$p_\gamma(x) \leq \frac{1}{\lambda} \quad (x \in E).$$

Seega kehtib (7.7).

*Piisavus.* Eeldame, et tingimus (7.7) on täidetud. Olgu  $W$  suvaline  $\tau$ -nulliumbrus, siis leiduvad sellised  $\varepsilon > 0$  ja  $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$ , et  $W_{\varepsilon, \gamma_1, \dots, \gamma_n} = \varepsilon \bigcap_{i=1}^n V_{\gamma_i} \subset W$ . Kuna poolnormid  $p_{\gamma_1}, \dots, p_{\gamma_n}$  rahuldavad tingimust (7.7), siis leiduvad positiivsed arvud  $M_1, \dots, M_n$  omadusega

$$p_{\gamma_i}(x) \leq M_i \quad (i = 1, \dots, n, x \in E),$$

seega

$$\max_{1 \leq i \leq n} p_{\gamma_i}(x) \leq M := \max_{1 \leq i \leq n} M_i \quad (x \in E).$$

Olgu  $\lambda := \frac{\varepsilon}{M}$ , siis iga  $z := \lambda x \in \lambda E$  korral

$$\max_{1 \leq i \leq n} p_{\gamma_i}(z) = \lambda \max_{1 \leq i \leq n} p_{\gamma_i}(x) \leq \frac{\varepsilon}{M} M = \varepsilon \quad (x \in E),$$

s.t.  $\lambda E \subset W_{\varepsilon, \gamma_1, \dots, \gamma_n} \subset W$ . Näeme, et  $E$  on tõkestatud. ■

**Lause 7.6.** (a) *Kui  $E$  on tõkestatud alamhulk LKR-s  $X$ , siis ka tema absoluutsest kumer kate  $\text{absconv}E$  on tõkestatud.*

(b) *Kui  $E$  on täielikult tõkestatud alamhulk LKR-s  $X$ , siis ka tema absoluutsest kumer kate  $\text{absconv}E$  on täielikult tõkestatud.*

**Tõestus.** (a) Olgu  $\mathfrak{B}$  ruumi  $X$  nulliumbruste baas lahtistest absoluutsest kumeratest hulkadest. Kui  $E \subset X$  on tõkestatud, siis suvalise fikseeritud  $V \in \mathfrak{B}$  korral leidub  $\lambda > 0$ , et  $E \subset \lambda V$ . Seega  $\text{absconv}E \subset \text{absconv}\lambda V = \lambda V$ , s.t.  $\text{absconv}E$  on tõkestatud.

(b) Olgu  $E \subset X$  täielikult tõkestatud, olgu  $V \in \mathfrak{B}$ . Valime  $U \in \mathfrak{B}$  omadusega  $U+U \subset V$  ning  $x_1, \dots, x_n \in E$  nii, et  $E \subset \bigcup_{i=1}^n (x_i + U)$ . Moodustame

$$H := \text{absconv} \{x_1, \dots, x_n\}$$

ja näitame kõigepealt, et  $H$  on kompaktne alamhulk LKR-s  $X$ . Selleks vaatleme normeeritud ruumi  $\ell_n^1$ , s.o. vektorruumi  $\mathbb{K}^n$  normiga  $\|\lambda\| := \sum_{k=1}^n |\lambda_k|$ , kus  $\lambda := (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ . Defineerime lineaarse kujutuse

$$\Phi: \ell_n^1 \rightarrow X, \quad \lambda \mapsto \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k.$$

See kujutus on pidev punktis 0: kui  $(\lambda^{(\alpha)})$  on selline elementide  $\lambda^{(\alpha)} := (\lambda_1^{(\alpha)}, \dots, \lambda_n^{(\alpha)})$  pere normeeritud ruumis  $\ell_n^1$ , mis koondub punktiks 0, siis arvpere  $(\lambda_k^{(\alpha)})$  koondub arvuks 0 iga  $k = 1, \dots, n$  korral, mistõttu

$$\Phi(\lambda^{(\alpha)}) = \sum_{k=1}^n \lambda_k^{(\alpha)} x_k \rightarrow 0 \text{ LKR-s } X.$$

Edasi paneme tähele, et  $H = \Phi(B)$ , kus  $B := \{\lambda \in \ell_n^1 \mid \|\lambda\| \leq 1\}$  on lõplikumõõtmelise normeeritud ruumi  $\ell_n^1$  kinnine ühikkera, seega kompaktne hulk. Järelikult  $H$  kui kompaktse hulga pidev kujutis on tõepoolest kompaktne hulk ruumis  $X$ .

Moodustame hulga  $H$  lahtise katte  $\bigcup \{z + U \mid z \in H\}$ , see sisaldab kompaktsuse tõttu lõpliku osakatte  $\bigcup \{z_l + U \mid l = 1, \dots, r\}$ . Seega

$$\begin{aligned} \text{absconv} E &\subset \text{absconv} \bigcup_{i=1}^n (x_i + U) \subset \text{absconv} \{x_1, \dots, x_n\} + \text{absconv} U \\ &= H + U \subset \bigcup_{l=1}^r z_l + U + U \subset \bigcup_{l=1}^r z_l + V. \end{aligned}$$

Kokkuvõttes, iga nullüümbruse  $V$  puhul leidub lõplik alamhulk  $\{z_1, \dots, z_r\} \subset \text{absconv} E$ , et  $\text{absconv} E \subset \bigcup_{l=1}^r z_l + V$ . See tähendabki, et  $\text{absconv} E$  on täielikult tõkestatud. ■

### 7.3 Metriseeruvad ja normmeeruvad lokaalselt kumerad ruumid

Teoreemi 4.2 järgi on TVR  $X$  metriseeruv parajasti siis, kui ta on eralduv ja tal on loenduv nullüümbruste baas. Lihtne on kontrollida, et igas metriseeruvas LKR-s  $X$  on selline loenduv nullüümbruste baas  $\mathfrak{B} = \{V_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ , mis koosneb (kinnistest) absoluutsest kumeratest hulkkadest (selgitada!)☒. Kuna poolnormide süsteem  $\{p_{V_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ , kus  $p_{V_n}$  on hulga  $V_n$  Minkowski funktsionaal, määrab ruumi  $X$  topoloogia (vrd. lause 7.3(b) tõestus), siis võime väita, et iga metriseeruva lokaalselt kumera topoloogia saab määrrata loenduva poolnormide süsteemiga.

Olgu nüüd  $(X, \tau)$  selline eralduv LKR, mille topoloogia on määratud mingi loenduva poolnormide süsteemiga  $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ . Tähistame

$$d(x, y) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{p_n(x - y)}{1 + p_n(x - y)} \quad (x, y \in X), \quad (7.8)$$

see on **nihke suhtes invariantne meetrika** vektorruumis  $X$  (kontrollida!)\(\blacksquare\). Ta määrab metriseeruva topoloogia  $\tau_1$ , kusjuures mingi elementide pere  $(x_\alpha)_{\alpha \in A}$  puhul

$$\lim_{\alpha \in A} d(x_\alpha, 0) = 0 \Leftrightarrow \lim_{\alpha \in A} p_n(x_\alpha) = 0 \quad (n \in \mathbb{N}) \quad (7.9)$$

(kontrollida!)\(\blacksquare\). Teisi sõnu,  $x_\alpha \rightarrow 0$  topoloogias  $\tau_1$  parajasti siis, kui  $x_\alpha \rightarrow 0$  topoloogias  $\tau$ . Seega nii ühikoperaator  $i: (X, \tau) \rightarrow (X, \tau_1)$  kui ka tema pöördoperaator  $i^{-1}$  on pidevad punktis 0, s.t.  $\tau = \tau_1$ .

Me oleme tõestanud järgmise olulise lause.

**Lause 7.7.** *Eralduv lokaalselt kumer ruum on metriseeruv parajasti siis, kui tema topoloogia saab määrrata loenduva (või lõpliku) poolnormide süsteemiga.*

**Näide 7.1.** Vaatleme veel kord peatükis 4 toodud näites 4.1 käsitletud TVR-i  $C(\mathbb{C})$ . Kuna alamhulgad

$$V_{n,i} := \left\{ x = x(t) \mid |x(t)| \leq \frac{1}{i}, \text{ kui } |t| \leq n \right\} \quad (n, i \in \mathbb{N}),$$

mis moodustavad loenduva nulliumbruste baasi, on absoluutsest kumerad, siis on tegemist metriseeruva lokaalselt kumera ruumiga.

**Normeeruvad LKR-d.** Lihtne on näha (kontrollida!)\(\blacksquare\), et kui eralduv lokaalselt kumer topoloogia  $\tau$  vektorruumis  $X$  on määratud **lõpliku** poolnormide süsteemiga  $\{p_1, \dots, p_m\}$ , siis funktsionaal

$$p: X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \max_{1 \leq i \leq m} p_i(x)$$

on norm ning  $(X, p)$  on normeeritud ruum. Sel juhul ütleme, et TVR  $(X, \tau)$  on *normeeruv*. Kerkib küsimus, kuidas topoloogiliste vektorruumide hulgas normeeruvaid ruume ära tunda. Vastuse annab järgmine lause.

**Lause 7.8 (Kolmogorovi teoreem).** *Eralduv TVR  $(X, \tau)$  on normeeruv parajasti siis, kui tal on tõkestatud kumeraid nulliumbrusi.*

**Tõestus.** *Tarvilikkus.* Normeeritud ruumi ühikkera on tõkestatud kumer nulliumbrus (vrd. ülesanne 5.4).

**Piisavus.** Olgu  $V$  tõkestatud kumer nulliumbrus eralduvas TVR-s  $X$ . Lause 2.3(b) kohaselt sisaldab  $V$  tasakaalus nulliumbrust  $V_1$ . Tähistame  $U := \overline{\text{conv } V_1}$ , see on kinnine absoluutsest kumer nulliumbrus, seejuures tõkestatud (põhjendada!)\(\blacksquare\). Hulga  $U$  Minkowski funktsionaal  $p_U$  on järelduse 5.7 põhjal poolnorm. Näitame, et  $p_U$  on norm, selleks on vaja kontrollida implikatsiooni

$$p_U(x) = 0 \Rightarrow x = 0. \quad (7.10)$$

Kõigepealt märgime, et kuna  $U$  on tõkestatud hulk, siis iga nulliumbruse  $W$  korral saab valida arvu  $\varepsilon > 0$  omadusega  $\varepsilon U \subset W$ . Seega on  $\{\varepsilon U \mid \varepsilon > 0\}$   $\tau$ -nulliumbruste baas, mistõttu (vrd. lause 2.7)  $\bigcap \{\varepsilon U \mid \varepsilon > 0\} = \{0\}$ . Niisiis, kui  $x \neq 0$ , siis leidub niisugune  $\varepsilon > 0$ , et  $x \notin \varepsilon U$ , s.t.  $p_U(x) \neq 0$ . Seega on implikatsioon (7.10) õige. Tähendab,  $(X, p_U)$  on normeeritud ruum ühikkeraga  $U$  (vrd. teoreem 5.10) ja kuna  $\{\varepsilon U \mid \varepsilon > 0\}$  on  $\tau$ -nulliumbruste baas, siis normi poolt määratud topoloogia langeb esialgse topoloogiaga kokku. ■

**Järeldus 7.9.** *Eralduv lokaalselt kumer ruum on normeeruv parajasti siis, kui tal on tõkestatud nulliumbrus.*

Siinkohal on vajalik juhtida tähelepanu **erinevusele normeeritud ruumi ja lokaalselt tõkestatud ruumi vahel** (vrd. pt. 4). Loomulikult on iga normeeritud ruum lokaalselt tõkestatud, täpsemalt öeldes, lokaalselt tõkestatud ruum on normeeritud ruum parajasti siis, kui ta on lokaalselt kumer. Seda, et eksisteerib lokaalselt tõkestatud ruume, mis ei ole lokaalselt kumerad, näitab järgmine näide.

**Näide 7.2.** Vaatleme vektorruumi  $\ell^p$ , mille elementideks on arvjadad  $x = (x_k)$  omadusega

$$|x| := \sum_k |x_k|^p < \infty,$$

olgu seejuures  $0 < p < 1$ . Reaalarvude  $a, b \geq 0$  puhul kehtib võrratus  $(a + b)^p \leq a^p + b^p$ , millest saame seose

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

See tähendab, et  $\ell^p$  on vektorruum, milles soega  $\xi \mapsto |\xi|$  määratud funktsionaal on pseudonorm (veenduda!)☒, seega on  $\ell^p$  metriseeruv TVR meetrikaga

$$d(x, y) := |x - y| = \sum_k |x_k - y_k|^p \quad (x, y \in \ell^p).$$

Saab näidata, et meetriline ruum  $\ell^p$  on täielik. Meie jaoks on olulisem see fakt, et  $\ell^p$  ei ole lokaalselt kumer. Vaatleme elemente  $e^i := (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ , mille  $i$ -s koordinaat on 1 ja  $i \in \mathbb{N}$ . Kuna  $d(e^i, 0) = 1$  iga  $i$  korral, siis hulk  $\{e^i \mid i \in \mathbb{N}\}$  on ruumis  $\ell^p$  tõkestatud, kuid tema kumer kate  $\text{conv}\{e^i \mid i \in \mathbb{N}\}$  ei ole tõkestatud. Nimelt on kumerate kombinatsioonide  $x^{(n)} := \frac{1}{n}(e^1 + \dots + e^n)$  jada ruumis  $\ell^p$  tõkestamata, kuna

$$|x^{(n)}| = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n}\right)^p = \frac{n}{n^p} = n^{1-p} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

Lause 7.6(a) järgi ei ole  $\ell^p$  LKR.

Märgime, et ruumid  $\ell^p$  on juhul  $0 < p < 1$  tähelepanuväärsed eeskätt kui metriseeruvad TVR-d, mis ei ole lokaalselt kumerad. Hoopis olulisemad ja huvitavamad on ruumid  $\ell^p$ , kui  $1 \leq p < \infty$ , sel juhul saame tuntud ja põhjalikult uuritud Banachi ruumid.

## 7.4 Lokaalselt kumera ruumi kaasruum

Eralduvate lokaalselt kumerate ruumide üks tähtsamaid eeliseid ülejäänuud topoloogiliste vektorruumide ees on see, et neil on ”palju” pidevaid lineaarseid funktsionaale. Vektorruumi  $X$  algebralise kaasruumi  $X^*$  alamruumi  $Y$  elementide rohkuse mõõduks on see, milliseid eraldamisteoreeme see alamruum rahuldab.

**Definitsioon.** Öeldakse, et vektoralamruum  $Y \subset X^*$  eraldab punktid vektorruumis  $X$ , kui suvaliste  $x, y \in X$  korral, kus  $x \neq y$ , leidub funktsionaal  $f \in Y$  omadusega  $f(x) \neq f(y)$ .

Ilmselt on see tingimus samaväärne nõudega

$$\forall x \in X \setminus \{0\} \quad \exists f \in Y : \quad f(x) \neq 0.$$

**Lause 7.10.** Vektorruumi  $X$  algebraline kaasruum  $X^*$  eraldab punktid vektorruumis  $X$ .

**Tõestus.** Fikseerime vektorruumis  $X$  mingi algebralise baasi  $E$ . Siis iga elemendi  $x \in X$  korral leiduvad  $n \in \mathbb{N}$ , elemendid  $a_1, \dots, a_n$  hulgast  $E$  ja skalarid  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  nii, et

$$x = \sum_{k=1}^n \lambda_k a_k, \tag{7.11}$$

kusjuures see esitus on ühene. Olgu  $x_0 \in X \setminus \{0\}$  fikseeritud, siis baasis  $E$  leidub mingi element  $a$ , mis kuulub elemendi  $x_0$  esitusse (7.11) ja talle vastav kordaja on nullist erinev. Niisiis, elemendi  $x_0$  esituses (7.11) leidub selline  $k_0 \in \{1, \dots, n\}$ , et  $a = a_{k_0}$  ja  $\lambda_{k_0} \neq 0$ . Defineerime nüüd funktsionaali  $f: X \rightarrow \mathbb{K}$  järgmiselt: suvalise  $x \in X$  puhul on  $f(x)$  baasi-elemendi  $a$  kordaja elemendi  $x$  esituses (7.11), kui  $a$  kuulub sellesse esitusse, kui ta ei kuulu, siis  $f(x) := 0$ . Saab näidata, et  $f$  on lineaarne, s.t.  $f \in X^*$  (kontrollida!)  $\blacksquare$ . Seejuures  $f(x_0) = \lambda_{k_0} \neq 0$ . ■

See, **kas topoloogilise vektorruumi topoloogiline kaasruum eraldab punktid**, osutub põhimõttelise tähtsusega küsimuseks vaadeldavas teorias. Meie eesmärk on näidata, et eralduva lokaalselt kumera ruumi korral on vastus sellele küsimusele positiivne. Lisaks sellele tõestame veel kaks meile edaspidi vajalikku eraldamisteoreemi.

Alustame järgmise olulise faktiga.

**Lause 7.11.** Lineaarne funktsionaal  $f$  LKR-s  $X$  on pidev parajasti siis, kui leidub selline pidev poolnorm  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ , et  $|f(x)| \leq p(x)$  iga  $x \in X$  korral.

**Tõestus.** Iseseisvalt!  $\blacksquare$  ■

Selle väite abil on lihtne Hahn-Banachi teoreemist saada järgmine lause, mida võiks nimetada **funktsionaali pideva jätkamise printsibiks** lokaalselt kumerates ruumides.

**Lause 7.12.** Olgu  $X_0$  LKR-i  $X$  vektoralamruum. Iga  $f_0 \in (X_0)'$  korral leidub  $f \in X'$  omadusega

$$f(x) = f_0(x) \quad (x \in X_0).$$

**Tõestus.** Olgu  $\mathfrak{B}$  absoluutsest kumeratest nulliumbrustest koosnev baas ruumis  $X$ , sel juhul  $\mathfrak{B}_0 := \{U \cap X_0 \mid U \in \mathfrak{B}\}$  on alamruumi  $X_0$  nulliumbruste baas. Kuna  $f_0 \in (X_0)'$ , siis lause 6.1 kohaselt leidub niisugune  $V \in \mathfrak{B}$ , et  $|f_0(x)| \leq 1$  kõikide  $x \in V \cap X_0$  puhul. Moodustame hulga  $V$  Minkowski funktsionaali  $p_V$ , see on pidev poolnorm (vrd. teoreem 5.10). Edasi, iga  $x \in X_0$  jaoks saab leida positiivse arvu  $\alpha$  omadusega  $x \in \alpha V$ , seega  $|f_0(x)| = |f_0(\alpha v)| = \alpha |f_0(v)| \leq \alpha$ , kus  $x = \alpha v$  ja  $v \in V \cap X_0$ . Saame võrratuse

$$|f_0(x)| \leq \inf \{\alpha > 0 \mid x \in \alpha V\} = p_V(x) \quad (x \in X_0).$$

Tõestuse lõpuleviimiseks rakendame teoreemi 6.4 ning jätkame funktsionaali  $f_0$  kogu ruumi  $X$  nii, et saadud jätk  $f \in X^*$  rahuldaks võrratust  $|f(x)| \leq p_V(x)$  iga  $x \in X$  korral. Kuna  $p_V$  on pidev poolnorm, siis lause 7.11 põhjal  $f \in X'$ . ■

Tõestatud lause võimaldab anda vastuse eespool püstitatud küsimusele pidevate lineaarsete funktsionaalide rohkuse kohta lokaalselt kumeras ruumis.

**Teoreem 7.13.** *Eralduva LKR-i  $X$  kaasruum  $X'$  eraldab punktid ruumis  $X$ .*

**Tõestus.** Võtame suvalise punkti  $x_0 \in X \setminus \{0\}$  ning pideva poolnormi  $p : X \rightarrow \mathbb{R}$  omadusega  $p(x_0) \neq 0$  (vrd. lause 7.3). Meie eesmärk on leida niisugune  $f \in X'$ , mille korral  $f(x_0) \neq 0$ . Moodustame alamruumi  $X_0 := \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$  ning defineerime funktsionaali

$$f_0 : X_0 \rightarrow \mathbb{K}, \quad \lambda x_0 \mapsto \lambda p(x_0).$$

Ilmselt on  $f_0$  lineaarne, lause 7.11 kohaselt on ta ka pidev, sest

$$|f_0(\lambda x_0)| = |\lambda| p(x_0) = p(\lambda x_0) \quad (\lambda \in \mathbb{K}).$$

Rakendades lauset 7.12, leiame funktsionaali  $f_0$  jätku  $f \in X'$ , siis  $f(x_0) = p(x_0) \neq 0$ . ■

**Ülesanne 7.2.** Tõestada, et kui vektorruumis  $X$  on defineeritud kaks topoloogiat  $\tau_1$  ja  $\tau_2$  ning  $\tau_1 \subset \tau_2$ , siis  $(X, \tau_1)' \subset (X, \tau_2)'$ .

## 7.5 Veel kaks eraldamisteoreemi

Me tuletame teoreemist 6.7 veel kaks eraldamisteoreemi. Järgmine lause on siduvaks lülikas nende ja teoreemi 6.7 vahel.

**Lause 7.14.** *Kui  $E$  on LKR-i  $X$  kumer alamhulk ja  $x_0 \in X \setminus \overline{E}$ , siis leidub selline funktsionaal  $f \in X'$ , et  $f(x_0) \notin \overline{f(E)}$ .*

**Tõestus.** Kuna  $x_0$  ei kuulu alamhulga  $E$  sulundisse, siis saame valida lahtise kumerana nulliumbruse  $U$  omadusega  $(x_0 + U) \cap E = \emptyset$  (põhjendada!)☒. Rakendame kumeratele hulkadele  $G := x_0 + U$  ja  $E$  teoreemi 6.7 ning leiame funktsionaali  $f \in X'$ , mis rahuldab tingimust  $f(x_0 + U) \cap f(E) = \emptyset$ . Ilmselt on  $f(x_0 + U)$  lahtine hulk ruumis  $\mathbb{K}$  (vt. järelitus 6.8), seetõttu saab punktile  $f(x_0)$  leida ümbruse  $B \subset f(x_0 + U)$ . Niisiis,  $B \cap f(E) = \emptyset$ , järelikult  $f(x_0) \notin \overline{f(E)}$ . ■

**Teoreem 7.15.** Olgu  $X$  LKR.

(a) Kui  $E \subset X$  on absoluutsest kumer ja  $x_0 \in X \setminus \overline{E}$ , siis leidub funktsionaal  $f \in X'$  omadusega

$$|f(x)| \leq 1 \quad (x \in E), \quad f(x_0) > 1.$$

(b) Olgu  $X_0$  ruumi  $X$  vektoralamruum. Element  $x_0 \in X$  on alamruumi  $X_0$  puutepunkt parajasti siis, kui  $f(x_0) = 0$  iga niisuguse funktsionaali  $f \in X'$  korral, mis rahuldab tingimust  $f|_{X_0} = 0$ .

**Tõestus.** (a) Antud eeldustel saab lause 7.14 kohaselt leida sellise funktsionaali  $g \in X'$ , mille puhul  $g(x_0) \notin \overline{g(E)}$ . Seejuures on  $\overline{g(E)}$  ning järelikult ka  $\overline{g(E)}$  absoluutsest kumer alamhulk vektorruumis  $\mathbb{K}$ . Tähendab,  $\overline{g(E)}$  on kas kinnine ring komplekstasandil (juhul  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ) või reaalteleje lõik (juhul  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ) keskpunktiga 0 (kontrollida!). Kuna  $g(x_0) \notin \overline{g(E)}$ , siis võime eeldada, et  $g(x_0) > \sup_{x \in E} |g(x)| =: \alpha$ . Defineerime

$$f := \begin{cases} \frac{|g(x_0)|}{\alpha g(x_0)} g, & \text{kui } \alpha \neq 0, \\ \frac{2}{g(x_0)} g, & \text{kui } \alpha = 0, \end{cases}$$

siis suvalise  $x \in E$  puhul  $|f(x)| = \frac{|g(x)|}{\alpha} \leq 1$ , kui  $\alpha \neq 0$ , ning  $|f(x)| = 0$ , kui  $\alpha = 0$ . Samal ajal  $f(x_0) > 1$ . Niisiis on funktsionaalil  $f$  kõik nõutud omadused.

(b) *Tarvilikkus.* Olgu  $x_0 \in \overline{X_0}$ , siis leidub alamruumi  $X_0$  elementide pere  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Gamma}$ , mis koondub punktiks  $x_0$  LKR-s  $X$ . Kui  $f \in X'$  on nullfunktsionaal vektoralamruumis  $X_0$ , siis  $f(x_0) = \lim_{\alpha \in \Gamma} f(x_\alpha) = 0$ .

*Piisavus.* Oletame, et  $x_0 \notin \overline{X_0}$  ja rakendame lauset 7.14. Selle kohaselt leidub  $f \in X'$  omadusega  $f(x_0) \notin \overline{f(X_0)}$ , järelikult  $\overline{f(X_0)} = \{0\}$ , millega tuleneb, et  $f|_{X_0} = 0$ . Samal ajal  $f(x_0) \neq 0$ . ■

**Järeldus 7.16.** LKR-i  $X$  vektoralamruum  $X_0$  on tihe ruumis  $X$  parajasti siis, kui  $f|_{X_0} \neq 0$  iga  $f \in X' \setminus \{0\}$  korral. Teisisõnu,  $\overline{X_0} = X$  parajasti siis, kui

$$f|_{X_0} = 0 \Rightarrow f = 0$$

iga  $f \in X'$  korral.

**Tõestus.** Iseseisvalt! ■

**Näide 7.3.** Vaatleme veel kord näites 4.2 käsitletud kõigi lõigus  $[a, b]$  Lebesgue'i mõttes mõõtuvate peaaegu kõikjal lõplike funktsioonide TVR-i  $S[a, b]$ . Me veendusime, et selle ruumi topoloogiline koonduvus langeb kokku funktsionaaljada mõõdu järgi koonduvusega lõigus  $[a, b]$ . Funktsioniteooriast teame, et  $S[a, b]$  on lihtsate funktsioonide hulga sulund mõõdu järgi koonduvuse mõttes, kus lihtsate funktsioonide all mõistame lõigu  $[a, b]$  intervallide karakteristlike funktsioonide lineaarseid kombinatsioone. Olgu  $f \in S[a, b]'$ , eeldame, et  $f \neq 0$ . Märgime tähega  $H$  lõigu  $[a, b]$  kõigi intervallide karakteristlike funktsioonide hulga. Kuna  $\text{span}H$  on tihe TVR-is  $S[a, b]$ , siis  $f|_H \neq 0$ . Seetõttu saame iga  $n \in \mathbb{N}$  puhul valida intervalli  $\Delta_n \subset [a, b]$  nii, et  $\text{mes}\Delta_n < \frac{1}{n}$  ja tema karakteristlik funktsioon  $\chi_{\Delta_n}$  rahuldab tingimust

$f(\chi_{\Delta_n}) =: \delta_n \neq 0$ . Tähistame  $x_n := \frac{1}{\delta_n} \chi_{\Delta_n}$  ja paneme tähele, et  $x_n \rightarrow 0$  mõõdu järgi, s.t.  $x_n \rightarrow 0$  TVR-s  $S[a, b]$ . Funktsionaali  $f$  pidevuse tõttu  $f(x_n) \rightarrow 0$ , samal ajal

$$f(x_n) = f\left(\frac{1}{\delta_n} \chi_{\Delta_n}\right) = \frac{1}{\delta_n} f(\chi_{\Delta_n}) = 1 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Saadud vastuolu annab tunnistust sellest, et **TVR-is  $S[a, b]$  ei leidu ühtegi mittetri-viaalset pidevat lineaarse funktsionaali**, s.t.  $S[a, b]' = \{0\}$ .

Näide 7.3 ütleb meile muuhulgas, et teoreem 7.13 ei ole ülekantav kõigile topoloogilistele vektorruumidele. Leidub metriseeruvaid (seega eralduvaid) topoloogilisi vektorruume, millel ainukeseks pidevaks lineaarseks funktsionaaliks on nullfunktsionaal. Selline situatsioon (ka mitte-eralduvate) lokaalselt kumerate ruumide puhul ei ole võimalik (vrd. järeltus 6.8).

## 8 Vektorruumide duaalsed paarid

### 8.1 Duaalne paar

Järgmised kaks peatükki on pühendatud topoloogiliste vektorruumide duaalsuseteooriale. Selle teoria lähteidee - uurida topoloogilist vektorruumi tema kaasruumi abil - on pärit klassikalisest funktsionaalanalüüsist, kuid siin vaadeldavas kontekstis saab see idee oluliselt üldisema käsitleuse.

**Vektorruumide duaalne paar.** Olgu  $(X, \tau)$  eralduv LKR. Nagu me eelmises peatükis veendusime, on tema kaasruumis  $X'$  piisavalt palju elemente, eraldamaks punktid ruumis  $X$ . Duaalsuseteoria üks tüüpilisemaid ja fundamentaalsemaid ülesandeid on kirjeldada lokaalselt kumeraid topoloogiaid  $\tau'$  vektorruumis  $X$ , millele vastav kaasruum  $(X, \tau')'$  on  $X'$ .

Selle probleemi ning temaga seotud küsimuste uurimiseks vajaliku tehniline aparatuuri ehitamist alustame duaalse paari mõiste sissetoomisest.

**Definitsioon.** Olgu  $X$  ja  $Y$  vektorruumid üle ühe ja sama skalaaride korpuuse  $\mathbb{K}$ . Öeldakse, et vektorruumid  $X$  ja  $Y$  moodustavad *duaalse paari*  $\langle X, Y \rangle$ , kui eksisteerib selline bilineaarne funktsionaal (vt. sissejuhatus)

$$B: X \times Y \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, f) \mapsto B(x, f) =: \langle x, f \rangle,$$

mis eraldab punktid nii ruumis  $X$  kui ka ruumis  $Y$ , s.t.

$$\forall x \in X \setminus \{0\} \quad \exists f \in Y : \quad \langle x, f \rangle \neq 0 \tag{8.1}$$

ja

$$\forall f \in Y \setminus \{0\} \quad \exists x \in X : \quad \langle x, f \rangle \neq 0. \tag{8.2}$$

Sel juhul öeldakse ka, et bilineaarne funktsionaal  $B$  korraldab duaalsuse  $\langle X, Y \rangle$ .

Bilineaarse funktsionaali sümmeetriaomadustest tuleneb duaalse paari sümmeetria: kui  $B$  korraldab duaalsuse  $\langle X, Y \rangle$ , siis korraldab ta ka duaalsuse  $\langle Y, X \rangle$ .

**Näide 8.1.** Olgu  $\ell^\infty := \left\{ x = (x_k) \mid \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k| < \infty \right\}$  (kõigi tõkestatud jadade vektorruum) ja  $\ell^1 := \left\{ y = (y_k) \mid \sum_{k=1}^{\infty} |y_k| < \infty \right\}$  (kõigi absoluutsest koonduvate ridade vektorruum). Bilineaarne funktsionaal

$$B: \ell^\infty \times \ell^1 \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, y) \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k$$

korraldab duaalsuse  $\langle \ell^\infty, \ell^1 \rangle$ . Tõepoolest, rida  $\sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k$  koondub (absoluutsest) kõikide  $x \in \ell^\infty$  ja  $y \in \ell^1$  korral (kontrollida!)  $\blacksquare$ , seejuures on lineaarsed funktsionaalid

$$B_x: \ell^1 \rightarrow \mathbb{K}, \quad y \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k \quad \text{ja} \quad B_y: \ell^\infty \rightarrow \mathbb{K}, \quad x \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k$$

nullfunktsionaalid vaid sel juhul, kui elemendid  $x$  ja  $y$  on nullelementid vastavalt ruumis  $\ell^\infty$  ja  $\ell^1$  (veenduda!)  $\blacksquare$ .

**Näide 8.2.** Olgu  $L^2$  kõigi lõigus  $[a, b]$  Lebesgue'i mõttes integreeruva ruuduga reaalsete väärustega funktsioonide  $x = x(t)$  vektorruum, s.t.

$$L^2 = \left\{ x = x(t) \mid \int_a^b |x(t)|^2 dt < \infty \right\}.$$

Seejuures samastame vektorruumi punktidena need funktsioonid, mis selles lõigus langevad kokku peaegu kõikjal. Ruum  $L^2$  on Hilberti ruum skalaarkorrutisega

$$B: L^2 \times L^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \int_a^b x(t) y(t) dt,$$

mis on bilineaarne funktsionaal. Kuna iga  $x \in L^2 \setminus \{0\}$  korral  $B(x, x) = \int_a^b |x(t)|^2 dt \neq 0$ , siis  $B$  korraldab duaalsuse  $\langle L^2, L^2 \rangle$ .

**Näide 8.3.** Näitame, et iga vektorruum  $X$  ja tema algebraline kaasruum  $X^*$  moodustavad duaalse paari  $\langle X, X^* \rangle$ . Selleks defineerime bilineaarse funktsionaali

$$B: X \times X^* \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, f) \mapsto f(x)$$

(kontrollida!) ja veendume, et ta eraldab punktid nii ruumis  $X$  kui ka kaasruumis  $X^*$ . Tingimuse (8.2) kontroll on lihtne: kui  $f \in X^*$  on selline funktsionaal, et  $f(x) = 0$  iga  $x \in X$  puhul, siis  $f = 0$  vektorruumis  $X^*$ . Tingimus (8.1) tuleneb lausest 7.10.

Näite 8.3 põhjal on selge, et iga vektorruum  $X$  ja tema algebralise kaasruumi  $X^*$  iga selline vektoralamruum  $Y$ , mis eraldab punktid ruumis  $X$ , moodustavad duaalse paari. Sel juhul bilineaarne funktsionaal

$$B: X \times Y \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, f) \mapsto f(x) \tag{8.3}$$

korraldab duaalsuse  $\langle X, Y \rangle$ . Tõepoolest, iga  $x \in X \setminus \{0\}$  korral leidub  $f \in Y$  omadusega  $\langle x, f \rangle = f(x) \neq 0$ , teisalt on iga  $f \in Y \setminus \{0\}$  puhul olemas punkt  $x \in X$ , et  $f(x) \neq 0$ .

Tegelikult kehtib ka vastupidine väide: iga duaalse paari  $\langle X, Y \rangle$  korral saab vektorruumi  $Y$  samastada ruumi  $X$  algebralise kaasruumi mingi vektoralamruumiga ja vastupidi, vektorruumi  $X$  saab samastada ruumi  $Y$  algebralise kaasruumi vektoralamruumiga. Veendume sellest.

Olgu  $\langle X, Y \rangle$  suvaline duaalne paar bilineaarse funktsionaaliga  $B$ . Tähistame iga  $f \in Y$  korral

$$G_f(x) := \langle x, f \rangle \quad (x \in X),$$

siis  $G_f$  on lineaarne funktsionaal (veenduda), s.t.  $G_f \in X^*$ . Defineerime kujutuse

$$\pi: Y \rightarrow X^*, \quad f \mapsto G_f,$$

lihtne kontroll näitab, et  $\pi$  on lineaarne (veenduda). Veelgi enam, ta on ka üks-ühene: kui  $f, g \in Y$  ja  $f \neq g$ , siis saab valida  $x_0 \in X$  omadusega  $\langle x_0, f \rangle \neq \langle x_0, g \rangle$ , mistõttu  $\pi(f) \neq \pi(g)$ . Kujutust  $\pi$  nimetatakse vektorruumi  $Y$  kanooniliseks sisestuseks vektorruumi  $X^*$ , ta korraldab üks-ühese vastavuse vektoruumide  $Y$  ja  $\widehat{Y} := \pi(Y) \subset X^*$  vahel, säilitades seejuures vektorruumi tehted (kontrollida!). Seega on  $Y$  ja  $\widehat{Y}$  vektoruumidena

samastatavad ja selles tähenduses kehtib sisalduvus  $Y \subset X^*$ , kusjuures  $Y$  eraldab punktid vektorruumis  $X$  (kontrollida!)☒.

**Kokkuvõttes:** me võime alati duaalse paari  $\langle X, Y \rangle$  üht komponenti, vektorruumi  $Y$  vaadelda teise ruumi  $X$  algebralise kaasruumi  $X^*$  vektoralamruumina, mis eraldab punktid ruumis  $X$ . Täpselt samamoodi on  $X$  interpreteeritav ruumi  $Y^*$  vektoralamruumina, mis eraldab punktid ruumis  $Y$ .

Edaspidi lähtume me just sellisest duaalse paari interpretatsioonist. Niisiis, **duaalse paari moodustavad vektorruumid  $X$  ja  $Y$ , kus  $Y \subset X^*$  ja ta eraldab punktid ruumis  $X$** . Bilineaarne funktsionaal (8.3) on sel juhul automaatselt määratud.

### Ülesanne 8.1.

Tähistame

$$\omega := \{x = (x_k) \mid x_k \in \mathbb{K} \ (k \in \mathbb{N})\}$$

(kõigi arvjadade vektorruum, vt. näide 4.3) ja

$$\varphi := \{u \in \omega \mid \exists k_u \in \mathbb{N}: u_k = 0, \text{ kui } k > k_u\}$$

(kõigi lõplike jadade ruum). Defineerime bilineaarse funktsionaali  $B$  seosega

$$B: \omega \times \varphi \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, u) \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} u_k x_k.$$

Veenduda, et bilineaarne funktsionaal  $B$  korraldab duaalsuse  $\langle \omega, \varphi \rangle$ .

## 8.2 Nõrk topoloogia

**Antud duaalsusega kooskõlas olev topoloogia.** Vastavalt definitsioonile on duaalne paar (ehk duaalsus) puhtalgebraaline mõiste, kuid ta mängib topoloogiliste vektorruumide teorias olulist rolli. Märgime (see on oluline!), et kuna teoreemi 7.15 kohaselt eraldab eralduva LKR-i  $X$  topoloogiline kaasruum  $X'$  punktid ruumis  $X$ , siis  $\langle X, X' \rangle$  on duaalne paar.

**Definitsioon.** Olgu  $\langle X, Y \rangle$  duaalne paar ja olgu vektorruumis  $X$  defineeritud lokaalselt kumer topoloogia  $\tau$ . Kui  $(X, \tau)' = Y$ , siis öeldakse, et topoloogia  $\tau$  on duaalsusega  $\langle X, Y \rangle$  kooskõlas.

Meie eesmärgiks selles ja järgnevas kahes peatükis on *kirjeldada antud duaalsusega kooskõlas olevaid lokaalselt kumeraid topoloogiaid* ning uurida nende omadusi. Muuhulgas näitame, et sellised topoloogiad on alati olemas ning nende hulgas on nii nõrgim kui ka tugevaim.

On lihtne veenduda, et kui  $f$  on lineaarne funktsionaal vektorruumis  $X$ , siis seosega

$$p_f(x) := |\langle x, f \rangle| = |f(x)| \quad (x \in X) \tag{8.4}$$

määratud funktsionaal  $p_f: X \rightarrow \mathbb{R}$  on poolnorm (kontrollida!)☒.

**Definitsioon.** Olgu  $\langle X, Y \rangle$  duaalne paar. Poolnormide süsteemiga  $\{p_f\}_{f \in Y}$  määratud lokaalselt kumerat topoloogiat vektorruumis  $X$  nimetatakse (duaalse paariga  $\langle X, Y \rangle$  määratud) *nõrgaks topoloogiaks* ja tähistatakse  $\sigma(X, Y)$ .

Esitame siinkohal nõrga topoloogia mõned **lihtsamad omadused**, mis tulenevad vahelt definitsioonist.

1<sup>0</sup>. Nõrk topoloogia  $\sigma(X, Y)$  on eralduv: kuna  $Y$  eraldab punktid ruumis  $X$ , siis iga  $x \in X \setminus \{0\}$  jaoks saab leida funktsionaali  $f \in Y$  omadusega  $p_f(x) = |f(x)| \neq 0$ , väide järeltub lausest 7.3(a).

2<sup>0</sup>. Topoloogia  $\sigma(X, Y)$  nulliumbruste baasi moodustavad alamhulgad

$$W_{\varepsilon, f_1, \dots, f_n} = \left\{ x \in X \mid \max_{1 \leq i \leq n} |f_i(x)| \leq \varepsilon \right\} \quad (\varepsilon > 0, f_1, \dots, f_n \in Y, n \in \mathbb{N}),$$

ka see tuleneb lausest 7.3(a). Tegelikult saab seda baasi kirjeldada lihtsamalt: kuna  $Y$  on vektorruum, siis  $W_{\varepsilon, f_1, \dots, f_n} = W_{1, g_1, \dots, g_n} =: W_{g_1, \dots, g_n}$ , kus  $g_i := \frac{1}{\varepsilon} f_i \in Y$  iga  $i = 1, \dots, n$  korral, seetõttu moodustavad sellesama baasi nulliumbrused

$$W_{f_1, \dots, f_n} = \left\{ x \in X \mid \max_{1 \leq i \leq n} |f_i(x)| \leq 1 \right\} \quad (f_1, \dots, f_n \in Y, n \in \mathbb{N}).$$

3<sup>0</sup>. Koonduvus topoloogias  $\sigma(X, Y)$  on funktsionaalanalüüsni kursusest tuntud nõrk koonduvus (vrd. lause 7.5(a)):

$$\begin{aligned} x_\alpha \rightarrow x \ (\sigma(X, Y)) &\Leftrightarrow \forall f \in Y : p_f(x_\alpha - x) \rightarrow 0 \\ &\Leftrightarrow \forall f \in Y : |f(x_\alpha - x)| \rightarrow 0 \\ &\Leftrightarrow \forall f \in Y : f(x_\alpha) \rightarrow f(x). \end{aligned}$$

Analoogiliselt kirjeldatakse tõkestatust nõrga topoloogia suhtes: alamhulk  $E \subset X$  on tõkestatud LKR-s ( $X, \sigma(X, Y)$ ) parajasti siis, kui (vrd. lause 7.5(b))

$$\forall f \in Y : \sup_{x \in E} |f(x)| < \infty.$$

4<sup>0</sup>. Vektorruumis  $Y$  on nõrk topoloogia  $\sigma(Y, X)$  määratud sellise poolnormide süsteemiga  $\{p_x\}_{x \in X}$ , kus

$$p_x(f) := |\langle x, f \rangle| = |f(x)| \quad (f \in Y).$$

Nulliumbruste baasiks on alamhulkade

$$W_{x_1, \dots, x_n} := \left\{ f \in Y \mid \max_{1 \leq i \leq n} |f(x_i)| \leq 1 \right\} \quad (x_1, \dots, x_n \in X, n \in \mathbb{N})$$

süsteem. Pere  $(f_\alpha)_{\alpha \in \Gamma}$  koondub punktiks  $f \in Y$  LKR-s ( $Y, \sigma(Y, X)$ ) parajasti siis, kui

$$\forall x \in X : f_\alpha(x) \rightarrow f(x),$$

alamhulk  $D \subset Y$  on  $\sigma(Y, X)$ -tõkestatud parajasti siis, kui

$$\forall x \in X : \sup \{|f(x)| \mid f \in D\} < \infty.$$

**Ülesanne 8.2.** Kirjeldada jada  $(x^{(n)})$  koonduvust LKR-s  $(\ell^\infty, \sigma(\ell^\infty, \ell^1))$  (vt. näide 8.1). Kas jada  $(x^{(n)})$  on koonduv, kui

$$x^{(1)} := (1, 0, 0, \dots), \quad x^{(2)} := (1, 1, 0, 0, \dots), \dots, \quad x^{(n)} := (1, 1, \dots, 1, 0, 0, \dots), \dots?$$

**Ülesanne 8.3.** Kas ülesandes 8.2 toodud jada  $(x^{(n)})$  on koonduv LKR-s  $(\ell^1, \sigma(\ell^1, \ell^\infty))$ ?

**Ülesanne 8.4.** Näidata, et  $x^{(n)} \rightarrow x$  topoloogias  $\sigma(\omega, \varphi)$  parajasti siis, kui  $x_k^{(n)} \rightarrow x_k$  protsessis  $n \rightarrow \infty$  iga  $k \in \mathbb{N}$  korral (vrd. ülesanne 8.1).

**Nõrk täielik tõkestatust.** Teatavasti on topoloogilises vektorruumis iga täielikult tõkestatud hulk tõkestatud (vt. art. 4.1), vastupidine väide on üldjuhul vale (piisab vaadelda suvalist lõpmatumõõtmelist normeeritud ruumi (selgitada!) $\blacksquare$ ). Me näitame järgnevalt, et nõrgas topoloogias langevad need kaks mõistet kokku.

**Lause 8.1.** Olgu  $\langle X, Y \rangle$  duaalne paar. Iga tõkestatud alamhulk  $E$  LKR-s  $(X, \sigma(X, Y))$  on täielikult tõkestatud.

**Tõestus.** Olgu  $E \subset X$  nõrgas topoloogias  $\sigma(X, Y)$  tõkestatud alamhulk. Võtame  $\sigma(X, Y)$ -nulliumbruse baasist suvalise nulliumbruse (vrd.  $2^0$ )

$$U = \left\{ x \in X \mid \max_{1 \leq i \leq n} |f_i(x)| \leq 1 \right\},$$

kus  $f_1, \dots, f_n \in Y$ . Meie eesmärk on leida punktid  $x_1, \dots, x_r \in X$  omadusega  $E \subset \bigcup_{i=1}^r (x_i + U)$ .

Defineerime lineaarse kujutuse

$$T: X \rightarrow m_n, \quad x \mapsto (f_1(x), \dots, f_n(x))$$

ja tähistame tähega  $B$  kinnise ühikkera kõigi  $n$ -mõõtmeliste vektorite  $z = (z_1, \dots, z_n)$  normeeritud ruumis  $m_n$ , s.t.

$$B = \left\{ z = (z_1, \dots, z_n) \mid \|z\| := \max_{1 \leq i \leq n} |z_i| \leq 1 \right\}$$

(vrd. art. 4.2 algus). Selge, et  $U = T^{-1}(B)$ . Võtame suvalise  $z \in T(X)$  ning leiame  $x \in X$ , mille korral  $T(x) = z$ , siis  $x + U = T^{-1}(z + B)$ . Tõepoolest,

$$\begin{aligned} y \in T^{-1}(z + B) &\Leftrightarrow y - x \in T^{-1}(B) \\ &\Leftrightarrow y \in x + U. \end{aligned}$$

Tähistame  $A := T(E)$ . Kuna  $E$  on  $\sigma(X, Y)$ -tõkestatud, siis saab valida  $\lambda > 0$  omadusega  $\lambda E \subset U$ , mistõttu  $\lambda A = T(\lambda E) \subset T(U) \subset B$ . Niisiis on  $A$  tõkestatud alamhulk lõplikumõõtmelises normeeritud ruumis  $m_n$  ning seega suhteliselt kompaktne (selgitada!) $\blacksquare$ , järelikult ka täielikult tõkestatud (selgitada!) $\blacksquare$ . Valime vektorid  $z^{(1)}, \dots, z^{(r)} \in A$  nii, et  $A \subset \bigcup_{i=1}^r (z^{(i)} + B)$ , ja neile vastavad punktid  $x_1, \dots, x_r \in E$  omadusega  $T(x_i) = z^{(i)}$ . Siis

$$E \subset T^{-1}(A) \subset T^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^r (z^{(i)} + B)\right) = \bigcup_{i=1}^r T^{-1}(z^{(i)} + B) = \bigcup_{i=1}^r (x_i + U),$$

millega lause on tõestatud. ■

**Nõrga topoloogia omaduste täpsemaks kirjeldamiseks** vajame järgmist lemmat.

**Lemma 8.2.** Olgu  $f, f_1, \dots, f_n$  lineaarsed funktsionaalid, mis on määratud vektorruumis  $X$ . Selleks, et kehtiks seos  $f \in \text{span}\{f_1, \dots, f_n\}$ , on tarvilik ja piisav tingimus

$$f_i(x) = 0 \quad (i = 1, \dots, n) \Rightarrow f(x) = 0. \quad (8.5)$$

**Tõestus.** Tarvilikkus. Olgu  $f = \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i \in \text{span}\{f_1, \dots, f_n\}$ . Kui mingi  $x \in X$  puhul  $f_i(x) = 0$  kõikide  $i = 1, \dots, n$  korral, siis  $f(x) = 0$ , s.t. kehtib implikatsioon (8.5).

Piisavuse tõestamiseks kasutame induktsioonimeetodit. Olgu kõigepealt  $n = 1$ , eeldame, et tingimus (8.5) on täidetud, s.t.

$$f_1(x) = 0 \Rightarrow f(x) = 0. \quad (8.6)$$

Kui  $f_1 = 0$ , siis ka  $f = 0$ , tähendab,  $f = f_1$ . Kui  $f_1 \neq 0$ , siis leidub selline  $z \in X$ , et  $f_1(z) = 1$ . Iga  $x \in X$  puhul  $f_1(x - f_1(z)z) = 0$ , mistõttu eelduse (8.6) kohaselt  $f(x - f_1(z)z) = 0$  ehk  $f = \lambda f_1$ , kus  $\lambda := f(z)$ . Seega väide kehtib juhul  $n = 1$ .

Eeldame nüüd, et väide kehtib juhul  $n - 1$ , s.t. implikatsioonist

$$f_i(x) = 0 \quad (i = 1, \dots, n - 1) \Rightarrow f(x) = 0$$

järelt, et  $f \in \text{span}\{f_1, \dots, f_{n-1}\}$ . Näitame, et väide kehtib siis ka juhul  $n$  s.t. tingimusest (8.5) tuleneb  $f \in \text{span}\{f_1, \dots, f_n\}$ . Ilmselt on see nii, kui mingi  $f_i = 0$  (selgitada!)  $\blacksquare$ , seetõttu vaatleme juhtu kus  $f_n \neq 0$ . Leiame  $z \in X$ , et  $f_n(z) = 1$ , ja moodustame funktsionaalid

$$g := f - f(z)f_n, \quad g_i := f_i - f_i(z)f_n \quad (i = 1, \dots, n - 1),$$

siis  $g_i \in \text{span}\{f_1, \dots, f_n\}$  kõikide  $i = 1, \dots, n - 1$  puhul. Kontrollime implikatsiooni

$$g_i(x) = 0 \quad (i = 1, \dots, n - 1) \Rightarrow g(x) = 0,$$

kui see on õige, siis induktsiooni eelduse kohaselt  $g \in \text{span}\{g_1, \dots, g_{n-1}\}$  ja järelkult

$$f = g + f(z)f_n \in \text{span}\{g_1, \dots, g_{n-1}, f_n\} \subset \text{span}\{f_1, \dots, f_n\}.$$

Niisiis, olgu  $x \in X$  selline element, et  $g_i(x) = 0$  iga  $i = 1, \dots, n - 1$  korral. Tähistame  $y := x - f_n(x)z$ , siis

$$\begin{aligned} f_i(y) &= f_i(x) - f_n(x)f_i(z) = g_i(x) = 0 \quad (i = 1, \dots, n - 1), \\ f_n(y) &= f_n(x) - f_n(x)f_n(z) = f_n(x) - f_n(x) = 0. \end{aligned}$$

Tingimuse (8.5) kohaselt  $f(y) = 0$ , seetõttu saamegi, et  $g(x) = 0$  iga sellise elemendi  $x$  puhul, mil  $g_i(x) = 0$ , kui  $i = 1, \dots, n - 1$ . Lemma on tõestatud.  $\blacksquare$

**Teoreem 8.3.** Topoloogia  $\sigma(X, Y)$  on kooskõlas duaalsusega  $\langle X, Y \rangle$ , s.t.  $(X, \sigma(X, Y))' = Y$ .

**Tõestus.** Lihtne on näha, et  $Y \subset (X, \sigma(X, Y))'$ . Töepooltest, kui  $f \in Y$ , siis seosega (8.4) määratud poolnorm  $p_f$  on pidev topoloogias  $\sigma(X, Y)$  (vrd. lause 7.3(a)), millega lause 7.11 põhjal järelt, et funktsionaali  $f$  pidevus nõrgas topoloogias  $\sigma(X, Y)$ .

Vastupidise sisalduvuse  $(X, \sigma(X, Y))' \subset Y$  tõestamiseks olgu  $f \in (X, \sigma(X, Y))'$ . Tähis- tame  $V := \{x \in X \mid |f(x)| \leq 1\} = f^{-1}(D)$ , kus  $D := \{\lambda \in \mathbb{K} \mid |\lambda| \leq 1\}$  on ühikkera Banachi ruumis  $\mathbb{K}$ . Kuna  $f$  on pidev, siis  $V$  on  $\sigma(X, Y)$ -nulliumbrus (selgitada!)  $\blacksquare$ , seega peab

leiduma nulliumbruste baasis ümbrus  $W := W_{f_1, \dots, f_n}$  (vrd. märkus 2<sup>0</sup>) omadusega  $W \subset V$ . Näitame, et funktsionaalid  $f, f_1, \dots, f_n$  rahuldavad implikatsiooni (8.5), siis lemma 8.2 põhjal  $f \in \text{span}\{f_1, \dots, f_n\} \subset Y$  ja me saame, et  $(X, \sigma(X, Y))' \subset Y$ .

Olgu  $f_i(x) = 0$  iga  $i = 1, \dots, n$  korral, siis  $f_i(\alpha x) = \alpha f_i(x) = 0$  kõikide  $\alpha > 0$  ja  $i = 1, \dots, n$  puhul. Seega

$$\alpha x \in W \subset V \text{ kõikide } \alpha > 0 \text{ korral,}$$

mistõttu

$$\alpha |f(x)| = |f(\alpha x)| \leq 1 \text{ iga } \alpha > 0 \text{ puhul.}$$

See on võimalik vaid juhul  $f(x) = 0$ . ■

**Teoreem 8.4.** *Nõrk topoloogia  $\sigma(X, Y)$  on nõrgim duaalsusega  $\langle X, Y \rangle$  kooskõlas olevatest lokaalselt kumeratest topoloogiatest.*

**Tõestus.** Olgu  $\tau$  selline lokaalselt kumer topoloogia vektorruumis  $X$ , et  $(X, \tau)' = Y$ . Fikseerime  $W := \bigcap_{i=1}^n V_i$  topoloogia  $\sigma(X, Y)$  nulliumbruste baasist, kus  $V_i := f_i^{-1}(D)$  mingite  $f_1, \dots, f_n \in Y$  korral, ja  $D := \{\lambda \in \mathbb{K} \mid |\lambda| \leq 1\}$ . Siis  $f_1, \dots, f_n$  on  $\tau$ -pidevad funktsionaalid, mistõttu  $V_1, \dots, V_n$  ning järelikult ka  $W$  on  $\tau$ -nulliumbrused. Tähendab,  $\sigma(X, Y) \subset \tau$ . ■

**Järeldus 8.5.** *Kui  $(X, \tau)$  on eralduv LKR ja  $X' := (X, \tau)',$  siis topoloogia  $\tau$  on kooskõlas duaalsusega  $\langle X, X' \rangle$  ja  $\tau \supseteq \sigma(X, X')$ .*

Nõrga topoloogiaga seoses teeme veel ühe olulise märkuse.

5<sup>0</sup>. Olgu  $(X, \tau)$  eralduv LKR, mille topoloogia  $\tau$  on määratud poolnormide süsteemiga  $\{p_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma}$ . Vektoralamruumis  $X_0 \subset X$  indutseeritud topoloogia määratatakse samade poolnormidega, täpsemalt öeldes, nende ahendite süsteemiga  $\{p_\gamma|_{X_0}\}_{\gamma \in \Gamma}$ . Olgu  $X' := (X, \tau)'$  ja  $(X_0)' := (X_0, \tau|_{X_0})'$ , paneme tähele, et

$$(X_0)' = \{f|_{X_0} \mid f \in X'\}.$$

Tõepoolest, ühelt poolt on sisalduvus  $\{f|_{X_0} \mid f \in X'\} \subset (X_0)'$  ilmne, teisalt saab iga pideva lineaarse funktsionaali  $g: X_0 \rightarrow \mathbb{K}$  pidevalt jätkata kogu ruumi  $X$  (vrd. lause 7.12), seega leidub  $f \in X'$  omadusega  $f|_{X_0} = g$ . Niisiis,

$$g \in (X_0)' \Leftrightarrow \exists f \in X' : g = f|_{X_0}. \quad (8.7)$$

Vaatleme vektoralamruumis  $X_0$  kahte nõrka topoloogiat  $\sigma(X_0, (X_0)')$  ja  $\sigma(X, X')|_{X_0}$ . Esimene on määratud poolnormide süsteemiga  $\{p_g\}_{g \in (X_0)'}$  ja teine süsteemiga  $\{p_{f|_{X_0}}\}_{f \in X'}$ . Pidades silmas võrdust (8.7), on selge, et need kaks süsteemi määrapavad ühe ja sama topoloogia, s.t.

$$\sigma(X_0, (X_0)') = \sigma(X, X')|_{X_0}. \quad (8.8)$$

### 8.3 Polaarid

Selle artikli eesmärk on duaalsuseteooria tehnilise aparatuuri täiustamine. Me alustame selle teooria olulise tulemusega, mis kirjeldab **kumerate alamhulkade sulundeid** antud duaalsusega kooskõlas olevates topoloogiates. Teoreemi töestamisel kasutame järgmist lihtsalt kontrollitavat fakti.

**Ülesanne 8.5.** Tõestada, et kui hulgas  $X$  on antud topoloogiad  $\tau_1$  ja  $\tau_2$  ning  $\tau_1 \subset \tau_2$ , siis alamhulga  $E \subset X$  puhul  $\overline{E}^{\tau_2} \subset \overline{E}^{\tau_1}$ .

**Lause 8.6.** Olgu  $\langle X, Y \rangle$  duaalne paar. Kumera alamhulga  $E \subset X$  sulund on sama hulk kõigis selle duaalsusega kooskõlas olevates lokaalselt kumerates topoloogiates.

**Tõestus.** Olgu  $\tau$  lokaalselt kumer topoloogia vektorruumis  $X$  omadusega  $(X, \tau)' = Y$ . Väite töestuseks piisab veenduda, et  $\overline{E}^\tau = \overline{E}^{\sigma(X, Y)}$  (põhjendada!)  $\blacksquare$ . Kuna  $\sigma(X, Y) \subset \tau$  (vrd. teoreem 8.4), siis  $\overline{E}^\tau \subset \overline{E}^{\sigma(X, Y)}$  (vrd. ülesanne 8.5). Vastupidise sisalduvuse näitamiseks võtame suvalise  $z \in X \setminus \overline{E}^\tau$  ning leiame vastavalt lausele 7.14 funktsionaali  $f \in X' = Y$  omadusega  $f(z) \notin \overline{f(E)}$ , kus sulund on võetud LKR-s  $\mathbb{K}$ . Seega  $2\delta := \inf_{x \in E} |f(z) - f(x)| > 0$  (põhjendada!)  $\blacksquare$  ehk  $|f(z) - f(x)| \geq 2\delta > 0$  iga  $x \in E$  korral. Kuna  $f$  on  $\sigma(X, Y)$ -pidev funktsionaal, siis

$$U := \{x \in X \mid |f(x)| \leq \delta\}$$

on  $\sigma(X, Y)$ -nulliumbrus ja  $z + U$  on punkti  $z$  ümbrus nõrgas topoloogias  $\sigma(X, Y)$ . Seejuures  $(z + U) \cap E = \emptyset$ : kui  $x \in z + U$ , siis  $x - z \in U$ , mistõttu  $|f(z) - f(x)| = |f(x - z)| \leq \delta$  ja seega  $x \notin E$ . Tähendab,  $z \notin \overline{E}^{\sigma(X, Y)}$ .  $\blacksquare$

**Teoreem 8.7.** Kõigil antud duaalsusega  $\langle X, Y \rangle$  kooskõlas olevatel lokaalselt kumeratel topoloogiatel on ruumis  $X$  ühed ja samad kinnised kumerad hulgad.

**Tõestus.** Iseseisvalt!  $\blacksquare$

**Polaarid. Definitsioon.** Olgu  $\langle X, Y \rangle$  duaalne paar ja  $E \subset X$ . Almhulka

$$E^0 := \{f \in Y \mid \forall x \in E : |f(x)| \leq 1\}$$

vektorruumis  $Y$  nimetatakse hulga  $E$  polaariks duaalsuse  $\langle X, Y \rangle$  suhtes.

Analoogiliselt defineeritakse hulga  $G \subset Y$  polaar  $G^0$  vektorruumis  $X$ :

$$G^0 := \{x \in X \mid \forall f \in G : |f(x)| \leq 1\}.$$

Polaari mõiste osutub tõhusaks instrumendiks duaalsuseteoorias. Märgime järgmisi polaariga seotud omadusi.

**Ülesanne 8.6.** Näidata, et  $E \subset F \Rightarrow F^0 \subset E^0$ .

**Ülesanne 8.7.** Näidata, et  $(\lambda E)^0 = \frac{1}{\lambda} E^0$  ( $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ ).

**Ülesanne 8.8.** Näidata, et  $\left( \bigcup_{\alpha \in \Gamma} E_\alpha \right)^0 = \bigcap_{\alpha \in \Gamma} E_\alpha^0$ .

**Ülesanne 8.9.** Tõestada, et  $E^0$  on  $\sigma(Y, X)$ -kinnine absoluutsest kumer hulk.

**Ülesanne 8.10.** Vektoralamruumi  $X_0 \subset X$  korral

$$(X_0)^0 = (X_0)^\perp := \{f \in Y \mid \forall x \in X_0 : f(x) = 0\}.$$

**Lause 8.8.** Olgu  $\mathfrak{B}$  nulliumbruste baas LKR-s  $(X, \tau)$ . Ruumi  $X$  kaasruum  $X'$  langeb kokku ühendiga  $\bigcup \{U^0 \mid U \in \mathfrak{B}\}$ , kus polaarid on võetud **duaalsuse**  $\langle X, X^* \rangle$  suhtes.

**Tõestus.** Väide järeltub tõsiasjast, et lineaarne funktsionaal  $f: X \rightarrow \mathbb{K}$  on pidev paraasti siis, kui leidub nulliumbrus  $U \in \mathfrak{B}$  omadusega  $|f(x)| \leq 1$  iga  $x \in U$  korral. ■

**Bipolaarid.** Polaari moodustamise operatsiooni võib rakendada järjest rohkem kui üks kord. Olgu  $\langle X, Y \rangle$  ja  $\langle Y, Z \rangle$  duaalsed paarid, kus  $X \subset Z \subset Y^*$ . Hulka  $E^{00} := (E^0)^0$ , kus esimene polaar on võetud duaalsuse  $\langle X, Y \rangle$  ja teine  $\langle Y, Z \rangle$  suhtes, nimetatakse hulga  $E$  *bipolaariks* (vaadeldavate duaalsuste suhtes).

**Ülesanne 8.11.** Näidata, et  $E \subset E^{00}$ .

**Lause 8.9 (teoreem bipolaarist).** Olgu  $\langle X, Y \rangle$  ja  $\langle Y, Z \rangle$  duaalsed paarid, kus  $X \subset Z \subset Y^*$ . Hulga  $E \subset X$  bipolaar  $E^{00}$  vektorruumis  $Z$  langeb kokku ruumis  $Z$  võetud  $\sigma(Z, Y)$ -kinnise absoluutsest kumera kattega, s.t.

$$E^{00} = \overline{\text{absconv}} E^{\sigma(Z, Y)}.$$

**Tõestus.** Tähistame  $C := \overline{\text{absconv}} E^{\sigma(Z, Y)}$ , seejuures vaatleme hulka  $E$  vektoruumi  $Z$  alamhulgana. Ilmselt on  $C$   $\sigma(Z, Y)$ -kinnine absoluutsest kumer hulk (vrd. lause 5.3). Seosest  $E \subset E^{00}$  ja ülesandest 8.9 saame sisalduvuse  $E^{00} \supset C$  (kontrollida!)☒. Vastupidise sisalduvuse töestamiseks võtame suvalise  $G \in Z \setminus C$  ning näitame, et  $G \notin E^{00}$ . Vastavalt teoreemile 7.15(a) leiate elemendi  $\varphi \in (Z, \sigma(Z, Y))'$ , mis rahuldab tingimust

$$|\varphi(F)| \leq 1 \quad (F \in \text{absconv} E), \quad |\varphi(G)| > 1.$$

Kuna  $\varphi \in Y$  ja  $F, G \in Z \subset Y^*$ , võime sama tingimuse kirjutada kujul

$$\exists f \in Y : |F(f)| \leq 1 \quad (F \in \text{absconv} E), \quad |G(f)| > 1.$$

Kui pidada silmas, et  $E \subset \text{absconv} E \subset X$ , saame  $|f(x)| \leq 1$  iga  $x \in E$  korral, mis tähdab, et  $f \in E^0$ . Seosest  $|G(f)| > 1$  järeltub seega  $G \notin E^{00}$ . Niisiis,  $E^{00} \subset C$  ja kokkuvõttes  $E^{00} = C$ . ■

Enamasti kasutame me teoreemi bipolaarist juhul  $Z = X$ . Kui  $X$  on eralduv LKR, siis alamhulga  $E \subset X$  bipolaari  $E^{00}$  all mõistame me duaalsuste  $\langle X, X' \rangle$  ja  $\langle X', X \rangle$  suhtes võetud bipolaari, s.t.

$$E^{00} = \{x \in X \mid \text{kui } f \in X' \text{ ja iga } z \in E \text{ korral } |f(z)| \leq 1, \text{ siis } |f(x)| \leq 1\}.$$

**Järeldus 8.10.** Eraldava LKR-i  $(X, \tau)$  alamhulga  $E$  bipolaar  $E^{00}$  on hulga  $E$  absoluutsest kumera katte sulund LKR-s  $X$ , s.t.  $E^{00} = \overline{\text{absconv}} E^\tau$ .

**Järeldus 8.11.** Kui  $E$  on eraldava LKR-i  $X$  alamhulk, siis  $E^{000} := (E^{00})^0 = E^0$ .

## 9 Polaartopoloogiad

### 9.1 $\mathfrak{S}$ -topoloogiad ja võrdpidevad hulgad

Polaaride abil on antud duaalse paari  $\langle X, Y \rangle$  korral mugav defineerida lokaalselt kumeraid topoloogiaid nii ruumis  $X$  kui ka ruumis  $Y$ . **Idee** on järgmine. Me fikseerime vektorruumis  $Y$  mingi selliste alamhulkade  $S$  süsteemi  $\mathfrak{S}$ , et nende polaarid  $S^0$  oleksid vektorruumis  $X$  neelavad hulgad. Kuna polaarid on alati absoluutselt kumerad, siis sel juhul on süsteem  $\{S^0 \mid S \in \mathfrak{S}\}$  mingi lokaalselt kumera topoloogia nulliumbruste prebaas (vrd. art. 7.1). Seejuures huvitavad meid eeskätt kaks küsimust. Esiteks, kuidas valida süsteem  $\mathfrak{S}$  nii, et saadud topoloogia oleks eralduv, ja teiseks, millistel eeldustel on see topoloogia duaalsusega  $\langle X, Y \rangle$  kooskõlas?

Kõigepealt kirjeldame hulki  $S \subset Y$ , mille **polaar**  $S^0 \subset X$  on neelav alamhulk.

**Lause 9.1.** *Olgu  $\langle X, Y \rangle$  duaalne paar. Alamhulga  $B \subset Y$  polaar  $B^0$  on neelav hulk vektorruumis  $X$  parajasti siis, kui  $B$  on  $\sigma(Y, X)$ -tõkestatud.*

**Tõestus.** Paneme tähele, et suvaliste  $x \in X$  ja  $\lambda > 0$  korral

$$\lambda x \in B^0 \Leftrightarrow \forall f \in B : |f(x)| \leq \frac{1}{\lambda} =: M.$$

Teiste sõnadega, polaar  $B^0$  neelab elemendi  $x \in X$  parajasti siis, kui

$$\exists M > 0 : |f(x)| \leq M \text{ iga } f \in B \text{ korral,}$$

s.t. kui seosega  $p_x(f) = |f(x)|$  vektorruumis  $Y$  määratud poolnorm  $p_x$  (vrd. art. 8.2, märkus 4<sup>0</sup>) on hulgas  $B$  tõkestatud. Järelkult neelab  $B^0$  iga elemendi  $x \in X$  (s.t.  $B^0$  on neelav) parajasti siis, kui kõik poolnormid  $p_x$ , kus  $x \in X$ , on hulgas  $B$  tõkestatud, s.t. kui  $B$  on  $\sigma(Y, X)$ -tõkestatud. ■

Lausel 9.1 põhineb talle eelnenuud märkuses esitatud topoloogiate konstrueerimise idee. Selle järgi määratud lokaalselt kumerad topoloogiad on lihtsalt kirjeldatavad nii geomeetriselt (s.t. nulliumbruste baasi abil) kui ka analüütiliselt (s.o. poolnormide keeles).

**Polaartopoloogiad.** Olgu  $\mathfrak{S}$  vektorruumi  $Y$  mingi  $\sigma(Y, X)$ -tõkestatud alamhulkade süsteem, tähistame  $\mathfrak{B}_0 := \{S^0 \mid S \in \mathfrak{S}\}$ . Tegemist on neelavate absoluutselt kumerate alamhulkade süsteemiga vektorruumis  $X$ , mistõttu süsteem

$$\mathfrak{B} := \left\{ \varepsilon \bigcap_{i=1}^n (S_i)^0 \mid \varepsilon > 0, S_1, \dots, S_n \in \mathfrak{S}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

on teatava lokaalselt kumera topoloogia  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$  nulliumbruste baas vektorruumis  $X$  (vrd. art. 7.1). Topoloogiat  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$  nimetatakse *süsteemiga  $\mathfrak{S}$  määratud polaartopoloogiaks ehk ühtlase koonduvuse topoloogiaks süsteemi  $\mathfrak{S}$  alamhulkades*. Üldiselt nimetame selliselt konstrueeritud topoloogiaid *polaartopoloogiateks* ehk  $\mathfrak{S}$ -topoloogiateks.

Esitame mõned **tähelepanekud seoses baasiga  $\mathfrak{B}$ .** **Esiteks**, on selge, et tänu seosele  $S^0 = S^{000}$  topoloogia  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$  nulliumbruste baas  $\mathfrak{B}$  ei muutu, kui asendame esialgses etteantud

süsteemis  $\mathfrak{S}$  hulgad  $S$  nende bipolaaridega  $S^{00} = \overline{\text{absconv}} S^{\sigma(Y,X)}$ . Seega võime alati eeldada, et hulgad  $S \in \mathfrak{S}$  on absoluutelt kumerad ja  $\sigma(Y, X)$ -kinnised.

**Teiseks**, topoloogia  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$  ei muudu, kui  $\mathfrak{S}$  asendada süsteemiga  $\widehat{\mathfrak{S}} := \{\alpha S \mid \alpha > 0, S \in \mathfrak{S}\}$ , sest  $\mathfrak{B}_0 \subset \{\alpha S^0 \mid \alpha > 0, S \in \mathfrak{S}\} \subset \mathfrak{B}$  (vt. lausele 7.2 järgnev märkus). Analoogiliselt võime süsteemi  $\mathfrak{S}$  asendada lõplike ühendite süsteemiga  $\{S_1 \cup \dots \cup S_n \mid S_1, \dots, S_n \in \mathfrak{S}, n \in \mathbb{N}\}$ .

Niisiis võime vajaduse korral eeldada, et süsteem  $\mathfrak{S}$  rahuldab tingimusi

(PT<sub>1</sub>)  $S_1, S_2 \in \mathfrak{S} \Rightarrow \exists S \in \mathfrak{S} : S_1 \cup S_2 \subset S$ ,

(PT<sub>2</sub>)  $S \in \mathfrak{S}, \lambda > 0 \Rightarrow \lambda S \in \mathfrak{S}$ .

Veendume, et eeldustel (PT<sub>1</sub>) ja (PT<sub>2</sub>) on topoloogia  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$  nulliumbruste prebaas  $\mathfrak{B}_0$  tegelikult nulliumbruste baas. Võtame suvalise  $U = \varepsilon \bigcap_{i=1}^n (S_i)^0 \in \mathfrak{B}$  ja näitame, et leidub  $S \in \mathfrak{S}$  omadusega  $S^0 \subset U$ . Polaaride omaduste kohaselt kehtib seos

$$U = \left( \frac{1}{\varepsilon} \bigcup_{i=1}^n S_i \right)^0.$$

Tingimuse (PT<sub>1</sub>) põhjal saame leida  $S' \in \mathfrak{S}$  omadusega  $S' \supset \bigcup_{i=1}^n S_i$ . Olgu  $S := \frac{1}{\varepsilon} S'$ , siis  $S \in \mathfrak{S}$  (vrd. (PT<sub>2</sub>)) ja

$$S^0 = \varepsilon S'^0 \subset \varepsilon \left( \bigcup_{i=1}^n S_i \right)^0 = \varepsilon \bigcap_{i=1}^n (S_i)^0 = U.$$

Püstitame nüüd küsimuse **polaartopololoogia  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$  eralduvusest**. Selleks on tarvilik ja piisav tingimus (vt. lause 7.2)

$$\forall x \in X \setminus \{0\} \ \exists S \in \mathfrak{S} \ \exists \lambda > 0 : x \notin \lambda S^0,$$

mille võib esitada mitmel erineval kujul:

$$\begin{aligned} \forall x \in X \setminus \{0\} \ \exists S \in \mathfrak{S} \ \exists \lambda > 0 \ \exists f \in S : |f(x)| > \lambda \\ \Leftrightarrow \forall x \in X \setminus \{0\} \ \exists f \in \bigcup \{S \mid S \in \mathfrak{S}\} : f(x) \neq 0 \\ \Leftrightarrow H_0 := \bigcup \{S \mid S \in \mathfrak{S}\} \text{ eraldab punktid vektorruumis } X. \end{aligned}$$

Näitame, et viimane tingimus on samaväärne nõudega

(PT<sub>3</sub>)  $\overline{\text{span}} \bigcup \{S \mid S \in \mathfrak{S}\}^{\sigma(Y,X)} = Y$ .

Tõepoolest, teoreemi 7.15(b) põhjal (veenduda!)  $\blacksquare$

$$\begin{aligned} \overline{\text{span}} H_0^{\sigma(Y,X)} \neq Y &\Leftrightarrow \exists f_0 \in Y \setminus \overline{\text{span}} H_0 \\ &\Leftrightarrow \exists x \in X : F_x(f) = 0 \ (f \in \text{span} H_0), F_x(f_0) \neq 0 \\ &\Leftrightarrow \exists x \in X \setminus \{0\} \ \forall f \in \text{span} H_0 : F_x(f) = 0 \ [\text{siin } F_x(f) := f(x)] \\ &\Leftrightarrow \exists x \in X \setminus \{0\} \ \forall f \in H_0 : f(x) = 0 \\ &\Leftrightarrow H_0 \text{ ei eralda punkte ruumis } X. \end{aligned}$$

Niisiis, tingimus (PT<sub>3</sub>) on tarvilik ja piisav polaartopololoogia  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$  eralduvuseks.

**$\mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$  kirjeldamine poolnormide abil.** Lause 7.3(b) põhjal on topoloogia  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$  määratud poolnormide süsteemiga  $\{p_{S^0}\}_{S \in \mathfrak{S}}$ , kus  $p_{S^0}$  on hulga  $S^0$  Minkowski funktsionaal. Seejuures

$$\begin{aligned} p_{S^0}(x) &= \inf \{\mu > 0 \mid x \in \mu S^0\} = \inf \{\mu > 0 \mid \forall f \in S : |f(x)| \leq \mu\} \\ &= \inf \left\{ \mu > 0 \mid \frac{1}{\mu} \sup_{f \in S} |f(x)| \leq 1 \right\} \\ &= \sup_{f \in S} |f(x)| \quad (x \in X), \end{aligned}$$

seega on  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$  määratud poolnormide süsteemiga  $\{p^{(S)}\}_{S \in \mathfrak{S}}$ , kus

$$p^{(S)}(x) := \sup_{f \in S} |f(x)| \quad (x \in X).$$

Siit selgub ka, miks topoloogiat  $T_{\mathfrak{S}}$  nimetatakse ühtlase koonduvuse topoloogiaks:

$$\begin{aligned} x_\alpha \rightarrow x \quad (\mathcal{T}_{\mathfrak{S}}) &\Leftrightarrow \forall S \in \mathfrak{S} : p^{(S)}(x_\alpha - x) \rightarrow 0 \\ &\Leftrightarrow \forall S \in \mathfrak{S} : \sup_{f \in S} |f(x_\alpha) - f(x)| \rightarrow 0 \\ &\Leftrightarrow \forall S \in \mathfrak{S} : f(x_\alpha) \rightarrow f(x) \text{ ühtlaselt hulgas } S. \end{aligned}$$

**Tugev topoloogia.** Rõhutame veel kord asjaolu, et hulkade  $S \in \mathfrak{S}$   $\sigma(Y, X)$ -tõkestatust on vajalik eeldus, sest vastasel juhul ei oleks  $S^0$  neelav hulk. Niisiis, tugevaim duaalse paariga  $\langle X, Y \rangle$  määratud polaartopoloogia vektorruumis  $X$  on määratud kõigi  $\sigma(Y, X)$ -tõkestatud alamhulkade süsteemiga  $\mathfrak{S}_b$  vektorruumis  $Y$ . Loomulikult rahuldab süsteem  $\mathfrak{S}_b$  tingimusi **(PT<sub>1</sub>)** – **(PT<sub>3</sub>)**. Vastavat polaartopoloogiat  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}_b}$  vektorruumis  $X$  nimetatakse *tugevaks topoloogiaks* ja tähistatakse  $\beta(X, Y)$ . Tänu seosele  $\mathfrak{S}_1 \subset \mathfrak{S}_2 \Rightarrow \mathcal{T}_{\mathfrak{S}_1} \subset \mathcal{T}_{\mathfrak{S}_2}$  (põhjendada!)☒ on  $\beta(X, Y)$  tõepoolest tugevam kõikidest polaartopoloogiatest, mida on võimalik duaalse paariga  $\langle X, Y \rangle$  määräata.

Paneme tähele, et **nõrk topoloogia on polaartopoloogia**, nimelt  $\sigma(X, Y) = \mathcal{T}_{\mathfrak{S}_\sigma}$ , kus  $\mathfrak{S}_\sigma$  on kõigi ühe-elemendiliste alamhulkade süsteem  $\{\{f\} \mid f \in Y\}$ . Arutelust, mis eelnes tingimuste **(PT<sub>1</sub>)** ja **(PT<sub>2</sub>)** formuleerimisele, järeltub, et sellesama topoloogia saame siis, kui  $\mathfrak{S}_\sigma$  on kõigi lõplike alamhulkade  $S \subset Y$  süsteem, sel juhul on ka nõuded **(PT<sub>1</sub>)** ja **(PT<sub>2</sub>)** rahuldatud.

**Lause 9.2.** *Iga eralduv lokaalselt kumer topoloogia  $\tau$  vektorruumis  $X$  on polaartopoloogia. Täpsemalt,  $\tau = \mathcal{T}_{\mathfrak{S}^0}$ , kus  $\mathfrak{S}^0 := \{U^0 \mid U \in \mathfrak{B}\}$  ja  $\mathfrak{B}$  on  $\tau$ -nulliumbruste baas.*

**Tõestus.** Olgu  $\mathfrak{B}$  eralduva LKR-i  $(X, \tau)$  nulliumbruste baas, mis koosneb kinnistest absoluutsest kumeratest hulkadest (vrd. lause 7.1). Sel juhul  $U = U^{00}$  (vt. järeltus 8.11), ning  $\tau = \mathcal{T}_{\mathfrak{S}^0}$ , kus  $\mathfrak{S}^0 := \{U^0 \mid U \in \mathfrak{B}\}$  ja polaarid võetakse duaalsuse  $\langle X, X' \rangle$  suhtes. ■

**Võrdpidevad hulgad. Definitsioon.** Olgu  $(X, \tau)$  TVR. Alahulka  $S \subset X'$  nimetatakse *võrdpidevaks* (täpsemalt  $\tau$ -*võrdpidevaks*), kui on täidetud tingimus

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists U \in \mathfrak{B} : |f(x)| \leq \varepsilon \quad (x \in U, f \in S).$$

Järgmine lause annab polaaride abil võrdpidevuse mõistele lihtsa kirjelduse.

**Lause 9.3.** *Eralduva LKR-i  $X$  puhul on alamhulk  $S \subset X'$  võrdpidev parajasti siis, kui ta sisaldub minge  $\tau$ -nulliumbruse  $U$  polaaris  $U^0$ , mis on võetud duaalsuse  $\langle X, X' \rangle$  suhtes.*

**Tõestus.** Iseseisvalt!  $\blacksquare$

**Ülesanne 9.1.** Tõestada, et kui  $S$  on  $\tau$ -võrdpidev hulk, siis  $\alpha S$  on  $\tau$ -võrdpidev iga  $\alpha > 0$  korral.

**Ülesanne 9.2.** Tõestada, et kui  $S_1$  ja  $S_2$  on  $\tau$ -võrdpidevad hulgad, siis ka  $S_1 \cup S_2$  on  $\tau$ -võrdpidev.

Lausetest 9.2 ja 9.3 tuleneb järgmine teoreem.

**Teoreem 9.4.** *Iga eralduv lokaalselt kumer topoloogia  $\tau$  vektorruumis  $X$  on ühtlase koonduvuse topoloogia kõigis  $\tau$ -võrdpidevates alamhulkades.*

**Tõestus.** Olgu  $\mathfrak{B}$  ruumi  $X$  nulliumbruste baas, mis koosneb kinnistest absoluutsest kumeratest hulkadest. Tähistame sümboliga  $\mathfrak{S}_\tau$  kõigi  $\tau$ -võrdpidevate alamhulkade süsteemi, olgu  $\mathfrak{S}^0 := \{U^0 \mid U \in \mathfrak{B}\}$ . Teatavasti  $\tau = \mathcal{T}_{\mathfrak{S}^0}$  (vrd. lause 9.2), lause 9.3 põhjal  $\mathfrak{S}^0 \subset \mathfrak{S}_\tau$  (iga nulliumbruse polaar kaasruumis on võrdpidev), seetõttu  $\tau \subset \mathcal{T}_{\mathfrak{S}_\tau}$ .

Teiselt poolt, kui  $S \in \mathfrak{S}_\tau$ , siis leidub  $U \in \mathfrak{B}$  omadusega  $S \subset U^0$  (vrd lause 9.3). Seega

$$\forall S \in \mathfrak{S}_\tau \exists U \in \mathfrak{B} : S^0 \supset U^0 = U,$$

tähendab,  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}_\tau} \subset \tau$ . Kokkuvõttes saame, et  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}_\tau} = \tau$ .  $\blacksquare$

Võrdpidevate hulkadega tuleb meil tegemist ka edaspidi, seetõttu märgime mõned nende **olulisemad omadused**, mille tõestused jääävad lugejale harjutusülesanneteeks. Me eeldame, et  $(X, \tau)$  on eralduv LKR. Siis

- iga lõplik alamhulk  $S \subset X'$  on võrdpidev  $\blacksquare$ ,
- võrdpideva hulga  $S \subset X'$  alamhulk on võrdpidev  $\blacksquare$ ,
- kui  $S \subset X'$  on võrdpidev, siis ka  $S^{00}$  on võrdpidev  $\blacksquare$ ,
- kui  $S \subset X'$  on võrdpidev, siis ka  $\overline{S}^{\sigma(X', X)}$  ja absconv  $S$  on võrdpidevad  $\blacksquare$ ,
- iga võrdpidev alamhulk  $S \subset X'$  on  $\sigma(X', X)$ -tõkestatud  $\blacksquare$ .

## 9.2 Mackey topoloogia

Nagu eelmises peatükis öeldud, on duaalsuseteoria üheks eesmärgiks kirjeldada neid lokaalselt kumeraid topoloogiaid, mis on antud duaalsusega kooskõlas. Me oleme varustanud end sobiva uurimisparatuuriga polaaride ja polaartopoloogiate näol ning oleme nüüd valmis seda ülesannet lahendama. Seejuures vajame me kahte järgmist ettevalmistavat lauset.

**Lause 9.5.** *Iga vektorruumi  $X$  korral on tema algebrailine kaasruum  $X^*$  nõrgas topoloogias  $\sigma(X^*, X)$  täielik LKR.*

**Tõestus.** Olgu  $(f_\alpha)_{\alpha \in \Gamma}$  suvaline  $\sigma(X^*, X)$ -Cauchy pere ruumis  $X^*$ , s.t. (vrd. art. 3.2)

$$\forall \varepsilon > 0 \forall x \in X \exists \alpha_0 \in \Gamma : \alpha, \alpha' \geq \alpha_0 \Rightarrow |f_\alpha(x) - f_{\alpha'}(x)| \leq \varepsilon.$$

Seega on arvpere  $(f_\alpha(x))$  iga fikseeritud  $x \in X$  korral Cauchy pere ning seega koonduv, olgu  $f(x) := \lim_{\alpha \in \Gamma} f_\alpha(x)$ . On selge, et  $f$  on lineaarne, s.t.  $f \in X^*$ , ja  $f_\alpha \rightarrow f(\sigma(X^*, X))$ .  $\blacksquare$

**Lause 9.6 (Alaoglu teoreem).** Eralduva LKR-i  $(X, \tau)$  iga nulliumbruse  $U$  polaar  $U^0$ , mis on moodustatud duaalsuse  $\langle X, X' \rangle$  suhtes, on  $\sigma(X', X)$ -kompaktne alamhulk ruumis  $X'$ . Seejuures  $U^0 = U^\oplus$ , kus  $^\oplus$  tähistab polaari duaalsuse  $\langle X, X^* \rangle$  suhtes.

**Tõestus.** Selge, et  $U^0 = U^\oplus \cap X'$ . Ühelt poolt on  $U^\oplus$  kui kinnine alamhulk **täielikus** LKR-s  $(X^*, \sigma(X^*, X))$  selles ruumis täielik. Teisalt, kuna  $U^{\oplus\oplus}$  sisaldab neelava hulga  $U$ , siis lause 9.1 põhjal on  $U^\oplus$  tõkestatud LKR-s  $(X^*, \sigma(X^*, X))$ , lause 8.1 kohaselt on  $U^\oplus$  täielikult tõkestatud. Seega tuleneb teoreemist 3.7 hulga  $U^\oplus$   $\sigma(X^*, X)$ -kompaktsus. Näitame, et tegelikult  $U^0 = U^\oplus$ . Sisalduvuse  $U^\oplus \subset U^0$  kontrollimiseks märgime, et kui  $f \in U^\oplus$ , siis  $f$  on tõkestatud  $\tau$ -nulliumbruses  $U$ , lause 6.1 põhjal on ta  $\tau$ -pidev, s.t.  $f \in X'$ . Me näitasime, et  $U^\oplus \subset X'$ , järelkult  $U^0 = U^\oplus$ . Kuna  $\sigma(X^*, X) |_{X'} = \sigma(X', X)$ , siis  $U^0$  on topoloogias  $\sigma(X', X)$  kompaktne. Lause on tõestatud. ■

**Mackey topoloogia.** Olgu  $\langle X, Y \rangle$  suvaline duaalne paar. Paneme tähele, et alamhulkade süsteemiga

$$\mathfrak{S}_0 := \{S \subset Y \mid S \text{ on } \sigma(Y, X)\text{-kompaktne ja absoluutsest kumer}\}$$

määratud polaartopoloogia  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}_0}$  on tugevam kui nõrk topoloogia  $\sigma(X, Y)$ . Tõepoolest, kuna  $\sigma(X, Y) = \mathcal{T}_{\mathfrak{S}_\sigma}$ , kus  $\mathfrak{S}_\sigma := \{S^{00} \mid S \subset Y \text{ on lõplik hulk}\}$  ja  $S^{00}$  on Alaoglu teoreemi kohaselt  $\sigma(Y, X)$ -kompaktne, siis  $\mathfrak{S}_\sigma \subset \mathfrak{S}_0$ , mistõttu  $\sigma(X, Y) \subset \mathcal{T}_{\mathfrak{S}_0}$ . Siit tuleneb muuhulgas, et  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}_0}$  on eralduv topoloogia (selgitada!)☒.

Näitame, et  $\mathfrak{S}_0$  rahuldab nõudeid **(PT<sub>1</sub>)** ja **(PT<sub>2</sub>)**, siis  $\mathfrak{B}_0 := \{S^0 \mid S \in \mathfrak{S}_0\}$  on nulliumbruste baas topoloogias  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}_0}$ . Tingimuse **(PT<sub>1</sub>)** kontrollimiseks olgu  $S_1, S_2 \in \mathfrak{S}_0$ , moodustame hulga  $S := \text{absconv}(S_1 \cup S_2)$ , lause 5.5 kohaselt on  $S$   $\sigma(Y, X)$ -kompaktne. Kuna  $S$  on ka absoluutsest kumer, siis  $S \in \mathfrak{S}_0$ , seejuures  $S \supset S_1 \cup S_2$ , seega on tingimus **(PT<sub>1</sub>)** süsteemi  $\mathfrak{S}_0$  puhul täidetud. Tingimus **(PT<sub>2</sub>)** on täidetud, sest  $\lambda S$  on iga  $S \in \mathfrak{S}_0$  ja  $\lambda > 0$  korral absoluutsest kumer  $\sigma(Y, X)$ -kompaktne hulk.

Lisaks märgime, et  $S = S^{00}$  iga  $S \in \mathfrak{S}_0$  korral (põhjendada!)☒.

**Definitsioon.** Polaartopoloogiat  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}_0}$  nimetatakse (duaalse paari  $\langle X, Y \rangle$  määratud) **Mackey topoloogiaks** vektorruumis  $X$  ja tähistatakse  $\tau(X, Y)$ .

**Mackey topoloogia tähtsus** selgub järgnevast lausest, mis on duaalsuseteooria üks olulisemaid väiteid.

**Teoreem 9.7 (Mackey-Arensi teoreem).** Eralduv lokaalselt kumer topoloogia  $\tau$  vektorruumis  $X$  on antud duaalsusega  $\langle X, Y \rangle$  kooskõlas parajasti siis, kui  $\sigma(X, Y) \subset \tau \subset \tau(X, Y)$ . Seejuures leidub süsteemi  $\mathfrak{S}_0$  selline alamsüsteem  $\mathfrak{S}$ , et  $\tau = \mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$ .

**Tõestus.** **Tarvilikkus.** Olgu  $(X, \tau)' = Y$ . Ühelt poolt  $\sigma(X, Y) \subset \tau$  teoreemi 8.4 põhjal, teisalt langeb  $\tau$  kokku polaartopoloogiaga  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$ , kus  $\mathfrak{S} := \{U^0 \mid U \in \mathfrak{B}\}$  ja  $\mathfrak{B}$  on  $\tau$ -nulliumbruste baas (vrd. lause 9.2). Märgime, et hulgad  $U^0 \in \mathfrak{S}$  on Alaoglu teoreemi kohaselt  $\sigma(Y, X)$ -kompaktsed. Seega  $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{S}_0$ , mis tähindab sisalduvust  $\tau \subset \tau(X, Y)$ . Ühtlasi tõestasime ka väite teise osa, s.t. me leidsime  $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{S}_0$  omadusega  $\tau = \mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$ .

**Piisavus.** Olgu  $\sigma(X, Y) \subset \tau \subset \tau(X, Y)$ , siis

$$Y = (X, \sigma(X, Y))' \subset X' := (X, \tau)' \subset (X, \tau(X, Y))'.$$

Näitame, et  $H := (X, \tau(X, Y))' = Y$ , sel juhul kehtib ka seos  $X' = Y$ , mida me tahame tõestada.

Paneme tähele, et iga  $S \in \mathfrak{S}_0$  on tänu oma  $\sigma(Y, X)$ -kompaktsusele  $\sigma(H, X)$ -kinnine. Et selles veenduda, võtame hulga  $S$  sellise elementide pere  $(f_\alpha)_{\alpha \in \Gamma}$ , mis on  $\sigma(H, X)$ -koonduv mingiks punktiks  $f \in H$ , ja näitame, et  $f \in S$ . Hulga  $S$  nõrga kompaktsuse tõttu leidub osapere  $(g_\beta)_{\beta \in \Delta}$  omadusega  $g_\beta \rightarrow g$  ( $\sigma(Y, X)$ ), kus  $g \in S$ . Kuna  $\sigma(H, X)|_Y = \sigma(Y, X)$  (vrd. (8.8)), siis  $g_\beta \rightarrow g$  ( $\sigma(H, X)$ ). Koonduva pere iga osapere koondub üheks ja samaks piirväärtsuseks, seetõttu  $f = g \in S$ .

Hulga  $S \in \mathfrak{S}_0$   $\sigma(H, X)$ -kinnisuse tõttu

$$S^{00} = \overline{\text{absconv}} S^{\sigma(H, X)} = \overline{S^{\sigma(H, X)}} = S \subset Y.$$

Lausest 8.8 järelt, et  $H = \cup \{S^{00} \mid S \in \mathfrak{S}\} \subset Y$ , s.t.  $H = Y$ . Teoreem on tõestatud. ■

Mackey-Arensi teoreemist saame vahetute järeldustena järgmised kaks väidet.

**Järeldus 9.8.** *Mackey topoloogia  $\tau(X, Y)$  on tugevaim lokaalselt kumer topoloogia vektorruumis  $X$ , mis on duaalsusega  $\langle X, Y \rangle$  kooskõlas.*

**Järeldus 9.9.** *Eralduv lokaalselt kumer topoloogia  $\tau$  vektorruumis  $X$  on duaalsusega  $\langle X, Y \rangle$  kooskõlas parajasti siis, kui ta on esitatav polaartopoloogiana  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}}$ , kus  $\mathfrak{S}$  on vektorruumi  $Y$  minge absoluutsest kumerate  $\sigma(Y, X)$ -kompaktsete alamhulkade süsteem.*

### 9.3 Mackey teoreem tõestatud hulkadest

Selle artikli eesmärgiks on tõestada järgmine tähtis väide.

**Teoreem 9.10 (Mackey teoreem).** *Eralduva LKR-i  $X$  alamhulk  $E$  on tõestatud parajasti siis, kui ta on nõrgalt (s.t.  $\sigma(X, X')$ -)tõestatud.*

Mackey teoreemist tuleneb lihtsalt järgmine oluline fakt (kontrollida!)  $\blacksquare$ .

**Järeldus 9.11.** *Antud duaalsusega  $\langle X, Y \rangle$  kooskõlas olevatel lokaalselt kumeratel topologiatel vektorruumis  $X$  on ühed ja samad tõestatud hulgad.*

Mackey teoreemi tõestuseks vajalikku eeltööd alustame järgmiste **tähelepanekutega**.

**(I)** Olgu  $V$  vektorruumi  $X$  absoluutsest kumer alamhulk. Näitame, et

$$X_V := \text{span}V = \bigcup_{n=1}^{\infty} nV. \quad (9.1)$$

Õieti on vaja kontrollida vaid sisalduvust  $\text{span}V \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} nV$ , vastupidise sisalduvuse kehtivuses ei ole kahtlust. Niisiis, olgu  $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m \in \text{span}V$ , kus  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$  ja  $x_1, \dots, x_m \in V$ . Sel juhul

$$x = \sum_{k=1}^m |\alpha_k| \frac{\alpha_k}{|\alpha_k|} x_k = \sum_{k=1}^m |\alpha_k| z_k,$$

kusjuures  $z_k := \frac{\alpha_k}{|\alpha_k|}x_k \in V$ , sest  $V$  on tasakaalus hulk. Hulga  $V$  kumeruse tõttu

$$x \in r \left( \frac{|\alpha_1|}{r}V + \dots + \frac{|\alpha_m|}{r}V \right) \subset rV,$$

kus  $r := |\alpha_1| + \dots + |\alpha_m|$ . Kui valida  $n_0 \in \mathbb{N}$  nii, et  $n_0 \geq r$ , siis

$$x \in rV \subset n_0V \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} nV.$$

Seosest (9.1) tuleneb, et *absoluutsest kumer alamhulk  $V$  on neelav vektorruumis  $X$  parajasti siis, kui  $\text{span}V = X$  (põhjendada!)*  $\blacksquare$ .

**(II)** Kuna  $X_V$  on vektorruum, milles tähelepaneku **(I)** kohaselt  $V$  on neelav hulk, siis tema Minkowski funktsionaal  $p_V$  on poolnorm vektorruumis  $X_V$ . Ta määrab mingi lokaalselt kumera topoloogia  $\tau_V$ , süsteem  $\{\varepsilon V \mid \varepsilon > 0\}$  on selle nulliumbruste baas.  $LKR(X_V, \tau_V)$  on eralduv parajasti siis, kui  $p_V$  on norm (kontrollida!)  $\blacksquare$ .

**(III)** Eeldame lisaks, et  $X$  on algsest eralduv  $LKR$  topoloogiaga  $\tau$ , milles  $V$  on tõkestatud alamhulk, ja näitame, et siis  $(X_V, p_V)$  on normeeritud ruum. Olgu  $\tau_0 := \tau|_{X_V}$ . Kui  $\mathfrak{B}$  on mingi nulliumbruste baas ruumis  $(X, \tau)$ , siis  $\mathfrak{B}_0 := \{U \cap X_V \mid U \in \mathfrak{B}\}$  on  $\tau_0$ -nulliumbruste baas. Kuna  $V$  on  $\tau$ -tõkestatud, siis iga  $U \in \mathfrak{B}$  puhul saab leida  $\varepsilon > 0$  omadusega  $\varepsilon V \subset U$ . See tähendab, et  $\tau_0 \subset \tau_V$ , millega järeltub topoloogia  $\tau_V$  eralduvus. Tähelepanekust **(II)** tuleneb, et  $(X_V, \tau_V)$  on normmeeruv.

**(IV)** Eeldame lõpuks, et  $V$  on **kompaktne** alamhulk eralduvas  $LKR$ -s  $(X, \tau)$ , ja näitame, et sel juhul on  $(X_V, p_V)$  Banachi ruum.

Kuna  $V$  on  $\tau$ -kompaktne alamhulk, siis on ta  $\tau$ -kinnine, seega ka  $\tau_0$ -kinnine, mistõttu  $V = \{x \in X \mid p_V(x) \leq 1\}$  (selgitada!)  $\blacksquare$ . Niisiis on  $V$  normeeritud ruumi  $(X_V, p_V)$  kinnine ühikerra. Olgu  $(x_n)$  suvaline Cauchy jada normeeritud ruumis  $(X_V, p_V)$ , tema tõkestatuse tõttu leidub  $M > 0$ , et  $p_V(x_n) \leq M$  kõikide  $n \in \mathbb{N}$  puhul. Tähistame  $z_n := \frac{1}{M}x_n$ , ilmselt on ka  $(z_n)$  Cauchy jada normeeritud ruumis  $(X_V, p_V)$  (põhjendada!)  $\blacksquare$ , samal ajal  $p_V(z_n) \leq 1$ , mistõttu  $z_n \in V$  (põhjendada!)  $\blacksquare$ . Olgu  $\varepsilon > 0$ . Leiame  $N \in \mathbb{N}$  omadusega

$$n, m \geq N \Rightarrow z_n \in z_m + \varepsilon V.$$

Hulga  $V$  kompakteuse tõttu  $LKR$ -s  $(X, \tau)$  saab jadast  $(z_n)$  eraldada sellise osapere  $(z_{n_\gamma})_{\gamma \in \Gamma}$ , mis koondub selles ruumis. Olgu  $z := \lim_{\gamma \in \Gamma} z_{n_\gamma}$ , siis  $z \in V$ . Kuna  $z_m + \varepsilon V$  on kinnine alamhulk  $LKR$ -s  $(X, \tau)$  (selgitada!)  $\blacksquare$ , siis sellest, et  $z_{n_\gamma} \in z_m + \varepsilon V$ , kui  $n_\gamma, m \geq N$ , järeltub seos  $z \in z_m + \varepsilon V$  iga  $m \geq N$  korral. Niisiis,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : m \geq N \Rightarrow z_m \in z + \varepsilon V$$

ehk  $z_m \rightarrow z$ , seega  $x_m \rightarrow x := Mz \in X_V$  normeeritud ruumis  $(X_V, p_V)$ . Tähendab,  $(X_V, p_V)$  on Banachi ruum.

Võtame eelneva arutelu kokku järgmises lauses.

**Lause 9.12.** *Iga absoluutsest kumer kompaktne alamhulk  $V$  eralduvas  $LKR$ -s  $X$  määrab Banachi ruumi  $(X_V, p_V)$ , kus  $X_V$  on hulga  $V$  lineaarne kate ja  $p_V$  selle hulga Minkowski funktsionaal vektorruumis  $X_V$ . Seejuures on normi  $p_V$  poolt määratud topoloogia tugevam kui ruumi  $X$  poolt indutseeritud topoloogia.*

Selle lause abil tõestame järgnevalt artikli algul sõnastatud Mackey teoreemi. Seejuures kasutame ühte funktsionaalanalüüsiga põhiprintsiipidest, nimelt Banachi ruumide teoriast tuntud *iütlase tõkestatuse printsipi*. See väidab, et *kui  $X$  ja  $Z$  on Banachi ruumid ja  $\mathfrak{A}$  on mõigi selline pidevate lineaarsete kujutuste  $A : X \rightarrow Z$  hulk, mis on punktiviisi tõkestatud, s.t.*

*iga  $x \in X$  korral on hulk  $\{A(x) \mid A \in \mathfrak{A}\}$  ruumis  $Z$  tõkestatud,*  
*siis  $\sup \{\|A\| \mid A \in \mathfrak{A}\} < \infty$ .*

**Teoreemi 9.10 tõestus.** Seose  $\sigma(X, X') \subset \tau$  tõttu on iga  $\tau$ -tõkestatud alamhulk vektorruumis  $X$  ka  $\sigma(X, X')$ -tõkestatud. Näitame, et kehtib vastupidine väide. Olgu  $E \subset X$  topoloogias  $\sigma(X, X')$  tõkestatud, s.t.

$$\forall f \in X' \exists M_f > 0 : |f(x)| \leq M_f \quad (x \in E). \quad (9.2)$$

Olgu  $\mathfrak{B}$  kinnistest absoluutsest kumeratest hulkadest koosnev  $\tau$ -nulliumbruste baas ja olgu  $U \in \mathfrak{B}$  fikseeritud nulliumbrus. Alaoglu teoreemi põhjal on  $V := U^0$  kompaktne absoluutsest kumer alamhulk LKR-s  $(X', \sigma(X', X))$ . Tähistame  $H := \text{span}V = (X')_V$ , normiga  $p_V$  on  $H$  lause 9.12 kohaselt Banachi ruum.

Edasi märgime, et iga fikseeritud  $x \in X$  puhul on  $\sigma(X', X)$ -pideva lineaarse funktsionaali

$$F_x : X' \rightarrow \mathbb{K}, \quad f \mapsto f(x)$$

ahend  $\varphi_x := F_x|_H$  pidev topoloogias  $\sigma(H, X) = \sigma(X', X)|_H$ . Kuna normi poolt määratud topoloogia on tugevam kui  $\sigma(H, X)$ , siis  $\varphi_x \in H' := (H, p_V)'$ . Tingimusest (9.2) tuleneb, et funktsionaalide hulk  $\{\varphi_x\}_{x \in E}$  on Banachi ruumis  $H$  punktiviisi tõkestatud, eespool tsiteeritud ütlase tõkestatuse printsibi kohaselt on  $\{\varphi_x\}_{x \in E}$  ühtlaselt, s.o. normi järgi tõkestatud. Seega leidub selline  $M > 0$ , et

$$\sup_{f \in V} |f(x)| = \sup_{f \in V} |\varphi_x(f)| \leq M \quad (x \in E)$$

ehk

$$\frac{1}{M} |f(x)| \leq 1 \quad (f \in V, x \in E),$$

s.t.  $\frac{1}{M} E \subset V^0 = U^{00} = U$ . Niisiis, iga  $U \in \mathfrak{B}$  korral leidub selline  $M > 0$ , et  $E \subset MU$ , tähendab  $E$  on tõkestatud topoloogias  $\tau$ . Teoreem on tõestatud.

Mackey teoreemi üheks rakenduseks on järgmine tähelepanuvääärne lause.

**Lause 9.13.** *Metriseeruv lokaalselt kumer topoloogia on Mackey topoloogia. Täpsemalt, kui  $LKR(X, \tau)$  on metriseeruv, siis  $\tau = \tau(X, X')$ .*

**Tõestus.** Olgu  $(X, \tau)$  metriseeruv LKR. Kuna  $\sigma(X, X') \subset \tau \subset \tau(X, X')$  (vt. teoreem 9.7), siis on vaja tõestada vaid sisalduvus  $\tau \supseteq \tau(X, X')$ . Moodustame absoluutsest kumeratest  $\tau$ -nulliumbrustest baasi  $\mathfrak{B} = \{V_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  omadusega  $V_{n+1} \subset V_n$ . Olgu  $V$  absoluutsest kumer  $\tau(X, X')$ -nulliumbrus, näitame, et  $V_n \subset V$  sobivalt valitud  $n$  puhul.

Oletame vastuväiteliselt, et  $V_n \not\subset V$  iga  $n \in \mathbb{N}$  korral. Siis  $V_n \not\subset nV$  iga  $n \in \mathbb{N}$  korral, sest vastasel juhul saaksime seose  $V \supset \frac{1}{n}V_n \supset V_m$  mingi sobivalt võetud  $m$  puhul. Valime punktid  $x_n \in V_n \setminus nV$ , siis  $x_n \rightarrow 0(\tau)$ , järelkult on jada  $(x_n)$   $\tau$ -tõkestatud. Mackey teoreemi kohaselt on  $(x_n)$  tõkestatud topoloogias  $\tau(X, X')$ . Seega leidub  $\delta > 0$  omadusega  $\delta \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset V$  ehk  $x_n \in \delta^{-1}V$  iga  $n \in \mathbb{N}$  korral. Viimane tingimus on ilmselt vastuolus jada  $(x_n)$  valikuga: kui  $n > \delta^{-1}$ , siis  $x_n \in \delta^{-1}V \subset nV$ . Niisiis leidub tõepooltest iga  $\tau(X, X')$ -nulliumbruse  $V$  jaoks  $V_n \in \mathfrak{B}$  omadusega  $V_n \subset V$ , mis lõppkokkuvõttes tähendab, et  $\tau = \tau(X, X')$ . ■

## 10 Tünniruumid ja F-ruumid

### 10.1 Tugev topoloogia ja tünniruum

**Veel tugevast topoloogiast.** Nagu me eespool märkisime, on antud duaalse paari  $\langle X, Y \rangle$  puhul lihtne leida tugevaimat polaartopoloogiat vektorruumis  $X$ . See on ühtlase koonduvuse topoloogia kõigis  $\sigma(Y, X)$ -tõkestatud alamhulkades, teatavasti nimetatakse seda tugevaks topoloogiaks ja tähistatakse  $\beta(X, Y)$  (vt. art. 9.1). Arusaadavalt kehtivad seosed

$$\sigma(X, Y) \subset \tau(X, Y) \subset \beta(X, Y).$$

Antud eralduva LKR-i  $(X, \tau)$  puhul huvitab meid selles kontekstis, millistel tingimustel langeb  $\tau$  kokku tugeva topoloogiaga  $\beta(X, X')$ .

Nagu eespool, tähistame sümboliga  $\mathfrak{S}_b$  kõigi  $\sigma(Y, X)$ -tõkestatud alamhulkade  $S \subset Y$  süsteemi. Tugeva topoloogia nulliumbruste baasiks on

$$\mathfrak{B} := \{S^0 \mid S \in \mathfrak{S}_b\}$$

(põhjendada!) $\blacksquare$ . Hulgad  $S^0$  on  $\sigma(X, Y)$ -kinnised, absoluutsest kumerad ja neelavad (selgitada!) $\blacksquare$ . Seejuures kuulub iga nimetatud kolme omadusega alamhulk  $U \subset X$  süsteemi  $\mathfrak{B}$  (veenduda!) $\blacksquare$ . Niisiis: *tugeva topoloogia  $\beta(X, Y)$  saab määrata nulliumbruste baasiga, mis koosneb kõikidest  $\sigma(X, Y)$ -kinnistest absoluutsest kumeratest neelavatest alamhulkadest vektorruumis  $X$ .* Sellised hulgad mängivad lokaalselt kumerates ruumides äärmiselt olulist rolli.

**Tünniruum. Definitsioon.** Kinnist absoluutsest kumerat neelavat alamhulka  $U$  LKR-s  $X$  nimetatakse *tünniks*. LKR-i  $X$ , milles iga tünn on nulliumbrus, nimetatakse *tünniruumiks*.

Lihitne on veenduda, et

- alamhulk  $U$  eralduvas LKR-s  $X$  on tünn parajasti siis, kui ta on neelav ning  $U^{00} = U$ , kus bipolaar on moodustatud duaalsuse  $\langle X, X' \rangle$  suhtes (kontrollida!) $\blacksquare$ ,
- alamhulk  $U$  eralduvas LKR-s  $X$  on tünn parajasti siis, kui leidub selline  $\sigma(X', X)$ -tõkestatud hulk  $S \subset X'$ , et  $U = S^0$  (põhjendada!) $\blacksquare$ ,
- kõigil antud duaalsusega  $\langle X, Y \rangle$  kooskõlas olevatel lokaalselt kumeratel topoloogiatel vektorruumis  $X$  on ühed ja samad tünnid (põhjendada!) $\blacksquare$  ja
- igas lokaalselt kumeras ruumis leidub tünnidest koosnev nulliumbruste baas (selgitada!); vrd. lause 7.1).

**Lause 10.1.** *Eralduva LKR-i  $(X, \tau)$  korral on järgmised väited samaväärsed:*

- (a)  $(X, \tau)$  on tünniruum,
- (b) iga  $\sigma(X', X)$ -tõkestatud alamhulk  $S \subset X'$  on  $\tau$ -võrdpidev,
- (c)  $\tau = \beta(X, X')$ ,
- (d)  $\tau = \tau(X, X') = \beta(X, X')$ ,
- (e) kehtib seos  $\tau = \tau(X, X')$  ja  $\beta(X, X')$  on duaalsusega  $\langle X, X' \rangle$  kooskõlas.

**Tõestus.** (a)  $\Rightarrow$  (b) Kui  $X$  on tünniruum ja alamhulk  $S \subset X'$  on  $\sigma(X', X)$ -tõkestatud, siis  $S^0$  on tünn LKR-s  $X$ . Seega on  $S^0$   $\tau$ -nulliumbrus, lause 9.3 kohaselt on  $S$   $\tau$ -võrdpidev.

(b)  $\Rightarrow$  (c) Kuna  $\tau \subset \tau(X, X') \subset \beta(X, X')$  (selgitada!) $\blacksquare$ , siis piisab veenduda, et eeldusel (b) kehtib sisalduvus  $\beta(X, X') \subset \tau$ . Olgu  $U$  suvaline  $\beta(X, X')$ -nulliumbrus, leiame  $S \in \mathfrak{S}_b$ ,

mille puhul  $S^0 \subset U$  (selgitada!) $\blacksquare$ . Alaghulk  $S$  on  $\sigma(X', X)$ -tõkestatud, eelduse (b) järgi on ta  $\tau$ -võrdpidev, järelikult on  $S^0$   $\tau$ -nulliumbris. Tähendab, iga  $\beta(X, X')$ -nulliumbruse  $U$  jaoks leidub  $\tau$ -nulliumbris  $V$  omadusega  $V \subset U$ , seega  $\beta(X, X') \subset \tau$ .

Implikatsioonide (c)  $\Rightarrow$  (d)  $\Rightarrow$  (e)  $\Rightarrow$  (c) kehtivus on ilmne, kui pidada silmas Mackey-Arensi teoreemi 9.7. Kuna iga tünn LKR-s  $(X, \tau)$  on  $\beta(X, X')$ -nulliumbris (vrd. enne definitsiooni toodud kommentaar), siis (c)  $\Rightarrow$  (a). Lause on tõestatud. ■

**Võrdpidevad hulgad pidevate lineaarsete kujutuste ruumis.** Lause 10.1 implikatsioon (a)  $\Rightarrow$  (b) on õige ka üldisemas kontekstis, kui pidevate lineaarsete funktsionaalide asemel vaadelda samade omadustega üldisemaid pidevaid lineaarseid kujutusi. Olgu  $X$  ja  $Z$  TVR-d. Meenutame, et sümboliga  $L(X, Z)$  tähistame kõigi pidevate lineaarsete kujutuste  $A: X \rightarrow Z$  vektorruumi. Lineaarne kujutus  $A: X \rightarrow Z$  on pidev parajasti siis, kui

$$\forall V \in \mathfrak{B}_Z \exists U \in \mathfrak{B}_X : A(U) \subset V,$$

kus  $\mathfrak{B}_X$  ja  $\mathfrak{B}_Z$  on nulliumbruste baas vastavalt ruumis  $X$  ja  $Z$ . Alaghulka  $\mathfrak{A} \subset L(X, Z)$  nimetatakse *võrdpidevaks*, kui

$$\forall V \in \mathfrak{B}_Z \exists U \in \mathfrak{B}_X : A(U) \subset V \text{ iga } A \in \mathfrak{A} \text{ korral.}$$

Lihne on näha, et erijuuhul  $Z = \mathbb{K}$  saame võrdpidevuse mõiste selles tähinduses, nagu me ta defineerisime artiklis 9.1.

**Ülesanne 10.1.** Veenduda, et iga võrdpidev hulk  $\mathfrak{A} \subset L(X, Z)$  on punktiviisi tõkestatud, s.t. hulk  $\{A(x) \mid A \in \mathfrak{A}\}$  on tõkestatud ruumis  $Z$  iga  $x \in X$  korral.

**Teoreem 10.2 (ühtlase tõkestatuse printsip).** Olgu  $(X, \tau)$  tünniruum ja olgu  $(Z, \tau')$  mingi LKR. Iga punktiviisi tõkestatud hulk  $\mathfrak{A} \subset L(X, Z)$  on võrdpidev.

**Tõestus.** Olgu  $\mathfrak{A} \subset L(X, Z)$  punktiviisi tõkestatud alaghulk. Moodustame ruumis  $Z$  kinnistest absoluutselt kumeratest nulliumbrustest koosneva baasi  $\mathfrak{B}_Z$ . Võtame  $V \in \mathfrak{B}_Z$  ning tähistame

$$U := \bigcap \{A^{-1}(V) \mid A \in \mathfrak{A}\}.$$

Pisab veenduda, et  $U$  on tünn LKR-s  $X$ , sel juhul on ta  $\tau$ -nulliumbris ning kuna

$$A(U) \subset A(A^{-1}(V)) \subset V \text{ iga } A \in \mathfrak{A} \text{ korral,}$$

siis oleme tõestanud, et  $\mathfrak{A}$  on võrdpidev.

Ilmselt on hulk  $U$  absoluutselt kumer ning  $\tau$ -kinnine (põhjendada!) $\blacksquare$ . Kui  $x \in X$ , siis  $\{A(x) \mid A \in \mathfrak{A}\}$  on  $\tau'$ -tõkestatud, mistõttu leidub  $\lambda > 0$  omadusega

$$\forall A \in \mathfrak{A} : A(x) \in \lambda V,$$

s.t.  $x \in \lambda U$ . Niisiis on  $U$  ka neelav ning seega tünn. ■

**Teoreem 10.3 (piiroperaatori pidevusest).** Olgu  $A_n$  iga  $n \in \mathbb{N}$  korral pidev lineaarne kujutus tünniruumist  $(X, \tau)$  LKR-i  $(Z, \tau')$ . Kui iga  $x \in X$  korral eksisteerib ruumis  $Z$  piirväärtus  $A(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} A_n(x)$ , siis  $A \in L(X, Z)$ .

**Tõestus.** Kujutuse  $A: X \rightarrow Z$  lineaarsuses ei ole kahtlust. Kuna kujutuste jada  $(A_n)$  on punktiviisi koonduv, siis on ta ka punktiviisi tõkestatud ning teoreemi 10.2 järgi võrdpidev. Olgu  $V$  kinnine nulliumbrus LKR-s  $Z$ , võrdpidevuse tõttu leidub  $U \in \mathfrak{B}_X$ , et  $A_n(U) \subset V$  kõikide  $n \in \mathbb{N}$  puhul. Siis iga  $x \in U$  korral seostest  $A_n(x) \rightarrow A(x)$  ja  $A_n(x) \in V$  järeltub  $A(x) \in \overline{V} = V$ . Kokkuvõttes

$$\forall V \in \mathfrak{B}_Z \exists U \in \mathfrak{B}_X : A(U) \subset V,$$

s.t.  $A \in L(X, Z)$ . ■

## 10.2 F-ruumid. Lahtise kujutuse printsip

Teatavasti (vrd. lause 7.7) on eralduv LKR  $(X, \tau)$  metriseeruv parajasti siis, kui topoloogia  $\tau$  saab määrata loenduva või lõpliku poolnormide süsteemiga  $\{p_n\}$ , sel juhul on seosega

$$d(x, y) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{p_n(x - y)}{1 + p_n(x - y)} \quad (x, y \in X)$$

vektorruumis  $X$  defineeritud meetrika, mis määrab topoloogia  $\tau$ . Seetõttu võib nulliumbruste baasiks LKR-s võtta süsteemi  $\left\{ \frac{1}{n} B \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ , kus

$$B := \{x \in X \mid d(0, x) \leq 1\}. \quad (10.1)$$

**F-ruum. Definitsioon.** Täielikku metriseeruvat lokaalselt kumerat ruumi nimetatakse *F-ruumiks* ehk *Frechet' ruumiks*.

**F-ruumide omaduste uurimist alustame järgmiste lemmaga.**

**Lemma 10.4.** *Olgu  $X$  ja  $Z$  F-ruumid ning olgu  $A: X \rightarrow Z$  lineaarne surjektiivne kujutus. Iga tünni  $U \subset X$  korral leidub ruumis  $Z$  nulliumbrus  $V$  omadusega  $V \subset \overline{A(U)}$ .*

**Tõestus.** Kuna  $U$  on absoluutsest kumer neelav alamhulk ruumis  $X$ , siis (vrd. (9.1))

$$\text{span}U = \bigcup_{n=1}^{\infty} nU = X,$$

mistõttu

$$Z = A(X) = A\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} nU\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} nA(U) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} n\overline{A(U)} \subset Z,$$

s.t.

$$Z = \bigcup_{n=1}^{\infty} n\overline{A(U)}.$$

Kasutame meetriliste ruumide teoriast tundud **Baire'i teoreemi**: kuna täielik meetriline ruum  $Z$  on esitatud oma kinniste alamhulkade  $n\overline{A(U)}$  loenduva ühendina, siis mingi  $m \in \mathbb{N}$  puhul on hulgal  $m\overline{A(U)}$  sisepunkt. Siis on ka hulgal  $\overline{A(U)}$  olemas sisepunkt  $y_0$ . Valime absoluutsest kumera nulliumbruse  $V$  LKR-s  $Z$  omadusega  $y_0 + V \subset \overline{A(U)}$ . Pidades silmas

seoseid  $V = -V$  ja  $\overline{A(U)} = -\overline{A(U)}$ , saame, et  $-y_0 + V = -y_0 - V \subset -\overline{A(U)} = \overline{A(U)}$ , mistõttu iga  $y \in V$  korral

$$y = \frac{y+y_0}{2} + \frac{y-y_0}{2} \in \frac{1}{2}\overline{A(U)} + \frac{1}{2}\overline{A(U)} \subset \overline{A(U)}.$$

Niisiis,  $V \subset \overline{A(U)}$ . ■

Tõestatud lemmast tuleneb vahetult järgmine fakt.

**Lause 10.5.** *Iga  $F$ -ruum  $X$  on tünniruum.*

**Tõestus.** Võtame lemmas 10.4  $Z := X$  ja  $A := i: X \rightarrow X$  (ühikkujutus). Siis iga tünn  $U \subset X$  sisaldab nulliumbrust  $V$ , järelikult on ka  $U$  ise nulliumbrus. ■

Lemma 10.4 abil tõestame  $F$ -ruumide jaoks **lahtise kujutuse printsibi**, ühe funktsionaalanalüüsiga põhiprintsiipidest.

**Teoreem 10.6.** *Pidev lineaarne surjektiivne kujutus  $A$   $F$ -ruumist  $(X, \tau)$   $F$ -ruumi  $(Z, \tau')$  on lahtine, s.t. ta teisendab iga  $\tau$ -lahtise alamhulga  $G \subset X$   $\tau'$ -lahtiseks hulgaks  $A(G)$ .*

**Tõestus. I.** Näitame, et

$$\forall U \in \mathfrak{B}_X \exists V \in \mathfrak{B}_Z : V \subset A(U), \quad (10.2)$$

kus  $\mathfrak{B}_X$  ja  $\mathfrak{B}_Z$  on vastavalt ruumi  $X$  ja  $Z$  nulliumbruste baas absoluutelt kumeratest hulkahest, seejuures eeldame, et  $\mathfrak{B}_Z := \{V_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  on omadusega  $V_{n+1} \subset V_n$  (vrd. (4.1)).

Olgu  $U \in \mathfrak{B}_X$ . Leiame sellise tünni  $W$ , et  $W \subset B = \{x \in X \mid d(0, x) \leq 1\}$ . Kuna kinnised kerad  $\varepsilon B$ , kus  $\varepsilon > 0$  moodustavad  $\tau$ -nulliumbruste baasi (vrd. (10.1)), siis saab leida sellise  $\varepsilon > 0$ , et  $\varepsilon B \subset U$ . Tähistame  $\varepsilon_k := \frac{\varepsilon}{2^k}$  ning moodustame nulliumbrused  $B_k := \varepsilon_k W \subset \varepsilon_k B$  iga  $k \in \mathbb{N}$  puhul. Rakendame lemmat 10.4: kuna  $B_k$  on tünn (selgitada!)\(\blacksquare\), siis leidub  $n_k \in \mathbb{N}$  omadusega  $V_{n_k} \subset A(B_k)$ , seejuures valime  $n_k > n_{k-1}$ . Tähistame  $V := V_{n_1}$  ja näitame, et  $V \subset A(U)$ , s.t.

$$\forall y \in V \exists x \in U : y = A(x).$$

Olgu  $y \in V \subset \overline{A(B_1)}$ , siis

$$(y + V_{n_2}) \cap A(B_1) \neq \emptyset,$$

järelikult leidub  $y_1 \in A(B_1)$  omadusega

$$y - y_1 \in V_{n_2} \subset \overline{A(B_2)}.$$

Viimasesest seosest järeltuleb sellise elemendi  $y_2 \in A(B_2)$  olemasolu, mis rahuldab tingimust

$$y - y_1 - y_2 \in V_{n_3} \subset \overline{A(B_3)}$$

jne. Nii jätkates saame elementide jada  $(y_m)$  omadustega

$$y_m \in A(B_m), \quad y - \sum_{k=1}^m y_k \in V_{n_{m+1}} \quad (m \in \mathbb{N}).$$

Kuna  $V_{n_{m+1}} \subset V_{n_m}$ , siis  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m y_k = y$  (põhjendada!)  $\blacksquare$ , s.t.  $\sum_{k=1}^{\infty} y_k = y$ .

Fikseerime nüüd iga  $k \in \mathbb{N}$  korral  $x_k \in B_k$  nii, et  $y_k = A(x_k)$ , seejuures

$$\sum_k d(x_k, 0) \leq \sum_k \varepsilon_k = \varepsilon \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \varepsilon,$$

mildest tuleneb rea  $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$  koonduvus F-ruumis  $X$ . Tõepoolest,

$$d\left(\sum_{k=1}^m x_k - \sum_{k=1}^l x_k, 0\right) = d\left(\sum_{k=l+1}^m x_k, 0\right) \leq \sum_{k=l+1}^{\infty} d(x_k, 0) \rightarrow 0 \quad (m \geq l, l \rightarrow \infty),$$

niisiis on  $\left(\sum_{k=1}^m x_k\right)_{m \in \mathbb{N}}$  Cauchy jada F-ruumis  $X$  ja seega koonduv, olgu  $x := \sum_{k=1}^{\infty} x_k \in X$ . Paneme tähele, et

$$d(x, 0) = d\left(\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m x_k, 0\right) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m d(x_k, 0) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon_k = \varepsilon,$$

seega  $x \in \varepsilon B \subset U$ . Seejuures

$$A(x) = A\left(\sum_{k=1}^{\infty} x_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} A(x_k) = y.$$

**II.** Veendume, et  $A$  on lahtine kujutus. Olgu  $G \subset X$   $\tau$ -lahtine alamhulk ja  $y$  suvaline element kujutishulgas  $A(G)$ . Võtame  $x \in G$ , mille korral  $A(x) = y$ . Kuna  $x$  on hulga  $G$  sisepunkt, siis saab leida nulliumbruse  $U \in \mathfrak{B}_X$  omadusega  $x + U \subset G$ , järelikult

$$A(G) \supset A(x + U) = A(x) + A(U) = y + A(U).$$

Rakendame tõestuse esimeses osas tõestatud väidet (10.2) ning leiame  $V \in \mathfrak{B}_Z$  omadusega  $V \subset A(U)$ , sel juhul  $y + V \subset y + A(U) \subset A(G)$ . Tähendab,  $y$  on hulga  $A(G)$  sisepunkt, mis ütleb, et  $A(G)$  on lahtine hulk.

Teoreem on tõestatud. ■

### 10.3 Teoreem kinnisest graafikust

Lahtise kujutuse printsibi abil on lihtne tõestada järgmist teoreemi.

**Teoreem 10.7 (teoreem pöördkujutuse pidevusest).** Olgu  $X$  ja  $Z$  F-ruumid. Kui kujutus  $A \in L(X, Z)$  on pööratav, siis  $A^{-1} \in L(Z, X)$ .

**Tõestus.** Teatavasti on pööratava lineaarse kujutuse pöördkujutus lineaarne, seega on meil vaja kontrollida vaid kujutuse  $A^{-1}: Z \rightarrow X$  pidevust. Olgu  $G \subset X$  lahtine hulk. Kuna  $A: X \rightarrow Z$  on pidev sürjektiivne kujutus, siis saame rakendada lahtise kujutuse printsipi, mille kohaselt  $(A^{-1})^{-1}(G) = A(G)$  on lahtine hulk ruumis  $Z$ . Tähendab, kujutuse  $A^{-1}$  suhtes on lahtiste hulkade originaalid lahtised, mis tähendabki selle kujutuse pidevust. ■

Meenutame, et vektorruumide  $X$  ja  $Z$  otsekorrutis

$$X \times Z := \{(x, y) \mid x \in X, y \in Z\}$$

on vektorruum koordinaaditi defineeritud tehetega:

$$(x, y) + (x', y') := (x + x', y + y'), \quad \lambda(x, y) := (\lambda x, \lambda y) \quad (\lambda \in \mathbb{K}).$$

Olgu järgnevas  $(X, \tau)$  ja  $(Z, \tau')$   $F$ -ruumid, mille topoloogia  $\tau$  ja  $\tau'$  on määratud vastavalt poolnormide süsteemiga  $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  ja  $\{q_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ . Defineerime funktsionaalid

$$r_{nm}: X \times Z \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto p_n(x) + q_m(y) \quad (n, m \in \mathbb{N}),$$

vahetu kontroll näitab, et need on poolnormid, kusjuures

$$r_{nm}((x, y)) = 0 \quad (n, m \in \mathbb{N}) \Leftrightarrow (x, y) = 0_{X \times Z}$$

(kontrollida!) $\blacksquare$ . Seega määrab poolnormide süsteem  $\{r_{nm}\}_{n,m \in \mathbb{N}}$  vektorruumis  $X \times Z$  **metri-seeruva** lokaalselt kumera topoloogia. Paneme tähele, et (vrd. lause 7.5(a))

$$\begin{aligned} (x_k, y_k) \rightarrow (x, y) \quad (k \rightarrow \infty) &\Leftrightarrow (x_k - x, y_k - y) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty) \\ &\Leftrightarrow r_{nm}((x_k - x, y_k - y)) \rightarrow 0 \quad (n, m \in \mathbb{N}, k \rightarrow \infty) \\ &\Leftrightarrow p_n(x_k - x) \rightarrow 0, \quad q_m(y_k - y) \rightarrow 0 \quad (n, m \in \mathbb{N}, k \rightarrow \infty) \\ &\Leftrightarrow x_k \rightarrow x \quad (\tau), \quad y_k \rightarrow y \quad (\tau') \quad (k \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

Niisiis tähendab koonduvus LKR-s  $X \times Z$  koonduvust koordinaatide järgi. Täpselt samuti veendutakse, et  $((x_k, y_k))$  on Cauchy jada ruumis  $X \times Z$  parajasti siis, kui  $(x_k)$  ja  $(y_k)$  on Cauchy jada vastavalt ruumis  $X$  ja  $Z$ . Kuna mõlemad need ruumid on täielikud, siis leiduvad  $x \in X$  ja  $y \in Z$ , et  $x_k \rightarrow x$  ( $\tau$ ) ning  $y_k \rightarrow y$  ( $\tau'$ ), järelikult  $(x_k, y_k) \rightarrow (x, y)$  ruumis  $X \times Z$ . Me töestasime, et  $X \times Z$  on täielik.

Kokkuvõttes võime öelda, et  $F$ -ruumide  $X$  ja  $Z$  otsekorrutis  $X \times Z$  on  $F$ -ruum.

Vaatleme projektsioone

$$T_X: X \times Z \rightarrow X, \quad (x, y) \mapsto x \text{ ja } T_Z: X \times Z \rightarrow Z, \quad (x, y) \mapsto y.$$

Selge, et  $T_X$  ja  $T_Z$  on lineaarsed kujutused, ilmselt on nad ka pidevad (kontrollida!) $\blacksquare$ , niisiis,  $T_X \in L(X \times Z, X)$ ,  $T_Z \in L(X \times Z, Z)$ .

**Kujutuse graafik.** Olgu  $A: X \rightarrow Z$  lineaarne kujutus. Korrutisruumi  $X \times Z$  alamhulka

$$\text{gr}A := \{(x, A(x)) \mid x \in X\}$$

nimetatakse kujutuse  $A$  *graafikuks*. Lihtne on veenduda (kontrollida!) $\blacksquare$ , et lineaarse kujutuse graafik on vektoralamruum vektorruumis  $X \times Z$ .

**Definitsioon.** Kui  $\text{gr } A = \overline{\text{gr } A}$   $F$ -ruumis  $X \times Z$ , siis öeldakse, et  $A$  on *kinnine kujutus*.

**Ülesanne 10.2.** Veenduda, et iga pidev lineaarne kujutus on kinnine.

**Teoreem 10.8 (teoreem kinnisest graafikust).** Lineaarne kinnine kujutus  $A$   $F$ -ruumist  $X$   $F$ -ruumi  $Z$  on pidev.

**Tõestus.** Kuna  $\text{gr}A$  on  $F$ -ruumi  $X \times Z$  kinnine alamruum, siis on ta samuti  $F$ -ruum. Vaatleme projektsioonide  $T_X$  ja  $T_Z$  ahendeid  $\widehat{T}_X := T_X|_{\text{gr}A}$  ja  $\widehat{T}_Z := T_Z|_{\text{gr}A}$  ning paneme tähele, et  $\widehat{T}_X$  on pööratav kujutus: iga  $x \in X$  korral on originaal  $(x, A(x))$  üheselt määratud. Seejuures on pöördkujutus  $(\widehat{T}_X)^{-1} : X \rightarrow X \times Z$  teoreemi 10.7 põhjal pidev ja lineaarne ning

$$A(x) = \widehat{T}_Z((x, A(x))) = \widehat{T}_Z\left(\left(\widehat{T}_X\right)^{-1}(x)\right) = \widehat{T}_Z \circ \left(\widehat{T}_X\right)^{-1}(x) \quad (x \in X),$$

s.t.  $A = \widehat{T}_Z \circ \left(\widehat{T}_X\right)^{-1}$ . Kuna mõlemad komponendid  $\widehat{T}_Z$  ja  $\left(\widehat{T}_X\right)^{-1}$  on pidevad, siis on ka  $\widehat{T}_Z \circ \left(\widehat{T}_X\right)^{-1}$  pidev. Tähendab,  $A \in L(X, Z)$ . Teoreem on tõestatud. ■

Lineaarse kujutuse  $A : X \rightarrow Z$ , kus  $(X, \tau)$  ja  $(Z, \tau')$  on LKR-d, graafik on kinnine para-jasti siis, kui kehtib järgmine implikatsioon (kontrollida!)☒:

$$[x_\gamma \rightarrow x \ (\tau) \text{ ja } A(x_\gamma) \rightarrow y \ (\tau')] \Rightarrow y = A(x).$$

Niisiis võib öelda, et graafiku kinnitus ei garanteeri koonduva pere kujutiste pere koonduvust, kuid ta välistab võimaluse, et see koonduks "valeks" piirvääruseks. Seega on graafiku kinnitus lineaarse kujutuse puhul oluliselt nõrgem tingimus kui selle kujutuse pidevus. Krestomaatiline näide kinnise graafikuga tõkestamata (s.o. mittepidevast) lineaarsest kujutusest normeeritud ruumide korral on diferentseerimisoperaator

$$D : X \rightarrow C[a, b], \quad x \mapsto x',$$

kus  $X$  on kõigi lõigus  $[a, b]$  pidevalt diferentseeruvate funktsioonide  $x = x(t)$  alamruum Banachi ruumis  $C[a, b]$ .

## 11 Projektiivsed piirid

Käesolevas ja järgnevas kahes peatükis käsiteleme me meetodeid, mis võimaldavad antud lokaalselt kumerate ruumide baasil konstrueerida uusi. Põhimõtteliselt jagunevad need meetodid kahte (teatas mõttes duaalsesse) klassi. Vastavalt neile nimetatakse konstrueeritud topoloogiat *induktiiivseks* või *projektiivseks*.

### 11.1 Projektiivse piiri topoloogia

**LKR-de projektiivne piir.** Me *eeldame selles artiklis*, et  $X$  on vektorruum ja  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  on LKR-d (üle ühe ja sama korpuuse  $\mathbb{K}$ ) ning  $v_\gamma: X \rightarrow X_\gamma$  on lineaarsed kujutused iga  $\gamma \in \Gamma$  korral.

**Definitsioon.** Nõrgimat lokaalselt kumerat topoloogiat  $\tau_{\text{proj}}$  vektorruumis  $X$ , mille suhtes kõik kujutused  $v_\gamma$  on pidevad, nimetatakse (LKR-de  $X_\gamma$  ja kujutustega  $v_\gamma$  määratud) *projektiivse piiri topoloogiaks*. LKR-i  $(X, \tau_{\text{proj}})$  nimetame sel juhul LKR-de  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  *projektiivseks piiriks* (kujutuste  $v_\gamma$  suhtes).

Veendume, et *selline topoloogia on olemas ja üheselt määratud*. Olgu iga fikseeritud  $\gamma \in \Gamma$  korral  $\mathfrak{B}_\gamma$  absoluutsest kumeratest nulliumbrustest koosnev baas LKR-s  $X_\gamma$ . Üldisust kitsendamata eeldame, et

- 1) kui  $U_1, U_2 \in \mathfrak{B}_\gamma$ , siis  $U_1 \cap U_2 \in \mathfrak{B}_\gamma$ , ja
- 2) kui  $U \in \mathfrak{B}_\gamma$  ja  $\lambda > 0$ , siis  $\lambda U \in \mathfrak{B}_\gamma$ ,

niisiis sisaldab  $\mathfrak{B}_\gamma$  oma elementide lõplike ühisade kordsed. Vaatleme vektorruumis  $X$  alamhulki

$$V := \bigcap_{\gamma \in H} v_\gamma^{-1}(U_\gamma), \quad (11.1)$$

kus  $U_\gamma \in \mathfrak{B}_\gamma$  ning  $H \neq \emptyset$  on hulga  $\Gamma$  suvaline *lõplik* alamhulk. Vahetu kontroll näitab, et hulgad (11.1) on absoluutsest kumerad ja neelavad (veenduda!)☒ ning moodustavad seetõttu nulliumbruste prebaasi  $\mathfrak{B}$  mingi lokaalselt kumera topoloogia  $\tau$  jaoks vektorruumis  $X$ . Kuna aga süsteem  $\mathfrak{B}$  sisaldab kõigi oma elementide lõplikud ühisad ja kordsed (selgitada!)☒, siis on ta topoloogia  $\tau$  nulliumbruste baas (vrd. art. 7.1). Kujutus  $v_\gamma: (X, \tau) \rightarrow (X_\gamma, \tau_\gamma)$  on pidev iga  $\gamma \in \Gamma$  korral, sest hulk  $v_\gamma^{-1}(U_\gamma)$  on iga  $U_\gamma \in \mathfrak{B}_\gamma$  puhul  $\tau$ -nulliumbrus. Kui  $\tau_1$  on suvaline selline lokaalselt kumer topoloogia vektorruumis  $X$ , mille suhtes kujutused  $v_\gamma$  on pidevad, siis peavad kõik hulgad  $v_\gamma^{-1}(U_\gamma)$ , aga siis ka iga hulk  $V \in \mathfrak{B}$  olema  $\tau_1$ -nulliumbrused. See tähendab, et  $\tau \subset \tau_1$ , järelikult  $\tau = \tau_{\text{proj}}$ .

Eelneva arutelu kohaselt on  $\tau_{\text{proj}}$  nõrgim lokaalselt kumer topoloogia vektorruumis  $X$ , mille suhtes kõik hulgad  $v_\gamma^{-1}(U_\gamma)$ , kus  $U_\gamma \in \mathfrak{B}_\gamma$  ja  $\gamma \in \Gamma$ , on nulliumbrused.

Lepime kokku, et projektiivse piiri topoloogia omaduste järgneval uurimisel kasutame (seda spetsiaalselt märkimata) eelnevas arutluses sissetoodud tähistusi.

Vastuse küsimusele **projektiivse piiri eralduvusest** annab järgmine lause.

**Lause 11.1.** *Eralduvate LKR-de  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$ , kus  $\gamma \in \Gamma$ , projektiivne piir  $(X, \tau_{\text{proj}})$  on eralduv LKR parajasti siis, kui kujutused  $v_\gamma$  rahuldavad tingimust*

$$\bigcap_{\gamma \in \Gamma} v_\gamma^{-1}(\{0\}) = \{0\}.$$

**Tõestus.** Kuna  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  on eralduv LKR, siis lause 2.7 põhjal  $\bigcap_{U \in \mathfrak{B}_\gamma} U = \{0\}$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral. Seetõttu

$$\bigcap_{V \in \mathfrak{B}} V = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} \bigcap_{U \in \mathfrak{B}_\gamma} v_\gamma^{-1}(U) = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} v_\gamma^{-1} \left( \bigcap_{U \in \mathfrak{B}_\gamma} U \right) = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} v_\gamma^{-1}(\{0\}).$$

ning väide järeltub vahetult lausest 2.7. ■

Järgnevalt kirjeldame projektiivsel piiril määratud **lineaarse kujutuste pidevust**.

**Lause 11.2.** Olgu  $Z$  mingi LKR ja  $(X, \tau_{\text{proj}})$  LKR-de  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$ , kus  $\gamma \in \Gamma$ , projektiiivne piir. Lineaarne kujutus  $A: Z \rightarrow X$  on pidev parajasti siis, kui kujutused  $v_\gamma \circ A: Z \rightarrow X_\gamma$  on pidevad.

**Tõestus.** Kui  $A$  on pidev, siis ka kujutused  $v_\gamma \circ A$  on pidevad kui pidevate kujutuste kompositsioonid. Vastupidi, kui kujutused  $v_\gamma \circ A: Z \rightarrow X_\gamma$  on iga  $\gamma \in \Gamma$  korral pidevad, siis hulk  $(v_\gamma \circ A)^{-1}(U_\gamma)$  on iga  $U_\gamma \in \mathfrak{B}_\gamma$  ja  $\gamma \in \Gamma$  korral nulliumbrus ruumis  $Z$ . Tähendab, iga  $V \in \mathfrak{B}$  korral, mis on esitatud kujul (11.1), on hulk

$$A^{-1}(V) = A^{-1} \left( \bigcap_{\gamma \in H} v_\gamma^{-1}(U_\gamma) \right) = \bigcap_{\gamma \in H} (v_\gamma \circ A)^{-1}(U_\gamma)$$

ruumi  $Z$  nulliumbrus (peame silmas, et  $H$  on lõplik hulk). Seega on  $A$  pidev kujutus. ■

**Lause 11.3.** Alamhulk  $E \subset X$  on  $\tau_{\text{proj}}$ -tõkestatud parajasti siis, kui hulk  $v_\gamma(E)$  on tõkestatud LKR-s  $X_\gamma$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral.

**Tõestus.** Iseseisvalt! ♦ ■

Kõige olulisemat projektiiivse piiri topoloogia erijuhtu – korrutistopolooogiat – käsitleme üksikasjalikumalt järgmises artiklis. Siinkohal vaatleme viit lihtsamat juhtu, millega kaks viimast on põhimõttelise tähendusega.

**Näide 11.1.** Olgu  $X_0$  LKR-i  $(X, \tau)$  vektoralamruum. Alamruumi topoloogia  $\tau_0$  on projektiiivse piiri topoloogia, kus seda tekitav LKR-de süsteem  $\{X_\gamma\}$  koosneb ühest elemendist, nimelt LKR-st  $X$ , ja vastavaks lineaarseks kujutuseks on sisestus  $i: X_0 \rightarrow X$ ,  $x \mapsto x$ . Sel juhul koosneb projektiiivse piiri nulliumbruste baas hulkadest

$$V := i^{-1}(U) = U \cap X_0 \quad (U \in \mathfrak{B}_X)$$

(siin  $\mathfrak{B}_X$  on ruumi  $X$  nulliumbruste baas), mis tõepoolest moodustavad alamruumi topoloogia  $\tau_0$  nulliumbruste baasi.

**Näide 11.2.** Olgu  $\langle X, Y \rangle$  duaalne paar. Nõrk topoloogia  $\sigma(X, Y)$  vektoruumis  $X$  on LKR-dega  $X_f := \mathbb{K}$  ja kujutustega  $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ , kus  $f \in Y$ , määratud projektiiivse piiri

topoloogia. Ühelt poolt  $(X, \sigma(X, Y))' = Y$ , seega iga  $f \in Y$  on  $\sigma(X, Y)$ -pidev, teisalt on  $\sigma(X, Y)$  vektorruumi  $X$  nõrgim lokaalselt kumer topoloogia omadusega  $(X, \sigma(X, Y))' = Y$ .

**Näide 11.3.** Olgu iga  $\gamma \in \Gamma$  korral vektorruumis  $X$  määratud lokaalselt kumer topoloogia  $\tau_\gamma$ . Defineerime selles ruumis projektiivse piiri topoloogia  $\tau_{\text{proj}}$  LKR-de  $(X, \tau_\gamma)$  ja lineaarsete kujutuste  $v_\gamma := i$  suhtes, kus  $i: X \rightarrow X$  on ühikkujutus. Lihtne on näha, et  $\mathfrak{B} := \bigcup_{\gamma \in \Gamma} \mathfrak{B}_\gamma$  on topoloogia  $\tau_{\text{proj}}$  nulliumbruste prebaas, kus  $\mathfrak{B}_\gamma$  on  $\tau_\gamma$ -nulliumbruste baas ruumis  $X$  (veenduda!) $\blacksquare$ .

**Näide 11.4.** Olgu LKR-i  $X$  topoloogia  $\tau$  määratud poolnormide süsteemiga  $\{p_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma}$ . Siis hulgad

$$V := \varepsilon \bigcap_{i=1}^n V_{\gamma_i} \quad (\varepsilon > 0, \quad \gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma, \quad n \in \mathbb{N}),$$

kus  $V_\gamma := \{x \in X \mid p_\gamma(x) \leq 1\}$ , moodustavad  $\tau$ -nulliumbruste baasi  $\mathfrak{B}$ . Paneme tähele, et  $\tau$  on nõrgim lokaalselt kumer topoloogia vektorruumis  $X$ , mille suhtes kõik poolnormid  $p_\gamma$  on pidevad. Tõepoolest, kui  $\tau_1$  on mingi niisugune topoloogia, siis  $V_\gamma$  on  $\tau_1$ -nulliumbrus iga  $\gamma \in \Gamma$  korral, mistõttu ka iga  $V \in \mathfrak{B}$  on  $\tau_1$ -nulliumbrus. Tähendab,  $\tau \subset \tau_1$ .

Edasi, iga fikseeritud  $\gamma \in \Gamma$  korral määrab poolnorm  $p_\gamma$  vektorruumis  $X$  lokaalselt kumera topoloogia  $\tau_\gamma$ . Seejuures poolnormi  $p_\gamma$  pidevus mingi lokaalselt kumera topoloogia  $\tau'$  suhtes on samavärne ühikkujutuse  $i: (X, \tau') \rightarrow (X, \tau_\gamma)$  pidevusega (kontrollida!) $\blacksquare$ . Seetõttu on lähetetopoloogia  $\tau$  LKR-de  $(X, \tau_\gamma)$  projektiivse piiri topoloogia ühikkujutuse  $i$  suhtes. Niisiis, *iga LKR on esitatav poolnormeeritud ruumide projektiivse piirina*.

**Näide 11.5.** Olgu  $(X, \tau)$  eralduv LKR, topoloogia  $\tau$  on määratud kõigi  $\tau$ -pidevate poolnormide süsteemiga  $\mathcal{P}$ . Moodustame iga  $p \in \mathcal{P}$  korral faktorruumi  $X_p := X/p^{-1}(\{0\})$ , selle elementideks on ekvivalentsusseose  $x \sim y \Leftrightarrow p(x - y) = 0$  järgi moodustatud ekvivalentsiklassid  $\mathbf{x} = x + p^{-1}(\{0\})$ . Lihtne on näha, et kui  $x \sim y$ , siis  $p(x) = p(y)$  (kontrollida!) $\blacksquare$ . Defineerime igas vektorruumis  $X_p$  normi

$$\|\mathbf{x}\|_p := \inf_{z \in \mathbf{x}} p(z) = p(x) \quad (\mathbf{x} \in X_p)$$

ja ruumis  $X$  kanoonilised kujutused

$$k_p : X \rightarrow X_p, \quad x \mapsto \mathbf{x} = x + p^{-1}(\{0\}) \quad (p \in \mathcal{P}),$$

siis  $\|k_p(x)\|_p = p(x)$  iga  $x \in X$  korral, seejuures  $\bigcap_{p \in \mathcal{P}} k_p^{-1}(\{0\}) = \{0\} = p^{-1}(\{0\})$ .

Meie eesmärk on näidata, et topoloogia  $\tau$  langeb kokku normeeritud ruumide  $X_p$  ja kanooniliste kujutuste  $k_p$  suhtes moodustatud projektiivse topoloogiaga  $\tau_{\text{proj}}$ . Selleks paneme tähele, et

1)  $\tau$  on nõrgim lokaalselt kumer topoloogia vektorruumis  $X$ , mille suhtes kõik poolnormid  $p \in \mathcal{P}$  on pidevad (vrd. näide 11.4), ja

2) kujutus

$$k_p : (X, \tau') \rightarrow \left( X_p, \|\cdot\|_p \right) \tag{11.2}$$

on pidev lokaalselt kumera topoloogia  $\tau'$  korral parajasti siis, kui poolnorm  $p$  on  $\tau'$ -pidev (kontrollida!) $\blacksquare$ .

Niisiis, *iga eralduv lokaalselt kumer ruum on esitatav normeeritud ruumide projektiivse piirina*.

## 11.2 Lokaalselt kumerate ruumide otsekorrutis

Olgu  $\Gamma$  mingi indeksite hulk ja olgu  $X_\gamma$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral vektorruum üle ühe ja sama skalaride korpu  $\mathbb{K}$ . Moodustame **otsekorrutise**

$$X := \prod_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma := \{x = (x_\gamma) \mid \forall \gamma \in \Gamma : x_\gamma \in X_\gamma\}.$$

Defintsiooni järgi on otsekorrutise elementideks (mitte tingimata suunatud) pered  $x = (x_\gamma)$ , mille elemente  $x_\gamma$  me tavaliste vektorite ja jadade eeskujul nimetame *koordinaatideks*. Kujutusi

$$\pi_\gamma : \prod_{\nu \in \Gamma} X_\nu \rightarrow X_\gamma, \quad (x_\nu) \mapsto x_\gamma \quad (\gamma \in \Gamma)$$

nimetatakse *projektsioonideks*. Hulk  $\prod_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma$  on vektorruum, kui defineerida

$$(x_\gamma) + (y_\gamma) := (x_\gamma + y_\gamma), \text{ ja } \lambda(x_\gamma) := (\lambda x_\gamma) \quad (\lambda \in \mathbb{K}),$$

seejuures on projektsioonid  $\pi_\gamma$  lineaarsed (kontrollida!)\(\blacksquare\). Kuna vektorruumi  $\prod_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma$  nullelementiks on pere, mille  $\gamma$ -s koordinaat on ruumi  $X_\gamma$  nullelement, siis kehtib seos

$$\bigcap_{\gamma \in \Gamma} \pi_\gamma^{-1}(0_{X_\gamma}) = \{0_X\}. \quad (11.3)$$

Defineerime iga  $\gamma \in \Gamma$  puhul kujutused

$$j_\gamma : X_\gamma \rightarrow X, \quad x_\gamma \mapsto (z_\nu)_{\nu \in \Gamma}, \text{ kus } z_\nu = x_\gamma, \text{ kui } \nu = \gamma, \text{ ja } z_\nu = 0, \text{ kui } \nu \neq \gamma,$$

ning kontrollime nende järgmisi omadusi.

**Ülesanne 11.1.** Näidata, et kujutus  $j_\gamma$  on lineaarne ja üks-ühene.

**Ülesanne 11.2.** Veenduda, et  $\pi_\gamma \circ j_\gamma = i_{X_\gamma}$  (ühikkujutus) ja  $\pi_\nu \circ j_\gamma = 0$ , kui  $\nu \neq \gamma$ .

**Ülesanne 11.3.** Veenduda, et  $\pi_\gamma|_{j_\gamma(X_\gamma)} = j_\gamma^{-1}$ .

**Korrutistopoloogia.** Eeldame järgnevas, et  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  on LKR-d ja defineerime otsekorrutises  $X$  projektivse piiri topoloogia projektsioonide  $\pi_\gamma : X \rightarrow X_\gamma$  suhtes. Seda topoloogiat nimetatakse *korrutistopoloogiaks*, tähistame teda tähega  $\tau_\Pi$ . Olgu  $\mathfrak{B}_\gamma$  LKR-i  $X_\gamma$  nulliumbruste baas, eeldame, et ta sisaldb kõik oma elementide positiivsed kordsed ja lõplikud ühisosad. Siis

$$\mathfrak{B} := \left\{ \bigcap_{\gamma \in H} \pi_\gamma^{-1}(U_\gamma) \mid U_\gamma \in \mathfrak{B}_\gamma, H \subset \Gamma \text{ on lõplik alamhulk} \right\}$$

on  $\tau_\Pi$ -nulliumbruste baas (kontrollida!)\(\blacksquare\).

Korrutistopoloogia olemuse paremaks mõistmiseks on kasulik järgmine fakt, mis tuleneb vahetult projektsioonide  $\pi_\gamma$  pidevusest.

**Lause 11.4.** *Otsekorrutise  $X$  elementide suunatud pere  $(x^\alpha)_{\alpha \in A}$  koondub elemendiks  $x$  korrutistopoloorias  $\tau_\Pi$  parajasti siis, kui  $\lim_{\alpha \in A} \pi_\gamma(x^\alpha) = \pi_\gamma(x)$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral.*

**Tõestus.** Iseseisvalt!\(\blacksquare\)

**Lause 11.5.** *Suunatud pere  $(x^\alpha)_{\alpha \in A}$  on Cauchy pere otsekorrutises  $(X, \tau_\Pi)$  parajasti siis, kui  $(\pi_\gamma(x^\alpha))_{\alpha \in A}$  on Cauchy pere ruumis  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral.*

**Tõestus.** Iseseisvalt!  $\blacksquare$

**Otsekorrutise üldiste omaduste** uurimist alustame järgmise kahe väitega, mis tulenevad vahetult lausetest 11.2 ja 11.3.

**Lause 11.6.** *Olgu  $Z$  LKR. Lineaarne kujutus  $A: Z \rightarrow (X, \tau_\Pi)$  on pidev parajasti siis, kui kujutus  $\pi_\gamma \circ A: Z \rightarrow X_\gamma$  on pidev iga  $\gamma \in \Gamma$  korral.*

**Tõestus.** Isesisvalt (vrd. lause 11.2)  $\blacksquare$

**Lause 11.7.** *Alamhulk  $E \subset X$  on  $\tau_\Pi$ -tõkestatud parajasti siis, kui tema projektsioon  $\pi_\gamma(E)$  on tõkestatud LKR-s  $X_\gamma$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral.*

**Tõestus.** Isesisvalt (vrd. lause 11.3)  $\blacksquare$

**Lause 11.8.** *LKR  $(X, \tau_\Pi)$  on eralduv parajasti siis, kui kõik LKR-d  $X_\gamma$  on eralduvad.*

**Tõestus.** *Tarvilikkus.* Kui oletada, et LKR  $X_{\gamma_0}$  ei ole eralduv mingi  $\gamma_0 \in \Gamma$  korral, siis leidub  $a \in X_{\gamma_0} \setminus \{0\}$ , mis kuulub ühisossa  $\bigcap_{U \in \mathfrak{B}_{\gamma_0}} U$ . Kuid sel juhul kuulub element  $j_{\gamma_0}(a)$ , mis on nullist erinev vektoruumis  $X$ , kõikidesse nulliumbrustesse  $V \in \mathfrak{B}$  ruumis  $X$  (põhjendada!)  $\blacksquare$ . Tähendab,  $(X, \tau_\Pi)$  ei ole eralduv.

*Piisavus* tuleneb vahetult lausest 11.1 (vrd. seos (11.3)).  $\blacksquare$

**Lause 11.9.** *Otsekorrutise  $(X, \tau_\Pi)$  kinnine alamhulk  $E$  on täielik parajasti siis, kui tema projektsioon  $\pi_\gamma(E)$  on täielik LKR-s  $X_\gamma$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral.*

**Tõestus.** *Tarvilikkus.* Eeldame, et  $E \subset X$  on  $\tau_\Pi$ -täielik, olgu  $(a^\alpha)_{\alpha \in A}$ , kus  $a^\alpha \in \pi_{\gamma_0}(E)$  iga  $\alpha \in A$  korral, Cauchy pere LKR-s  $X_{\gamma_0}$ . Vaatleme peret  $(j_{\gamma_0}(a^\alpha))_{\alpha \in A}$  ruumis  $X$ . Kuna  $\pi_{\gamma_0}(j_{\gamma_0}(a^\alpha)) = a^\alpha$  ja  $\pi_\gamma(j_{\gamma_0}(a^\alpha)) = 0$ , kui  $\gamma \neq \gamma_0$ , siis  $(j_{\gamma_0}(a^\alpha))$  on Cauchy pere hulgas  $E$  (vrd. lause 11.5). Seega  $(j_{\gamma_0}(a^\alpha))$  koondub ruumis  $X$  mingiks punktiks  $z \in E$ , tänu projektsiooni  $\pi_{\gamma_0}$  pidevusele  $a^\alpha \rightarrow \pi_{\gamma_0}(z) \in \pi_{\gamma_0}(E)$ . Tähendab,  $\pi_{\gamma_0}(E)$  on täielik hulk.

*Piisavus.* Olgu  $E$  selline kinnine alamhulk ruumis  $(X, \tau_\Pi)$ , et tema projektsioon  $\pi_\gamma(E)$  on täielik hulk ruumis  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral. Suvalise Cauchy pere  $(z^\alpha)_{\alpha \in A}$  puhul hulgas  $E$  on  $(\pi_\gamma(z^\alpha))_{\alpha \in A}$  Cauchy pere hulgas  $\pi_\gamma(E)$ . Seega leiduvad punktid  $z_\gamma \in \pi_\gamma(E)$ , et  $\pi_\gamma(z^\alpha) \rightarrow z_\gamma$  ruumis  $X_\gamma$ , seejuures  $z^\alpha \rightarrow z = (z_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}(\tau_\Pi)$ . Kuna  $E$  on kinnine hulk, siis  $z \in E$ .

Lause on tõestatud.  $\blacksquare$

**Järeldus 11.10.** *Täielike lokaalselt kumerate ruumide otsekorrutis on täielik lokaalselt kumer ruum.*

**Lause 11.11.** *LKR-de  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$ , kus  $\gamma \in \Gamma$ , projektiivne piir  $(X_0, \tau_{\text{proj}})$  lineaarsete kujutuste  $v_\gamma: X_0 \rightarrow X_\gamma$  suhtes, mis rahuldavad tingimust*

$$\bigcap_{\gamma \in \Gamma} v_\gamma^{-1}(\{0\}) = \{0\},$$

*on topoloogiliselt ja algebralisel isomorfne nende ruumide otsekorrutise  $(X, \tau_\Pi)$  mingi alamruumiga.*

**Tõestus.** Defineerime lineaarse kujutuse

$$T: X_0 \rightarrow \prod_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma, \quad x \mapsto (v_\gamma(x)),$$

siis  $v_\gamma = \pi_\gamma \circ T$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral. Kuna kujutused  $v_\gamma$  on pidevad, siis  $T \in L(X_0, X)$  (vrd. lause 11.2). Seejuures  $T^{-1}(\{0\}) = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} v_\gamma^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ , s.t.  $T : X_0 \rightarrow T(X_0)$  on üks-ühene kujutus. Saame seose  $v_\gamma \circ T^{-1} = \pi_\gamma$ , millest järeltub, et  $T^{-1} \in L(T(X_0), X_0)$  (vrd. lause 11.2). Kokkuvõttes oleme näidanud, et projektiivne piir  $X_0$  ning otsekorrutise  $X$  alamruum  $T(X_0)$  on algebraliselt ja topoloogiliselt isomorfsed. ■

Pidades silmas näidet 11.5, saame lausest 11.11 järgmisse järeltulevuse.

**Järeltulevus 11.12.** *Iga eralduv lokaalselt kumer ruum on topoloogiliselt ja algebraliselt isomorfne normeeritud ruumide otsekorrutise alamruumiga.*

Selle artikli lõpuks märgime veel eelpool defineeritud kujutuste  $j_\gamma$  olulist rolli lokaalselt kumerate ruumide otsekorrutise puhul.

**Lause 11.13.** *Olu  $X$  LKR-de  $X_\gamma$ , kus  $\gamma \in \Gamma$ , otsekorrutis, mis on varustatud korrutistopoloogiaga  $\tau_\Pi$ . Siis kujutus  $j_\gamma$  korraldab iga  $\gamma \in \Gamma$  puhul LKR-i  $X_\gamma$  ja LKR-i  $(X, \tau_\Pi)$  alamruumi  $j_\gamma(X_\gamma)$  vahel topoloogilise ja algebralise isomorfismi. Kui kõik LKR-d  $X_\gamma$  on eralduvad, siis  $j_\gamma(X_\gamma)$  on kinnine alamruum ruumis  $(X, \tau_\Pi)$ .*

**Tõestus.** Ülesande 11.2 kohaselt  $\pi_v \circ j_\gamma \in L(X_\gamma, X_v)$ , lause 11.2 põhjal  $j_\gamma \in L(X_\gamma, X)$ . Ülesandest 11.3 saame, et  $j_\gamma^{-1} \in L(j_\gamma(X_\gamma), X_\gamma)$ . Seega on  $j_\gamma$  topoloogiline ja algebraline isomorfism. Lõpuks, kui LKR-d  $X_\gamma$  on eralduvad, siis  $\pi_v^{-1}(\{0\})$  on kinnine hulk ruumis  $X$  (põhjendada!)\(\blacksquare\), mistõttu ka hulk  $j_\gamma(X_\gamma) = \bigcap_{v \in \Gamma, v \neq \gamma} \pi_v^{-1}(\{0\})$  on kinnine. ■

Lause 11.13 lubab meil samastada LKR-dena  $X_\gamma$  ja  $j_\gamma(X_\gamma)$ . Seega võime edaspidi vaadelda LKR-e  $X_\gamma$  otsekorrutise  $(X, \tau_\Pi)$  alamruumidena, millel on parajasti üks ühine punkt 0. Kui ruumid  $X_\gamma$  on eralduvad, siis on nad kinnised alamruumid ruumis  $X$ . Märgime veel, et kui  $\Delta \subset \Gamma$ , siis  $\prod_{\gamma \in \Delta} X_\gamma$  on ruumi  $(X, \tau_\Pi)$  alamruum, seejuures kinnine, kui kõik ruumid  $X_\gamma$  on eralduvad.

## 12 Induktiivsed piirid. Bornoloogilised ruumid

### 12.1 Induktiivse piiri topoloogia

**LKR-de induktiivne piir.** Me *eeldame* selles peatükis, et  $X$  on vektorruum ja  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  on iga  $\gamma \in \Gamma$  korral LKR üle sama korpuse  $\mathbb{K}$  ning  $u_\gamma: X_\gamma \rightarrow X$  on lineaarsed kujutused omadusega

$$X = \text{span} \bigcup_{\gamma \in \Gamma} u_\gamma(X_\gamma).$$

**Definitsioon.** Tugevaimat lokaalselt kumerat topoloogiat  $\tau_{\text{ind}}$  vektorruumis  $X$ , mille suhtes kõik kujutused  $u_\gamma$  on pidevad, nimetatakse (LKR-de  $X_\gamma$  ja kujutustega  $u_\gamma$  määratud) *induktiivse piiri topoloogiaks*. LKR-i  $(X, \tau_{\text{ind}})$  nimetame sel juhul LKR-de  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  *induktiivseks piiriks* (kujutuste  $u_\gamma$  suhtes).

**Ülesanne 12.1.** Tõestada, et ülaltoodud eeldustel induktiivse piiri topoloogia  $\tau_{\text{ind}}$  vektorruumis  $X$  eksisteerib.

Induktiivse piiri topoloogia uurimisel on põhiküsimus, millised ruumide  $X_\gamma$  omadused on pärandatavad, s.o. kanduvad üle ruumi  $(X, \tau_{\text{ind}})$ . Mainime kohe kahte omadust, mille puhul vastus on negatiivne, need on eralduvus ja metriseeruvus. Näiteks F-ruumide induktiivne piir ei ole üldjuhul F-ruum. Märgime asjaolu, et üldjuhul puudub sellise poolnormide süsteemi efektiivne kirjeldus, mis määrab induktiivse piiri topoloogia. Sellest hoolimata mängivad induktiivsed piirid väga olulist rolli nii teorias kui ka paljudes rakendustes.

Me alustame **induktiivsete piiride lähemat uurimist** topoloogia  $\tau_{\text{ind}}$  täpsema kirjeldusega.

**Lause 12.1.** *Absoluutsest kumer neelav alamhulk  $U \subset X$  on  $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbrus parajasti siis, kui  $u_\gamma^{-1}(U)$  on nulliumbrus ruumis  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral.*

**Tõestus. Tarvilikkus.** Kui  $U$  on  $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbrus, siis  $u_\gamma^{-1}(U)$  on  $\tau_\gamma$ -nulliumbrus kujutuse  $u_\gamma$  pidevuse tõttu.

**Piisavus.** Olgu  $\tau_U$  poolnormiga  $p_U$  (hulga  $U$  Minkowski funktsionaal) määratud lokaalselt kumer topoloogia VR-s  $X$ , sel juhul  $\{\lambda U \mid \lambda > 0\}$  on  $\tau_U$ -nulliumbruste baas. Kui  $u_\gamma^{-1}(U)$  on nulliumbrus ruumis  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$ , siis kujutus  $u_\gamma: (X_\gamma, \tau_\gamma) \rightarrow (X, \tau_U)$  on pidev. Seega  $\tau_U \subset \tau_{\text{ind}}$ , s.t.  $U$  on  $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbrus. ■

**Lause 12.2.** *Kui  $\mathfrak{B}_\gamma$  on LKR-i  $X_\gamma$  absoluutsest kumeratest nulliumbrustest koosnev baas iga  $\gamma \in \Gamma$  puhul, siis*

$$\mathfrak{B} := \left\{ \text{absconv} \bigcup_{\gamma \in \Gamma} u_\gamma(V_\gamma) \mid V_\gamma \in \mathfrak{B}_\gamma \right\}$$

*on nulliumbruste baas LKR-s  $(X, \tau_{\text{ind}})$ .*

**Tõestus.** Kõigepealt paneme tähele, et iga hulk

$$U := \text{absconv} \bigcup_{\gamma \in \Gamma} u_\gamma(V_\gamma) \in \mathfrak{B} \tag{12.1}$$

on  $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbrus. See tuleneb lausest 12.1, sest

$$V_\delta \subset u_\delta^{-1}(u_\delta(V_\delta)) \subset u_\delta^{-1}\left(\text{absconv} \bigcup_{\gamma \in \Gamma} u_\gamma(V_\gamma)\right) = u_\delta^{-1}(U)$$

iga  $\delta \in \Gamma$  ja iga sellise  $V_\delta \in \mathfrak{B}_\delta$  korral, mis on hulga  $U$  esituses (12.1).

Näitame, et  $\mathfrak{B}$  on  $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbruste baas. Olgu  $U \subset X$  suvaline absoluutsest kumer  $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbrus. Iga  $\gamma \in \Gamma$  korral on  $u_\gamma^{-1}(U)$  siis  $\tau_\gamma$ -nulliumbrus, seega saab valida  $V_\gamma \in \mathfrak{B}_\gamma$  omadusega  $V_\gamma \subset u_\gamma^{-1}(U)$ , kust  $u_\gamma(V_\gamma) \subset U$ . Seetõttu  $U \supset V := \text{absconv} \bigcup_{\gamma \in \Gamma} u_\gamma(V_\gamma)$  ning  $V \in \mathfrak{B}$ . Tähendab,  $\mathfrak{B}$  on  $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbruste baas. ■

Lause 12.1 lubab meil tööstada järgmiste väite.

**Lause 12.3.** *Tünniruumide induktiivne piir on tünniruum.*

**Tõestus.** Olgu  $(X, \tau_{\text{ind}})$  LKR-de  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  induktiivne piir kujutuste  $u_\gamma: X_\gamma \rightarrow X$  suhtes, kus  $\gamma \in \Gamma$ . Kui  $U$  on tünn LKR-s  $(X, \tau_{\text{ind}})$ , siis  $u_\gamma^{-1}(U)$  on tünn ruumis  $X_\gamma$  (kontrollida!)☒ ning seega  $\tau_\gamma$ -nulliumbrus. Lause 12.1 põhjal on  $U$   $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbrus. Tähendab,  $(X, \tau_{\text{ind}})$  on tünniruum. ■

**Lause 12.4.** *Olgu  $(Z, \tau)$  mingi LKR ja  $(X, \tau_{\text{ind}})$  LKR-de  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  induktiivne piir kujutuste  $u_\gamma: X_\gamma \rightarrow X$  suhtes, kus  $\gamma \in \Gamma$ . Lineaarde kujutus  $A: X \rightarrow Z$  on pidev parajasti siis, kui kujutus  $A \circ u_\gamma: X_\gamma \rightarrow Z$  on iga  $\gamma \in \Gamma$  korral pidev. Lineaarse kujutuste hulk  $\mathfrak{A} \subset L(X, Z)$  on võrdpidev parajasti siis, kui  $\{A \circ u_\gamma \mid A \in \mathfrak{A}\} \subset L(X_\gamma, Z)$  on võrdpidev iga  $\gamma \in \Gamma$  korral.*

**Tõestus.** Selge, et kui  $A$  on pidev, siis ka kompositsioon  $A \circ u_\gamma$  on pidev. Kui eeldada kujutuste  $A \circ u_\gamma$  pidevust iga  $\gamma \in \Gamma$  korral, siis seosest

$$u_\gamma^{-1}(A^{-1}(V)) = (A \circ u_\gamma)^{-1}(V) \quad (12.2)$$

tuleneb, et  $A^{-1}(V)$  on  $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbrus iga absoluutsest kumera  $\tau$ -nulliumbruse  $V$  puhul. See tähendabki kujutuse  $A: (X, \tau_{\text{ind}}) \rightarrow (Z, \tau)$  pidevust.

Hulk  $\mathfrak{A} \subset L(X, Z)$  on võrdpidev parajasti siis, kui  $\bigcap \{A^{-1}(V) \mid A \in \mathfrak{A}\}$  on nulliumbrus ruumis  $(X, \tau_{\text{ind}})$  (selgitada!)☒. Seose (12.2) ja lause 12.1 tõttu on see samaväärne tingimusega, et alamhulk  $\{(A \circ u_\gamma)^{-1}(V) \mid A \in \mathfrak{A}\}$  on  $\tau_\gamma$ -nulliumbrus, s.t.  $\{A \circ u_\gamma \mid A \in \mathfrak{A}\}$  on  $\tau_\gamma$ -võrdpidev iga  $\gamma \in \Gamma$  korral. ■

Viimane lause annab meile võimaluse kirjeldada **induktivse piiri topoloogiat polaartopoloogiana**. Selleks on mugav kasutada kaaskujutuse mõistet. Olgu  $\langle X, X' \rangle$  ja  $\langle Z, Z' \rangle$  duaalsed paarid. Lineaarse kujutuse  $A: X \rightarrow Z$  kaaskujutuseks nimetatakse kujutust

$$A': Z' \rightarrow X^*, \quad g \mapsto g \circ A,$$

teiste sõnadega,

$$A'(g)(x) = g(A(x)) \quad \text{ehk} \quad \langle x, A'(g) \rangle = \langle A(x), g \rangle \quad (x \in X, g \in Z').$$

Ilmselt on  $A': Z' \rightarrow X^*$  lineaarde kujutus. Vahetu kontroll näitab, et  $A'(Z') \subset X'$  parajasti siis, kui  $A$  on nõrgalt pidev, s.t.  $A: (X, \sigma(X, X')) \rightarrow (Z, \sigma(Z, Z'))$  on pidev (veenduda!)☒.

Kui  $(X, \tau)$  ja  $(Z, \tau')$  on eralduvad LKR-d ja  $A \in L(X, Z)$ , siis  $A$  on nõrgalt pidev: suvalise  $g \in Z'$  korral  $g \circ A \in X'$ , s.t.  $A'(Z') \subset X'$ . Seega on igal kujutusel  $A \in L(X, Z)$  kaaskujutus  $A'$ .

Alamhulk  $S \subset (X, \tau_{\text{ind}})'$  on  $\tau_{\text{ind}}$ -võrdpidev parajasti siis, kui  $u'_\gamma(S) = \{f \circ u_\gamma \mid f \in S\}$  on  $\tau_\gamma$ -võrdpidev iga  $\gamma \in \Gamma$  korral. Teisalt, iga eralduv lokaalselt kumer topoloogia  $\tau$  vektorruumis  $Z$  on polaartopoloogia  $\mathcal{T}_S$ , kus  $\mathfrak{S}$  on kõigi  $\tau$ -võrdpidevate alamhulkade  $S \subset (Z, \tau)'$  süsteem (vrd. teoreem 9.4). Siit tuleneb järgmine lause.

**Lause 12.5.** *Kui LKR-d  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  ja  $(X, \tau_{\text{ind}})$  on eralduvad, siis  $\tau_{\text{ind}}$  on polaartopoloogia  $\mathcal{T}_S$ , kus  $\mathfrak{S}$  on kõigi selliste hulkade  $S \subset (X, \tau_{\text{ind}})'$  süsteem, mille puhul  $u'_\gamma(S) \subset X'_\gamma$  on  $\tau_\gamma$ -võrdpidev iga  $\gamma \in \Gamma$  korral.*

**Induktiivse piiri ja projektiivse piiri mõistete duaalsus** selgub järgmisest lausest.

**Lause 12.6.** *Eeldame, et LKR-d  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  ja  $(X, \tau_{\text{ind}})$  on eralduvad. Olgu iga kaasruumis  $X'_\gamma := (X_\gamma, \tau_\gamma)'$  määratud polaartopoloogia  $\mathcal{T}_{\mathfrak{S}_\gamma}$ , kus  $\mathfrak{S}_\gamma$  on mängi  $\sigma(X_\gamma, X'_\gamma)$ -tõkestatud alamhulkade süsteem. Kui*

$$\mathfrak{S} := \left\{ \bigcup_{k=1}^n u_{\gamma_k}(S_{\gamma_k}) \mid S_{\gamma_k} \in \mathfrak{S}_{\gamma_k}, k = 1, \dots, n; n \in \mathbb{N} \right\}$$

*siis  $\mathcal{T}_S$  on vektorruumis  $X' = (X, \tau_{\text{ind}})'$  LKR-de  $(X'_\gamma, \mathcal{T}_{\mathfrak{S}_\gamma})$  projektiivne piir kaaskujutuste  $u'_\gamma$  suhtes.*

**Tõestus.** Kuna  $u_\gamma \in L(X_\gamma, X)$ , siis  $u'_\gamma: X' \rightarrow X'_\gamma$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral. Defineerime kaasruumis  $X'$  projektiivse piiri topoloogia  $\tau_{\text{proj}}$  LKR-de  $(X'_\gamma, \mathcal{T}_{\mathfrak{S}_\gamma})$  ja kujutuste  $u'_\gamma$  suhtes. See on nõrgim lokaalselt kumer topoloogia, mille suhtes kujutused  $u'_\gamma$  on pidevad ehk milles  $(u'_\gamma)^{-1}((S_\gamma)^0)$  on nulliumbrused. Kuna  $(u'_\gamma)^{-1}((S_\gamma)^0) = (u_\gamma(S_\gamma))^0$  (kontrollida!)\(\blacksquare\), siis  $\tau_{\text{proj}} = \mathcal{T}_S$  (põhjendada!)\(\blacksquare\). ■

## 12.2 Bornoloogilised ruumid

**Tõkestatud kujutused.** Olgu  $(X, \tau)$  ja  $(Z, \tau')$  LKR-d ning  $A: X \rightarrow Z$  lineaarne kujutus. Kui  $A$  on pidev, siis on ta tõkestatud, s.t. ta teisendab iga  $\tau$ -tõkestatud hulga  $E \subset X$   $\tau'$ -tõkestatud hulgaks  $A(E)$  ruumis  $Z$ . Tõepoolest, kui  $V$  on mängi absoluutsele kumer nulliumbrus ruumis  $Z$ , siis kujutuse  $A$  pidevuse tõttu leidub selline nulliumbrus  $U$  ruumis  $X$ , et  $U \subset A^{-1}(V)$ , ning tänu hulga  $E$  tõkestatusele  $\lambda E \subset U \subset A^{-1}(V)$  mängi  $\lambda > 0$  korral. Siit tuleneb, et  $\lambda A(E) = A(\lambda E) \subset V$ , seega  $A(E)$  on tõkestatud.

Kui  $X$  ja  $Z$  on normeeritud ruumid, siis kehtib teatavasti ka vastupidine väide: iga tõkestatud lineaarne kujutus on pidev. Need faktid on lähtekohaks järgmisse probleemiasetusele: kirjeldada selliseid LKR-e  $X$ , mille puhul iga tõkestatud lineaarne kujutus  $A: X \rightarrow Z$  on pidev suvalise LKR-i  $Z$  korral.

**Bornoloogiline ruum. Definitsioon.** LKR-i  $(X, \tau)$  nimetatakse *bornoloogiliseks ruumiks*, kui iga selline absoluutsele kumer alamhulk  $U \subset X$ , mis neelab kõik  $\tau$ -tõkestatud hulgad, on  $\tau$ -nulliumbrus.

Meenutame (vrd. art. 2.2), et väljendiga " $U$  neelab hulga  $A$ " tähistame me (eeldusel, et  $U$  on tasakaalus) väidet "leidub selline  $\lambda > 0$ , et  $\lambda A \subset U$ ". Märgime veel, et kuna iga lõplik alamhulk on tõkestatud, siis definitsioonis toodud omadusega hulk  $U$  on kindlasti neelav. Samal ajal ei pruugi  $U$  olla tünn, sest me ei eelda tema kinnisust.

Järgmine lause näitab, et bornoloogiliste ruumide klass sisaldab parajasti kõik soovitud omadusega lokaalselt kumerad ruumid.

**Lause 12.7.** *LKR-i  $(X, \tau)$  puhul on järgmised väited samaväärsed:*

- (a)  *$(X, \tau)$  on bornoloogiline ruum,*
- (b) *iga tõkestatud lineaarne kujutus  $A: X \rightarrow Z$  on iga LKR-i  $(Z, \tau')$  korral pidev.*

**Tõestus.** (a)  $\Rightarrow$  (b) Eeldame, et  $A$  on tõkestatud lineaarne kujutus bornoloogilisest ruumist  $X$  LKR-i  $Z$ . Olgu  $V$  absoluutsest kumer nulliumbrus ruumis  $Z$ . Näitame, et  $A^{-1}(V)$  on  $\tau$ -nulliumbrus, siis  $A$  on pidev. Olgu  $E$  tõkestatud alamhulk ruumis  $X$ . Kuna  $A$  on tõkestatud kujutus, siis  $A(E)$  on ruumis  $Z$  tõkestatud ning seega  $A(E) \subset \lambda V$  mängi  $\lambda > 0$  korral, milles tuleneb sisalduvus  $E \subset \lambda A^{-1}(V)$ . Näeme, et absoluutsest kumer alamhulk  $A^{-1}(V)$  neelab iga  $\tau$ -tõkestatud alamhulga, olles seetõttu nulliumbrus bornoloogilises ruumis  $X$ . Niisiis on  $A$  pidev kujutus.

(b)  $\Rightarrow$  (a) Olgu  $U \subset X$  selline absoluutsest kumer alamhulk, mis neelab iga tõkestatud hulga ruumis  $X$ . Sel juhul on ta neelav ning tema Minkowski funktsionaal  $p_U$  on poolnorm vektorruumis  $X$  (vrd. järeltus 5.7). Vaatleme selles ruumis lisaks esialgsele topoloogiale  $\tau$  veel poolnormiga  $p_U$  määratud lokaalselt kumerat topoloogiat  $\tau_U$ , mille nulliumbruste baasiks on süsteem  $\{\varepsilon U \mid \varepsilon > 0\}$ . Paneme tähele, et iga  $\tau$ -tõkestatud hulk  $B \subset X$  on  $\tau_U$ -tõkestatud (kontrollida!) $\blacksquare$ , see tähendab ühikkujutuse  $i: (X, \tau) \rightarrow (X, \tau_U)$  tõkestatust ja seega eelduse (b) kohaselt ka pidevust, mistõttu  $U$  on  $\tau$ -nulliumbrus. ■

Märgime bornoloogilise ruumi üht olulist omadust: *kui  $(X, \tau)$  on eralduv bornoloogiline ruum, siis  $\tau$  on Mackey topoloogia  $\tau(X, X')$ , kus  $X' := (X, \tau)'$ .* Selle väite kontrollimiseks paneme tähele, et ühikkujutus  $i: (X, \tau) \rightarrow (X, \tau(X, X'))$  on tõkestatud, sest topoloogiatel  $\tau$  ja  $\tau(X, X')$  on Mackey teoreemi järeltuse 9.11 kohaselt ühed ja samad tõkestatud hulgad. Lause 12.7 põhjal on  $i$  pidev kujutus, seetõttu  $\tau \supseteq \tau(X, X')$ . Kuna  $\tau(X, X')$  on tugevaim neist lokaalselt kumeratest topoloogiatest, mis on duaalsusega  $\langle X, X' \rangle$  kooskõlas (vrd. järeltus 9.8), siis kehtib ka vastupidine sisalduvus, ning kokkuvõttes seos  $\tau = \tau(X, X')$ .

Teatavasti (vt. lause 9.13) jäääb siin tõkestatud väide õigeks, kui selles asendada sõna *bornoloogiline* sõnaga *metriseeruv*. Nende **kahe mõiste vahekorda** selgitab järgmine lause.

**Lause 12.8.** *Iga metriseeruv lokaalselt kumer ruum on bornoloogiline.*

**Tõestus.** Olgu  $(X, \tau)$  metriseeruv LKR nulliumbruste baasiga  $\mathfrak{B} := \{U_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ , mis rahuldab tingimust  $U_{n+1} \subset U_n$ . Oletame vastuväiteliselt, et  $X$  ei ole bornoloogiline. Siis leidub selline absoluutsest kumer hulk  $U \subset X$ , mis neelab kõik tõkestatud alamhulgad, kuid ei ole nulliumbrus, järelkult  $U_n \not\subset U$  iga  $n \in \mathbb{N}$  korral, mistõttu

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in U_n \setminus nU$$

(kontrollida!) $\blacksquare$ . Kuna  $x_n \rightarrow 0$  (põhjendada!) $\blacksquare$ , siis hulk  $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  on tõkestatud, niisiis leidub  $\lambda > 0$ , et  $\lambda x_n \in U$  iga  $n \in \mathbb{N}$  puhul. Kui  $n \geq \frac{1}{\lambda}$ , siis  $\frac{1}{n}x_n \in U$  ehk  $x_n \in nU$ , mis on vastuolus elementide  $x_n$  valikuga. Saadud vastuolu ütleb, et  $X$  on bornoloogiline ruum. ■

Induktiiivsete piiride kontekstis on oluline järgmine fakt.

**Lause 12.9.** *Bornoloogiliste ruumide induktiivne piir on bornoloogiline ruum.*

**Tõestus.** Olgu  $(X, \tau_{\text{ind}})$  bornoloogiliste ruumide  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$ , kus  $\gamma \in \Gamma$ , induktiivne piir kujutuste  $u_\gamma: X_\gamma \rightarrow X$  suhtes ja olgu  $AX \rightarrow Z$  tõkestatud lineaarne kujutus, kus  $(Z, \tau')$  on LKR. Kui  $E$  on tõkestatud hulk ruumis  $X_\gamma$ , siis tänu kujutuse  $u_\gamma$  pidevusele ning  $A$  tõkestatusele on  $(A \circ u_\gamma)(E) = A(u_\gamma(E))$  tõkestatud hulk ruumis  $Z$ . Niisiis on  $A \circ u_\gamma: X_\gamma \rightarrow Z$  iga  $\gamma \in \Gamma$  korral tõkestatud kujutus ja seega eelduse kohaselt pidev. Lause 12.4 põhjal on  $A$  pidev, mis tähendab ruumi  $(X, \tau_{\text{ind}})$  bornoloogilisust. ■

Lausetest 12.8 ja 12.9 tuleneb, et *metriseeruvate LKR-de induktiivne piir on bornoloogiline ruum*. Käesoleva artikli **põhitulemus**, mille me järgnevalt esitame, ütleb, et see väide on teatavas mõttes võrreldav.

**Teoreem 12.10.** *Eralduv LKR  $(X, \tau)$  on bornoloogiline parajasti siis, kui ta on normeeritud ruumide induktiivne piir. Täielik eralduv LKR  $(X, \tau)$  on bornoloogiline parajasti siis, kui ta on Banachi ruumide induktiivne piir.*

Teoreem 12.10 järeltub vahetult järgmisest üldisemast lausest.

**Lause 12.11.** *Olgu  $(X, \tau)$  eralduv LKR. Vektorruumis  $X$  on olemas tugevaim lokaalselt kumer topoloogia  $\tau'$ , millel on topoloogiaga  $\tau$  ühed ja samad tõkestatud hulgad. Seejuures on  $(X, \tau')$  bornoloogiline ruum ja ta on esitatav vektorruumi  $X$  vektoralamruumidest moodustatud normeeritud ruumide induktiivse piirina. Topoloogiad  $\tau$  ja  $\tau'$  langevad kokku parajasti siis, kui  $(X, \tau)$  on bornoloogiline ruum. Kui  $(X, \tau)$  on täielik LKR, siis  $(X, \tau')$  on Banachi ruumide induktiivne piir.*

**Tõestus.** Tähistame tähega  $\mathcal{S}$  kõigi kinniste tõkestatud absoluutsest kumerate alamhulkade süsteemi ruumis  $(X, \tau)$ . Suvalise  $A \in \mathcal{S}$  korral olgu  $X_A$  tema lineaarne kate vektorruumis  $X$ , s.o.  $X_A := \text{span}A$ . Hulga  $A$  Minkowski funktsionaal  $p_A$  on norm vektorruumis  $X_A$ . Me teame (vt. lause 9.12 tõestus), et normi  $p_A$  poolt määratud topoloogia  $\tau_A$  on tugevam, kui indutseeritud topoloogia  $\tau|_{X_A}$  alamruumil  $X_A$ , seetõttu sisestused

$$u_A: (X_A, \tau_A) \rightarrow (X, \tau), \quad x \mapsto x \quad (A \in \mathcal{S})$$

on pidevad ning  $X = \bigcup_{A \in \mathcal{S}} X_A = \bigcup_{A \in \mathcal{S}} u_A(X_A)$ . Olgu  $\tau'$  induktiivse piiri topoloogia vektorruumis  $X$  LKR-de  $(X_A, \tau_A)$  ja kujutuste  $u_A$  suhtes, kus  $A \in \mathcal{S}$ . Seejuures  $(X, \tau')$  kui metriseeruvate lokaalselt kumerate ruumide induktiivne piir on bornoloogiline ruum. Kuna iga absoluutsest kumera  $\tau$ -nulliumbruse  $U$  korral  $u_A^{-1}(U) = U \cap X_A$  on  $\tau_A$ -nulliumbrus ruumis  $X_A$ , siis lause 12.1 põhjal  $\tau' \supset \tau$ . Kui  $\tau$  on seejuures bornoloogiline topoloogia, siis ühikkujustus  $i: (X, \tau) \rightarrow (X, \tau')$  on pidev, mistõttu saame  $\tau' = \tau$ .

Seosest  $\tau' \supset \tau$  tuleneb muuhulgas, et iga  $\tau'$ -tõkestatud alamhulk on  $\tau$ -tõkestatud. Meie eesmärgiks on veenduda, et neil topoloogiatel on samad tõkestatud hulgad. Kuna LKR-s on alamhulk tõkestatud parajasti siis, kui tema kinnine absoluutsest kumer kate on tõkestatud (selgitada!)☒, siis piisab näidata, et iga  $A \in \mathcal{S}$  on  $\tau'$ -tõkestatud (põhjendada!)☒. Selleks paneme tähele, et  $A \in \mathcal{S}$  on  $\tau'$ -tõkestatud parajasti siis, kui iga absoluutsest kumera  $\tau'$ -nulliumbruse  $V$  korral leidub selline  $\lambda > 0$ , et  $\lambda A \subset V \cap X_A$ , mis on samaväärne tingimusega  $\tau'|_{X_A} \subset \tau_A$  (selgitada!)☒. See tingimus on täidetud kujutuse  $u_A$  pidevuse tõttu (kontrollida!)☒.

Lõpuks näitame, et kui  $(X, \tau)$  on täielik LKR, siis  $(X_A, \tau_A)$  on Banachi ruum iga  $A \in \mathcal{S}$  puhul. Olgu  $(x_n)$  suvaline Cauchy jada normeeritud ruumis  $X_A$ , siis on ta  $\tau$ -Cauchy jada ruumis  $X$ , mistõttu ta koondub selles ruumis mingiks punktiks  $a$ . Cauchy jada definitsiooni kohaselt

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : m, n \geq N \Rightarrow x_m - x_n \in \varepsilon A.$$

Kuna  $\varepsilon A$  on  $\tau$ -kinnine hulk, siis  $a - x_n \in \varepsilon A$ , millest tuleneb, et  $a \in x_n + \varepsilon A \subset X_A$  ja  $x_n \rightarrow a (\tau_A)$ . Tähendab,  $(X_A, \tau_A)$  on täielik. ■

Lõpetame selle peatüki kahe märkusega. Esiteks, lause 12.11 tõestuses võime kõigi kiniste tõkestatud absoluutsest kumerate alamhulkade süsteemi  $\mathcal{S}$  asendada selle süsteemi suvalise fundamentaalsüsteemiga, s.o. niisuguse alamsüsteemiga  $\mathcal{S}_0$ , et iga  $A \in \mathcal{S}$  jaoks leidub  $B \in \mathcal{S}_0$  omadusega  $B \supset A$ . Siit tuleneb, et kui LKR-s  $(X, \tau)$  on loenduv tõkestatud alamhulkade fundamentaalsüsteem, siis saab ta esitada loenduva normeeritud ruumide pere induktiivse piirina (vrd. art. 13.3).

Teiseks märgime, et bornoloogilise ruumi ja tünniruumi mõisted ei ole üldjuhul võrreldavad. Saab tuua näiteid bornoloogilistest ruumidest, mis ei ole tünniruumid ja vastupidi. Lausetest 12.3 ja 12.11 aga saame, et ***iga täielik eralduv bornoloogiline ruum on tünniruum*** (kontrollida!)☒.

## 13 Induktiiivse piiri erijuhud: faktorruum, otsumma, range induktiiivne piir

### 13.1 Faktorruumid

Olgu  $X$  vektorruum ning  $M$  tema vektoralamruum. Defineerime ruumi  $X$  elementide vahel ekvivalentsusseose

$$x \sim y : \Leftrightarrow x - y \in M$$

ja tähistame  $X/M$  vastavate ekvivalentsiklasside hulga. Selle elemente tähistame tähtedega  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \dots$ . Lihtne on veenduda, et  $X/M$  on vektorruum, kui defineerida

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} := \{x + y \mid x \in \mathbf{x}, y \in \mathbf{y}\} \text{ ja } \lambda \mathbf{x} := \{\lambda x \mid x \in \mathbf{x}\} \quad (\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\})$$

(kontrollida!) $\clubsuit$ , juhul  $\lambda = 0$  olgu  $0\mathbf{x} := M$ . Ekvivalentsiklass  $M$  osutub vektorruumi  $X/M$  nullelementiks: kuna iga  $z \in \mathbf{x} + M$  korral  $z = x + u$ , kus  $x \in \mathbf{x}$  ja  $u \in M$ , siis  $z - x = u \in M$ , s.t.  $z \sim x$  ehk  $\mathbf{x} + M = \mathbf{x}$ .

Ekvivalentsiklassid  $\mathbf{x} \in X/M$  katavad kogu vektorruumi  $X$  ning ei lõiku omavahel. See-tõttu määrab iga  $x \in X$  üheselt elemendi  $x + M \in X/M$ . Defineerime kujutuse

$$k: X \rightarrow X/M, \quad x \mapsto x + M,$$

see on lineaarne ja surjektiivne (selgitada!) $\clubsuit$ .

Vektorruumi  $X/M$  nimetatakse vektorruumi  $X$  faktorruumiks vektoralamruumi  $M$  järgi, kujutust  $k$  nimetatakse faktorruumi  $X/M$  kanooniliseks kujutuseks.

**Faktortopoloogia.** Olgu  $(X, \tau)$  LKR nulliumbruste baasiga  $\mathfrak{B}$ , mis koosneb absoluutselt kumeratest hulkadest ja on kinnine lõplike ühisade ja kordsete moodustamise suhtes. Vaatleme alamhulkade süsteemi

$$\mathfrak{B}' := \{k(U) \mid U \in \mathfrak{B}\}$$

vektorruumis  $X/M$ , pole raske näha, et see on mingi lokaalselt kumera topoloogia nulliumbruste baas: hulgad  $k(U)$  on absoluutsest kumerad ja neelavad (kontrollida!) $\clubsuit$ , peale selle on  $\mathfrak{B}'$  kinnine lõplike ühisade ja kordsete moodustamise suhtes.

Nulliumbruste baasiga  $\mathfrak{B}'$  määratud lokaalselt kumerat topoloogiat  $\tau'$  vektorruumis  $X/M$  nimetatakse faktortopoloogiaks. Kuna  $U \subset k^{-1}(k(U))$  iga  $U \in \mathfrak{B}$  korral, siis kanooniline kujutus  $k: (X, \tau) \rightarrow (X/M, \tau')$  on pidev.

**Lause 13.1.** *Faktortopoloogia  $\tau'$  on eralduv parajasti siis, kui  $M$  on kinnine vektoralamruum LKR-s  $(X, \tau)$ .*

**Tõestus.** *Tarvilikkus.* Kui  $(X/M, \tau')$  on eralduv, siis ühe-elemendiline hulk  $\{0_{X/M}\}$  on  $\tau'$ -kinnine. Kujutuse  $k$  pidevuse tõttu on  $M = k^{-1}(\{0\})$  kinnine ruumis  $X$ .

**Piisavus.** Olgu alamruum  $M$  kinnine ruumis  $X$ . Kui  $\mathbf{x} \in (X/M) \setminus \{0\}$ , siis iga  $x \in \mathbf{x}$  korral  $x \notin M$ . Järelikult leidub  $U \in \mathfrak{B}$  omadusega  $(x + U) \cap M = \emptyset$ , mistõttu  $x \notin M + U$  (vastasel juhul  $x = m - u$  mingite  $m \in M$  ja  $u \in U$  korral ning  $x + u \in (x + U) \cap M$ ), seega

$\mathbf{x} = k(x) \notin k(M + U) = k(U)$ . Tähendab,  $\bigcap \{k(U) \mid U \in \mathfrak{B}\} = \{0\}$ , lause 2.7 kohaselt on topoloogia  $\tau'$  eralduv. ■

Faktortopoloogia **kirjeldamiseks poolnormide abil** saab kasutada hulkade  $k(U) \in \mathfrak{B}'$  Minkowski funktsionaale. Pidades silmas, et

$$\mathbf{x} \in \lambda k(U) \Leftrightarrow \exists x \in \mathbf{x} : x \in \lambda U$$

(veenduda!)  $\blacksquare$ , saame seose

$$p_{k(U)}(\mathbf{x}) = \inf_{x \in \mathbf{x}} \inf \{\lambda > 0 \mid x \in \lambda U\} = \inf \{p_U(x) \mid x \in \mathbf{x}\}$$

iga  $\mathbf{x} \in X/M$  puhul. Kui  $X$  on normeeritud ruum, siis

$$\|\mathbf{x}\| := \inf \{\|x\|_X \mid x \in \mathbf{x}\}$$

on norm (eeldusel, et  $M$  on kinnine alamruum) vektorrumis  $X/M$ .

Käesoleva peatüki kontekstis on oluline see fakt, et faktortopoloogiat võib vaadelda induktiivse piiri topoloogiana: topoloogia  $\tau'$  on tugevaim lokaalselt kumer topoloogia vektorrumis  $X/M$ , mille suhtes kujutus  $k: X \rightarrow X/M$  on pidev. Tõepoolest, kui  $\tau_1$  on niisugune lokaalselt kumer topoloogia vektorrumis  $X/M$ , et  $k: (X, \tau) \rightarrow (X/M, \tau_1)$  on pidev, siis iga  $V \in \mathfrak{B}_{\tau_1}$  korral  $k^{-1}(V)$  on  $\tau$ -nulliumbris, seega leidub selline  $U \in \mathfrak{B}_\tau$ , et  $U \subset k^{-1}(V)$ , milles tuleneb  $k(U) \subset k(k^{-1}(V)) = V$ . Tähendab, iga  $\tau_1$ -nulliumbris on  $\tau'$ -nulliumbris ehk  $\tau_1 \subset \tau'$ . (Märgime, et  $k(k^{-1}(\mathbf{z})) = \mathbf{z}$  iga  $\mathbf{z} \in X/M$  korral.)

Kui vektoralamruum  $M$  ei ole kinnine ruumis  $X$ , siis lause 13.1 kohaselt ei ole LKR  $(X/M, \tau')$  eralduv, sõltumata sellest, kas ruum  $X$  on eralduv või mitte. Seega oleme saanud kinnituse eelmise peatüki alguses esitatud väitele, et **eralduvus ei ole induktiivsetele piiridele pärandatav omadus**.

Lausest 12.3 saame faktorruumide järgmise omaduse.

**Lause 13.2.** *Tünniruumi  $X$  faktorruum  $X/M$  alamruumi  $M$  järgi on tünniruum.*

**Lineaarsed kujutused faktorruumis.** Olgu  $T: X \rightarrow Z$  lineaarne kujutus, kus  $X$  ja  $Z$  on vektorruumid. Eeldame, et  $M \subset T^{-1}(\{0\}) = \{x \in X \mid T(x) = 0\}$ . Siis  $T = S \circ k$ , kus

$$S: X/M \rightarrow Z, \quad \mathbf{x} \mapsto T(x) \quad (x \in \mathbf{x})$$

(peame silmas, et kui  $x - x' \in M$ , siis  $T(x) = T(x')$ ). Kui  $X$  ja  $Z$  on sealjuures LKR-d, siis lause 12.4 põhjal on  $T$  pidev parajasti siis, kui  $S$  on pidev. Erijuhul saame järgmise väite.

**Lause 13.3.** *Iga lineaarne kujutus  $T$  LKR-st  $X$  LKR-i  $Z$  on esitatav kujul  $T = S \circ k$ , kus  $S$  on üksühene lineaarne kujutus faktorruumist  $X/T^{-1}(\{0\})$  ruumi  $Z$  ja  $k$  on faktorruumi  $X/T^{-1}(\{0\})$  kanooniline kujutus. Kujutus  $T$  on pidev parajasti siis, kui  $S$  on pidev.*

Tõestatud lause abil saame kirjeldada **faktorruumi kaasruumi**. Kehtib järgmine väide.

**Lause 13.4.** *Faktorruumi  $X/M$  topoloogiline kaasruum  $(X/M, \tau')'$  on algebraliselt isomorfne alamruumi  $M$  annullaatoriga  $M^\perp := \{f \in X' \mid \forall x \in M : f(x) = 0\}$  kaasruumis  $X'$ .*

**Tõestus.** Olgu  $g \in (X/M, \tau')'$ , siis  $f := g \circ k \in X'$ . Paneme tähele, et iga  $x \in M$  puhul  $f(x) = g(k(x)) = g(0_{X/M}) = 0$ , s.t.  $f \in M^\perp$ . Defineerime kujutuse

$$F: (X/M, \tau')' \rightarrow M^\perp, \quad g \mapsto g \circ k,$$

vahetu kontroll näitab, et  $F$  on lineaarne. Sürjektiivsuse kontrollimiseks võtame suvalise  $f \in M^\perp$  ja moodustame funktsionaali  $g: X/M \rightarrow \mathbb{K}$ , kus  $g(\mathbf{x}) := f(x)$  iga  $x \in \mathbf{x}$  korral. Siis lause 13.3 põhjal  $g \in (X/M, \tau')'$ , kusjuures  $F(g)(x) = g(\mathbf{x}) = f(x)$  kõikide  $x \in X$  korral, s.t.  $F(g) = f$ .

Lõpuks paneme tähele, et  $F$  on üks-ühene: kui  $g \circ k = 0$ , siis  $g(\mathbf{x}) = 0$  iga  $\mathbf{x} \in X/M$  korral ehk  $g = 0$ .

Kokkuvõttes korraldab  $F$  isomorfimi vektorruumide  $(X/M, \tau')$  ja  $M^\perp$  vahel. ■

Juhime tähelepanu **vektoralamruumi ja faktorruumi mõistete duaalsusele**. Olgu  $\langle X, Y \rangle$  duaalne paar ja olgu  $M$  ruumi  $X$  selline vektoralamruum, mis eraldab punktid ruumis  $Y$ . Moodustame faktorruumi  $Y/M^\perp$  (siin  $M^\perp := \{f \in Y \mid \forall x \in M : f(x) = 0\}$ ) ning defineerime bilineaarse funktsionaali

$$B: M \times (Y/M^\perp) \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, \mathbf{f}) \mapsto \langle x, \mathbf{f} \rangle := f(x), \text{ kus } f \in \mathbf{f}$$

(paneme tähele, et kui  $f \in \mathbf{f}$  ning  $g \in \mathbf{f}$ , siis  $f(x) = g(x)$  kõikide  $x \in M$  puhul). Lihtne kontroll näitab, et kui  $\langle x, \mathbf{f} \rangle = 0$  iga  $\mathbf{f} \in Y/M^\perp$  korral, siis  $x = 0$ . Seega on  $\langle M, Y/M^\perp \rangle$  duaalne paar.

**Lause 13.5.**  $\sigma(M, Y/M^\perp) = \sigma(M, Y) = \sigma(X, Y)|_M$ .

**Tõestus.** Olgu  $f_1, \dots, f_n$  ruumi  $Y$  elemendid ja olgu  $\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n \in Y/M^\perp$  neile vastavad ekvivalentsiklassid. Kuna  $|\langle x, \mathbf{f}_i \rangle| = |\langle x, f_i \rangle|$  suvaliste  $x \in M$  ja  $f_i \in \mathbf{f}_i$  puhul, siis nulliumbruste baasid topoloogiates  $\sigma(M, Y)$  ja  $\sigma(M, Y/M^\perp)$ , mis koosnevad vastavalt hulkadest  $W_{f_1, \dots, f_n} = \{x \in M \mid \max_{1 \leq i \leq n} |\langle x, f_i \rangle| \leq 1\}$  ja  $W_{\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n} = \{x \in M \mid \max_{1 \leq i \leq n} |\langle x, \mathbf{f}_i \rangle| \leq 1\}$ , langevad kokku (vrd. art. 8.1). ■

## 13.2 Topoloogilised otsesummad

**Vektorruumide otsesumma.** Olgu  $X_\gamma$ , kus  $\gamma \in \Gamma$ , vektorruumid üle sama korpusse  $\mathbb{K}$ , moodustame nende otsekorrutise  $X := \prod_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma$  ja selle alamhulga  $\bigcup_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma$ , täpsemalt  $\bigcup_{\gamma \in \Gamma} j_\gamma(X_\gamma)$ , kus kujutus  $j_\gamma: X_\gamma \rightarrow X$ ,  $x_\gamma \mapsto (z_\nu)_{\nu \in \Gamma}$  on defineeritud seosega

$$z_\nu := \begin{cases} x_\gamma, & \text{kui } \nu = \gamma, \\ 0, & \text{kui } \nu \neq \gamma, \end{cases}$$

(vt. art. 11.2). Hulga  $\bigcup_{\gamma \in \Gamma} j_\gamma(X_\gamma)$  lineaarset katet

$$\bigoplus_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma := \text{span} \bigcup_{\gamma \in \Gamma} j_\gamma(X_\gamma)$$

nimetatakse vektorruumide  $X_\gamma$  (algebraliseks) *otsesummaks*. Vastavalt sellele defiitsioonile moodustavad otsesumma  $\bigoplus_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma$  need elemendid otsekorrutisest  $\prod_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma$ , millel on lõplik arv nullist erinevaid koordinaate. Iga element  $x \in \bigoplus_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma$  on esitatav kujul

$$x = \sum_{\gamma \in H} j_\gamma \circ \pi_\gamma(x), \text{ kus } \pi_\gamma: \prod_{\nu \in \Gamma} X_\nu \rightarrow X_\gamma, \quad (x_\nu) \mapsto x_\gamma \quad (\gamma \in \Gamma) \quad (13.1)$$

ja  $H \subset \Gamma$  on mingi lõplik alamhulk.

**Otsesumma topoloogia.** Olgu  $X := \prod_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma$  ja  $X_0 := \bigoplus_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma$ . Varustame vektorruumi  $X$  korrutistopolooagiaga  $\tau_\Pi$ , mille me defineerisime artiklis 11.2. Sealsamas tõestasime ka, et  $j_\gamma(X_\gamma)$  kui LKR-i  $(X, \tau_\Pi)$  alamruum on isomorfne LKR-ga  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$ , seega võime öelda (samastades  $X_\gamma$  ja  $j_\gamma(X_\gamma)$ ), et *korrutistopolooogia*  $\tau_\Pi$  indutseerib alamruumis  $X_\gamma$  selle lähetopolooogia  $\tau_\gamma$ , s.t.  $\tau_\Pi|_{X_\gamma} = \tau_\gamma$  iga  $\gamma \in \Gamma$  puhul. Osutub, et korrutistopolooogia ei ole üldjuhul tugevaim lokaalselt kumer topoloogia selle omadusega. Tugevaima topoloogia saame siis, kui defineerime vektorruumil  $X_0$  LKR-de  $X_\gamma$  induktiivse piiri topoloogia sisestuste  $j_\gamma$  suhtes, tähistame selle  $\tau_\oplus$ . LKR-i  $(X_0, \tau_\oplus)$  nimetatakse LKR-de  $(X_\gamma, \tau_\gamma)$  (*topoloogiliseks*) *otsesummaks*, topoloogiat  $\tau_\oplus$  *otsesumma topoloogiaks*. Defiitsiooni kohaselt  $\tau_\oplus \supset \tau_\Pi|_{X_0}$ . Seejuures kehtib järgmine väide.

**Lause 13.6.** *Iga lõpliku alamhulga  $H \subset \Gamma$  korral  $\tau_\Pi \Big|_{\bigoplus_{\gamma \in H} X_\gamma} = \tau_\oplus \Big|_{\bigoplus_{\gamma \in H} X_\gamma}$ .*

**Tõestus.** Olgu  $H \subset \Gamma$  mingi  $n$  elemendist koosnev alamhulk ning olgu  $U \subset X_0$  suvaline kumer  $\tau_\oplus$ -nulliumbrus. Kuna  $U \cap X_\gamma = j_\gamma^{-1}(U)$  on vastavalt lausele 12.1  $\tau_\gamma$ -nulliumbrus, siis

$$V := \frac{1}{n} \bigcap_{\gamma \in H} \pi_\gamma^{-1}(U \cap X_\gamma)$$

on  $\tau_\Pi$ -nulliumbrus ruumis  $X$  (vrd. art. 11.1). Iga  $x \in V$  ja  $\gamma \in H$  korral  $\pi_\gamma(x) \in \frac{1}{n}U$ , seetõttu  $x = \sum_{\gamma \in H} \pi_\gamma(x) \in \frac{1}{n}U + \dots + \frac{1}{n}U \subset U$  tänu hulga  $U$  kumerusele. Niisiis,

$$V \cap \bigoplus_{\gamma \in H} X_\gamma \subset U \cap \bigoplus_{\gamma \in H} X_\gamma,$$

mis ütleb, et  $\tau_\Pi \Big|_{\bigoplus_{\gamma \in H} X_\gamma} \supset \tau_\oplus \Big|_{\bigoplus_{\gamma \in H} X_\gamma}$ . Kuna üldiselt kehtib vastupidine sisalduvus, siis saamegi, et alamruumis  $\bigoplus_{\gamma \in H} X_\gamma$  langevad topoloogiad  $\tau_\Pi$  ja  $\tau_\oplus$  kokku. ■

Rõhutame, et lõpmatu alamhulga  $H$  puhul lause 13.6 ei kehti. Nimelt, kui fikseerida iga  $\gamma \in H$  korral  $\tau_\gamma$ -nulliumbrused  $U_\gamma \neq X_\gamma$ , siis  $V := \bigcap_{\gamma \in H} \pi_\gamma^{-1}(U_\gamma)$  ei ole  $\tau_\Pi$ -nulliumbrus, kuid on  $\tau_\oplus$ -nulliumbrus, sest iga  $x \in V$  puhul

$$j_\gamma^{-1}(x) = \pi_\gamma(x) \in \pi_\gamma \circ \pi_\gamma^{-1}(U_\gamma) = U_\gamma \quad (\gamma \in H).$$

**Topoloogilise otsesumma eralduvus.** Nagu me eespool märkisime, ei ole eralduvus induktiivsete piiride puhul üldjuhul pärandatav omadus. Järgmine lause näitab, et otsesummad moodustavad selles suhtes erandi.

**Lause 13.7.** *Topoloogiline otsesumma  $(X_0, \tau_{\oplus})$  on eralduv parajasti siis, kui iga ruum  $X_{\gamma}$  on eralduv. Sel juhul on alamruumid  $X_{\gamma}$  kinnised otsesummast  $(X_0, \tau_{\oplus})$ .*

**Tõestus.** Kui  $(X_0, \tau_{\oplus})$  on eralduv, siis ka  $X_{\gamma}$  on eralduv iga  $\gamma \in \Gamma$  korral, sest  $\tau_{\oplus}$  indutseerib alamruumis  $X_{\gamma}$  selle lähtetopoloogia  $\tau_{\gamma}$ . Kui eeldada, et kõik ruumid  $X_{\gamma}$  on eralduvad, siis korrutistopoloogia  $\tau_{\Pi}$  vektorruumis  $X$  (vrd. lause 11.8) ja tema ahend  $\tau_{\Pi}|_{X_0}$  on eralduvad. Tänu seosele  $\tau_{\oplus} \supset \tau_{\Pi}|_{X_0}$  on siis ka  $\tau_{\oplus}$  eralduv topoloogia. Lause 11.13 põhjal on alamruum  $X_{\gamma}$  kinnine topoloogias  $\tau_{\Pi}$ , ammugi siis tugevamas topoloogias  $\tau_{\oplus}$ . ■

**Lause 13.8.** *Olgu otsesumma  $(X_0, \tau_{\oplus})$  eralduv LKR. Alamhulk  $E \subset X_0$  on tõkestatud ruumis  $X_0$  parajasti siis, kui ta sisaldub ruumide  $X_{\gamma}$  tõkestatud alamhulkade mingis lõplikus otsesummast.*

**Tõestus. Tarvilikkus.** Olgu  $E \subset X_0$   $\tau_{\oplus}$ -tõkestatud. Kuna  $\pi_{\gamma} : (X_0, \tau_{\oplus}) \rightarrow (X_{\gamma}, \tau_{\gamma})$  on pidev kujutus iga  $\gamma \in \Gamma$  korral, siis  $\pi_{\gamma}(E)$  on  $\tau_{\gamma}$ -tõkestatud. Näitame, et  $\pi_{\gamma}(E) \neq \{0\}$  ainult lõpliku arvu indeksite  $\gamma$  puhul, siis, pidades silmas, et  $E \subset \bigoplus_{\gamma \in \Gamma} \pi_{\gamma}(E)$ , saamegi väite.

Oletame vastuväiteliselt, et  $\pi_{\gamma}(E) \neq \{0\}$  lõpmata paljude indeksite  $\gamma$  korral. Siis saame valida indeksite jada  $(\gamma_n)$  ja elementide jada  $(x_n)$  omadusega  $x_n \in \pi_{\gamma_n}(E) \setminus \{0\}$ . Kuna LKR-d  $X_{\gamma}$  on eralduvad (vrd. lause 13.7), siis leiduvad absoluutsest kumerad nulliumbrused  $U_{\gamma_n} \subset X_{\gamma_n}$  omadusega  $x_n \notin nU_{\gamma_n}$ . Võtame  $U_{\gamma} := X_{\gamma}$ , kui  $\gamma \neq \gamma_n$ , ning moodustame  $\tau_{\oplus}$ -nulliumbruse  $U := \text{absconv} \bigcup_{\gamma \in \Gamma} j_{\gamma}(U_{\gamma})$ . Kuna  $\pi_{\gamma_n}(U) \subset U_{\gamma_n}$  (põhjendada!)  $\blacksquare$ , siis  $nU$  ei sisalda hulka  $E$  ühegi  $n$  korral. See on vastuolus eeldusega hulga  $E$  tõkestatusest.

**Piisavus.** Kui  $E \subset E_{\gamma_1} + \dots + E_{\gamma_n}$ , (täpsemalt  $E \subset j_{\gamma_1}(E_{\gamma_1}) + \dots + j_{\gamma_n}(E_{\gamma_n})$ ), kus  $E_{\gamma_k}$  on tõkestatud alamhulk ruumis  $X_{\gamma_k}$  iga  $k = 1, \dots, n$  korral, siis  $E$  on tõkestatud lõplikus otsesummast  $\bigoplus_{k=1}^n X_{\gamma_k}$  ning seega ka ruumis  $(X_0, \tau_{\oplus})$ . ■

**Järeldus 13.9.** *Eralduvas topoloogilises otsesummast  $(X_0, \tau_{\oplus})$  on kinnine alamhulk  $E$  kompaktne parajasti siis, kui ta sisaldub ruumide  $X_{\gamma}$  kompaktsete alamhulkade mingis lõplikus summas.*

**Tõestus. Tarvilikkus.** Olgu  $E$  kompaktne alamhulk otsesummast  $(X_0, \tau_{\oplus})$ . Nagu lause 13.8 tõestuses selgus, on  $E$  sel juhul lõpliku arvu projektsioonide  $\pi_{\gamma}(E)$  otsesumma kinnine alamhulk, seejuures on  $\pi_{\gamma}(E)$  kompaktsed hulgad.

**Piisavus** tuleneb sellest, et kompaktsete alamhulkade lõplik summa topoloogilises vektorruumis ja kompaktse hulga kinnine alamhulk on kompaktsed. ■

**Otsekorrutise ja otsesumma mõistete duaalsus** ilmneb järgmises teoreemis.

**Teoreem 13.10.** (a) *Topoloogilise otsesumma  $(X_0, \tau_{\oplus})$  kaasruum  $(X_0)'$  on algebraliselt isomorfne kaasruumide  $(X_{\gamma})'$  otsekorrutisega, s.t.  $(X_0, \tau_{\oplus})' = \prod_{\gamma \in \Gamma} (X_{\gamma})'$ .*

(b) *Topoloogilise otsekorrutise  $(X, \tau_{\Pi})$  kaasruum  $X'$  on algebraliselt isomorfne kaasruumide  $(X_{\gamma})'$  otsesummaga, s.t.  $(X, \tau_{\Pi})' = \bigoplus_{\gamma \in \Gamma} (X_{\gamma})'$ .*

**Tõestus.** (a) Lause 12.4 kohaselt on lineaarne funktsionaal  $f : X_0 \rightarrow \mathbb{K}$  pidev parajasti siis, kui tema ahendid  $f_{\gamma} := f|_{j_{\gamma}(X_{\gamma})} = f \circ j_{\gamma}$  on pidevad iga  $\gamma \in \Gamma$  puhul. Defineerime kujutuse

$$T : (X_0)' \rightarrow \prod_{\gamma \in \Gamma} (X_{\gamma})', \quad f \mapsto (f_{\gamma}),$$

tänu kujutuste  $j_\gamma$  lineaarsusele on see lineaarne. Kui  $(g_\gamma) \in \prod_{\gamma \in \Gamma} (X_\gamma)'$  on fikseeritud, defineerime funktsionaali

$$g: X_0 \rightarrow \mathbb{K}, \quad x \mapsto \sum_{\gamma \in \Gamma} g_\gamma(x_\gamma)$$

(see summa sisaldab lõpliku arvu nullist erinevaid liidetavaid), siis  $g \in (X_0)'$  ja  $T(g) = (g_\gamma)$ , niisiis on  $T$  surjektiivne kujutus. Näitame, et  $T$  on üksühene. Olgu  $T(f) = 0$ . Kui oletada vastuväiteliselt, et  $f \neq 0$ , siis mingite  $\gamma_0 \in \Gamma$  ja  $a \in X_{\gamma_0}$  korral  $f_{\gamma_0}(a) = f(j_{\gamma_0}(a)) \neq 0$  (selgitada!)☒. See on vastuolus eeldusega  $T(f) = 0$ . Kokkuvõttes korraldab  $T$  isomorfismi vektorruumide  $(X_0)'$  ja  $\prod_{\gamma \in \Gamma} (X_\gamma)'$  vahel.

(b) Kui  $f \in X'$ , siis

$$f_\gamma := f|_{j_\gamma(X_\gamma)} = f \circ j_\gamma \in (X_\gamma)' \quad (\gamma \in \Gamma)$$

(selgitada!)☒, seega on määratud lineaarne kujutus

$$T: X' \rightarrow \prod_{\gamma \in \Gamma} (X_\gamma)', \quad f \mapsto (f_\gamma).$$

Näitame, et  $T(X') \subset \bigoplus_{\gamma \in \Gamma} (X_\gamma)'$ . Olgu  $f \in X'$ , siis leidub  $U \in \mathfrak{B}_X$ , milles  $f$  on tõkestatud.

Seejuures

$$U = \bigcap_{\gamma \in H} (\pi_\gamma)^{-1}(V_\gamma),$$

kus  $H \subset \Gamma$  on lõplik ning  $V_\gamma \in \mathfrak{B}_{X_\gamma}$ . Kuna hulk  $(\pi_\gamma)^{-1}(V_\gamma)$  on kujul

$$\{(x_\nu)_{\nu \in \Gamma} \mid x_\gamma \in V_\gamma, x_\nu \in X_\gamma \ (\nu \neq \gamma)\},$$

siis leidub vaid lõplik arv indekseid  $\gamma$ , mille korral  $f_\gamma \neq 0$  (selgitada!)☒, s.t.

$$T(f) = (f_\gamma)_{\gamma \in \Gamma} \in \bigoplus_{\gamma \in \Gamma} (X_\gamma)'.$$

Lihtne on veenduda, et kujutus  $T: X' \rightarrow \bigoplus_{\gamma \in \Gamma} (X_\gamma)'$  on üksühene (kontrollida!)☒, surjektiivsuse põhjenduseks võtame suvalise  $(g_\gamma)_{\gamma \in \Gamma} \in \bigoplus_{\gamma \in \Gamma} (X_\gamma)'$  ja defineerime  $g := \sum_{\gamma \in \Gamma} g_\gamma \circ \pi_\gamma$ , siis  $g \in X'$  (selgitada!)☒. Kuna seejuures  $g \circ j_\gamma = g_\gamma$  (kontrollida!)☒, siis  $T(g) = (g_\gamma)$ .

Kokkuvõttes oleme näidanud, et  $T$  on isomorfism vektorruumide  $(X, \tau_\Pi)'$  ja  $\bigoplus_{\gamma \in \Gamma} (X_\gamma)'$  vahel. ■

Olgu  $\langle X_\gamma, Y_\gamma \rangle$ , kus  $\gamma \in \Gamma$ , vektorruumide duaalsed paarid, moodustame otsekorrutise  $X := \prod_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma$  ja otsesumma  $Y_0 := \bigoplus_{\gamma \in \Gamma} Y_\gamma$ . Bilineaarse funktsionaaliga

$$B: X \times Y_0 \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, f) \mapsto \sum_{\gamma \in \Gamma} f_\gamma(x_\gamma)$$

(peame silmas, et see summa sisaldab lõpliku arvu nullist erinevaid liidetavaid) moodustavad  $X$  ja  $Y_0$  duaalse paari (kontrollida!)☒. Kehtib järgmine lause.

**Lause 13.11.** Nõrk topoloogia  $\sigma(X, Y_0)$  on nõrkade topoloogiate  $\sigma(X_\gamma, Y_\gamma)$  korrutistopolooogia.

**Tõestus.** Olgu  $\xi$  mingi selline lokaalselt kumer topoloogia vektorruumis  $X$ , mille puhul lineaarne funktsionaal

$$f: X \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto \sum_{\gamma \in \Gamma} u_\gamma(x_\gamma)$$

on pidev iga  $(u_\gamma) \in Y_0$  korral. Vaadeldavas summas on lõplik arv nullist erinevaid liidetavaid, seega on  $f$  pidev parajasti siis, kui  $u_\gamma \circ \pi_\gamma: (X, \xi) \rightarrow \mathbb{K}$  on pidev iga  $u_\gamma \in Y_\gamma$  ja  $\gamma \in \Gamma$  korral. Teisisõnu,

$$f \in (X, \xi)' \Leftrightarrow [\pi_\gamma: (X, \xi) \rightarrow (X_\gamma, \sigma(X_\gamma, Y_\gamma)) \text{ on pidev iga } \gamma \in \Gamma \text{ korral}].$$

Järelikult  $\xi = \sigma(X, Y_0)$  parajasti siis, kui  $\xi$  on nõrgim lokaalselt kumer topoloogia, mille suhtes kõik projektsioonid  $\pi_\gamma$  on pidevad, s.t.  $\xi$  on on nõrkade topoloogiate  $\sigma(X_\gamma, Y_\gamma)$  korrutistopolooogia. ■

### 13.3 Ranged induktiivsed piirid

Olgu  $X$  vektorruum ning olgu  $(X_n)$  tema vektoralamruumide selline jada, mis rahuldab tingimus

$$X_n \subsetneq X_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}) \quad \text{ja} \quad X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n.$$

Seejuures eeldame veel, et  $(X_n, \tau_n)$  on LKR ning

$$\tau_n = \tau_{n+1}|_{X_n} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Teiste sõnadega, me eeldame, et  $(X_n, \tau_n)$  on LKR-i  $(X_{n+1}, \tau_{n+1})$  alamruum. Olgu  $\tau_{\text{ind}}$  LKR-de  $(X_n, \tau_n)$  ja sisestustega  $i_n: X_n \rightarrow X$  määratud induktiivse piiri topoloogia vektorruumis  $X$ , s.o. tugevaim lokaalselt kumer topoloogia, mille korral sisestused  $i_n$  on pidevad. Sellistel eeldustel nimetatakse LKR-i  $(X, \tau_{\text{ind}})$  alamruumide  $(X_n, \tau_n)$  rangeks induktiivseks piiriks.

Topoloogia  $\tau_{\text{ind}}$  **omaduste uurimiseks** vajame järgmist lemmat.

**Lemma 13.12.** Olgu  $X_0$  LKR-i  $X$  alamruum. Alamruumi  $X_0$  iga absoluutsest kumera nulliumbruse  $V$  jaoks leidub ruumis  $X$  absoluutsest kumer nulliumbrus  $U$  omadusega  $V = U \cap X_0$ . Kui  $x_0 \in X \setminus \overline{X_0}$ , siis saab  $U$  valida nii, et  $x_0 \notin U$ .

**Tõestus.** Kuna  $X_0$  on LKR-i  $X$  alamruum, siis saab leida ruumis  $X$  absoluutsest kumera nulliumbruse  $W$  omadusega  $W \cap X_0 \subset V$ . Tähistame  $U := \text{absconv}(V \cup W)$ , see on nulliumbrus ruumis  $X$  ja  $V \subset U \cap X_0$ . Vastupidise sisalduvuse tõestamiseks fikseerime suvalise  $z = \lambda x + \mu y \in U \cap X_0$ , kus  $x \in V$ ,  $y \in W$  ja  $|\lambda| + |\mu| \leq 1$ . Kui  $\mu = 0$ , siis  $z = \lambda x \in V$  hulga  $V$  tasakaalustatuse tõttu. Kui  $\mu \neq 0$ , saame, et  $y = \frac{1}{\mu}z - \frac{\lambda}{\mu}x \in X_0 - X_0 = X_0$ , seega  $y \in W \cap X_0 \subset V$ , järelikult  $z \in V$ .

Kui  $x_0 \in X \setminus \overline{X_0}$ , siis võib nulliumbruse  $W$  valida nii, et  $(x_0 - W) \cap X_0 = \emptyset$ , seega  $x_0 \notin U$ . Tõepoolest, seosest  $x_0 \in U$  tuleneks, et  $x_0 = \lambda x + \mu y$ , kus  $x \in V$ ,  $y \in W$  ning  $|\lambda| + |\mu| \leq 1$ , kuid siis  $x_0 - \mu y = \lambda x \in X_0$ , mis on võimatu, sest  $x_0 - \mu y \in x_0 - W$ .

Lemma on tõestatud. ■

**Lause 13.13.** *LKR-de  $(X_n, \tau_n)$  range induktiivse piiri topoloogia  $\tau_{\text{ind}}$  indutseerib iga alamruumis  $X_n$  selle esialgse topoloogia  $\tau_n$ . Teisisõnu,  $\tau_{\text{ind}}|_{X_n} = \tau_n$  iga  $n \in \mathbb{N}$  puhul.*

**Tõestus.** Definitsiooni kohaselt  $\tau_{\text{ind}}|_{X_n} \subset \tau_n$ , tõestame vastupidise sisalduvuse. Olgu fikseeritud  $n \in \mathbb{N}$  korral  $V_n$  suvaline absoluutsest kumer nulliumbrus ruumis  $X_n$ , näitame, et on olemas  $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbrus  $U \subset X$  omadusega  $U \cap X_n = V_n$ .

Kuna  $\tau_n = \tau_{n+1}|_{X_n}$ , siis lemma 13.12 järgi leidub absoluutsest kumer  $\tau_{n+1}$ -nulliumbrus  $V_{n+1} \subset X_{n+1}$  omadusega  $V_{n+1} \cap X_n = V_n$ . Edasi leiame absoluutsest kumera  $\tau_{n+2}$ -nulliumbruse  $V_{n+2} \subset X_{n+2}$ , et  $V_{n+2} \cap X_n \subset V_{n+2} \cap X_{n+1} = V_{n+1}$  jne. Induktsioonimeetodil on võimalik suvalise  $r \in \mathbb{N}$  puhul defineerida absoluutsest kumer  $\tau_{n+r}$ -nulliumbrus  $V_{n+r} \subset X_{n+r}$  omadusega  $V_{n+r+1} \cap X_{n+r} = V_{n+r}$ . Tähistame  $U := \bigcup_{r=0}^{\infty} V_{n+r}$ , siis  $U$  on absoluutsest kumer neelav alamhulk, seejuures  $U \cap X_{n+r} = V_{n+r}$ , mistõttu  $U \cap X_{n+r}$  on  $\tau_{n+r}$ -nulliumbrus iga  $r \geq 0$  korral. Seega  $U$  on  $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbrus (vrd. lause 12.1). ■

Erinevalt üldistest induktiivsetest piiridest on **eralduvus range induktiivse piiri topoloogia suhtes pärandatav omadus**.

**Lause 13.14.** *Kui  $X_n$  on iga  $n \in \mathbb{N}$  korral eralduv LKR, siis  $(X, \tau_{\text{ind}})$  on eralduv.*

**Tõestus.** Rakendame lauset 2.7. Olgu  $x \in X \setminus \{0\}$ , siis  $x \in X_n$  mingi  $n$  korral ja leidub selline  $\tau_n$ -nulliumbrus  $V_n \subset X_n$ , et  $x \notin V_n$ . Nagu me lause 13.13 tõestuses veendusime, leidub  $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbrus  $U \subset X$  omadusega  $U \cap X_n = V_n$ , seejuures  $x \notin U$ . ■

Kui  $E$  on tõkestatud alamhulk LKR-s  $X_n$  mingi  $n$  korral, siis  $E \subset X$  ja on lause 13.13 põhjal  $\tau_{\text{ind}}$ -tõkestatud. Nagu näitab järgnev lause, on kõik  $\tau_{\text{ind}}$ -tõkestatud hulgad ruumis  $X$  just niimoodi kirjeldatavad.

**Lause 13.15.** *Olgu  $(X, \tau_{\text{ind}})$  selliste eralduvate LKR-de  $X_n$  range induktiivne piir, mille puhul  $X_n$  on ruumi  $X_{n+1}$  kinnine alamruum iga  $n \in \mathbb{N}$  korral. Kui alamhulk  $E \subset X$  on  $\tau_{\text{ind}}$ -tõkestatud, siis sisaldub ta ruumis  $X_n$  mingi  $n$  korral ja on selles ruumis  $X_n$  tõkestatud.*

**Tõestus.** Oletame vastuväiteliselt, et  $\tau_{\text{ind}}$ -tõkestatud alamhulk  $E \subset X$  ei sisaldu üheski ruumis  $X_n$ . Siis saab leida hulga  $E$  elementide jada  $(y_n)$  ja indeksite jada  $(k_n)$  omadusega  $y_n \in X_{k_{n+1}} \setminus X_{k_n}$ . Kuna  $X_{k_n}$  on eralduv ja seejuures kinnine alamruum LKR-s  $X_{k_{n+1}}$ , siis vastavalt lemmale 13.12, saame iga  $n \in \mathbb{N}$  puhul induktiivselt moodustada absoluutsest kumerate hulkade jada  $(V_{k_n})$ , kus  $V_{k_n}$  on  $\tau_{k_n}$ -nulliumbrus,  $V_{k_{n+1}} \cap X_{k_n} = V_{k_n}$  ja  $y_n \notin nV_{k_{n+1}}$ . Tähistame  $U := \bigcup_{n=1}^{\infty} V_{k_n}$ , see on  $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbrus (vrd. lause 13.13 tõestus) ja  $\frac{1}{n}y_n \notin U$  iga  $n \in \mathbb{N}$  puhul (veenduda!)☒, mis on vastuolus eeldusega hulga  $E$   $\tau_{\text{ind}}$ -tõkestatusest. Tähendab,  $E$  sisaldub ruumis  $X_n$  mingi  $n$  korral. Kuna  $\tau_{\text{ind}}|_{X_n} = \tau_n$ , siis  $E$  on  $\tau_n$ -tõkestatud. ■

**Järeldus 13.16.** *Kui  $(X, \tau_{\text{ind}})$  on selliste eralduvate LKR-de  $X_n$  range induktiivne piir, mille puhul  $X_n$  on ruumi  $X_{n+1}$  kinnine alamruum iga  $n \in \mathbb{N}$  korral, siis ta ei ole metriseeruv.*

**Tõestus.** Olgu  $\{U_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  suvaline niisugune  $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbruste loenduv süsteem ruumis  $X$ , mille puhul  $U_{n+1} \subset U_n$ . Iga  $n \in \mathbb{N}$  korral valime elemendi  $x_n \in U_n \setminus X_n$ , niimoodi saame jada  $(x_n)$ , lause 13.15 järgi ei ole see  $\tau_{\text{ind}}$ -tõkestatud. Samal ajal on  $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  iga hulga  $U_n$  poolt neelatav, seega ei ole  $\{U_n \mid n \in \mathbb{N}\}$   $\tau_{\text{ind}}$ -nulliumbruste baas. Niisiis, ruumis  $(X, \tau_{\text{ind}})$  ei ole loenduvat nulliumbruste baasi, s.t. ta ei ole metriseeruv. ■

Me lõpetame selle artikli näitega funktsioniruumide rangest induktiivsest piirist. Eelnevalt märgime ilma tõestuseta, et täielike lokaalselt kumerate ruumide range induktiivne piir on alati täielik.

**Näide 13.1.** Olgu

$$X_n := \{x = x(t) \mid x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ on pidev ja } x(t) = 0 \text{ iga } t \in \mathbb{R} \setminus [-n, n] \text{ korral}\}$$

ning

$$\|x\|_\infty := \sup_{t \in \mathbb{R}} |x(t)| \quad (x \in X_n, n \in \mathbb{N}).$$

Normiga  $\|\cdot\|_\infty$  on  $X_n$  Banachi ruum. Moodustame kõigi hulgas  $\mathbb{R}$  defineeritud komplekssete funktsionide vektorruumis ühendi  $X := \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ , see on kõigi kompaktse kandjaga pidevate funktsionide  $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  vektorruum. Varustame selle induktiivse piiri topoloogiaga  $\tau_{\text{ind}}$  ja paneme tähele, et tegemist on range induktiivse piiriga, kus  $X_n$  on kinnine alamruum ruumis  $X_{n+1}$  (kontrollida!)\(\blacksquare\). Järelduse 13.16 ja näitele eelnenud märkuse kohaselt on  $(X, \tau_{\text{ind}})$  täielik mittemetriseeruv LKR. Alamhulk  $E \subset X$  on  $\tau_{\text{ind}}$ -tõkestatud parajasti siis, kui ta koosneb niisugustest funktsionidest, millel on ühine kompaktne kandja ja mis on ühtlaselt tõkestatud hulgas  $\mathbb{R}$ .

Vaatleme vektorruumis  $X$  normiga  $\|\cdot\|_\infty$  määratud topoloogiat  $\tau_\infty$ . Kuna ühikkujutus  $i: (X_n, \tau_n) \rightarrow (X, \tau_\infty)$  on iga  $n \in \mathbb{N}$  puhul pidev, siis ka  $i: (X, \tau_{\text{ind}}) \rightarrow (X, \tau_\infty)$  on pidev kujutus, s.t.  $\tau_{\text{ind}} \supset \tau_\infty$ . Paneme tähele, et  $\tau_\infty$ -tõkestatud alamhulk  $\{x \in X \mid \|x\|_\infty \leq 1\}$  ei ole  $\tau_{\text{ind}}$ -tõkestatud (põhjendada!)\(\blacksquare\), niisiis on  $\tau_{\text{ind}}$  rangelt tugevam topoloogiast  $\tau_\infty$ , kuigi mõlemad indutseerivad alamruumides  $X_n$  ühe ja sama topoloogia  $\tau_n$ .

Märgime, et selles näites vaadeldud LKR-i  $(X, \tau_{\text{ind}})$  kaasruum mängib olulist rolli mõõdu-teorias, tema elemente  $\mu \in (X, \tau_{\text{ind}})'$  nimetatakse *Radoni mõõtudeks* hulgas  $\mathbb{R}$ .

## 14 Topoloogiliste vektorruumide näiteid

Selles viimases peatükis tutvume mõnede olulisemate topoloogiliste vektorruumidega. See on lühike ja kirjeldav ülevaade, milles on sõnastatud vaid üksikud väited, kusjuures nende tõestused on enamasti vaid markeeritud, s.t. on esitatud vaid tõestuse skeem.

### 14.1 Lokaalselt tökestatud ruumid $L^p$ , kus $0 < p < 1$

Teatavasti nimetatakse lokaalselt tökestatuks selliseid TVR-e, milles on tökestatud nulliumbrus (vrd. art. 4.1). Kui  $U$  on tökestatud tasakaalus nulliumbrus TVR-s  $X$ , siis süsteem  $\{\frac{1}{n}U \mid n \in \mathbb{N}\}$  on nulliumbruste baas. Kui  $U$  on seejuures ka kumer ja kinnine, siis on tegemist normeeritud ruumiga, kus  $U$  on ühikkera. Me vaatleme näidet sellistest lokaalselt tökestatud TVR-dest, mis ei ole normeeruvad, s.t. ei ole lokaalselt kumerad.

Olgu  $0 < p < 1$ . Tähistame

$$L^p := L^p[0, 1] := \left\{ x = x(t) \mid x: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ on mõõtuv ja } N(x) := \int_0^1 |x(t)|^p dt < \infty \right\},$$

selle VR-i punktidena samastame funktsioonid, mis langevad kokku peaaegu kõikjal lõigus  $[0, 1]$ . Kuna suvaliste  $a, b \geq 0$  korral  $(a + b)^p \leq a^p + b^p$ , siis  $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$ , mistõttu seosega  $d(x, y) := N(x - y)$  on määratud nihke suhtes invariantne meetrika vektorruumis  $L^p$ . Veelgi enam, see meetriline ruum on täielik, selle fakti tõestuse jäätame siinkohal vahele.

Tähistame  $B_r := \{x \in L^p \mid N(x) < r\}$ , alamhulkade süsteem  $\{B_r \mid r > 0\} = \{rB_1 \mid r > 0\}$  on nulliumbruste baas metriseeruvas TVR-s  $L^p$ . Paneme tähele, et

$$x \in B_1 \Leftrightarrow \int_0^1 |x(t)|^p dt < 1 \Leftrightarrow \int_0^1 \left( r^{\frac{1}{p}} |x(t)| \right)^p dt < r \Leftrightarrow r^{\frac{1}{p}} x \in B_r \Leftrightarrow x \in \frac{1}{r^{\frac{1}{p}}} B_r,$$

seega

$$B_1 = \frac{1}{r^{\frac{1}{p}}} B_r \text{ iga } r > 0 \text{ korral,}$$

mis ütleb, et  $B_1$  on tökestatud nulliumbrus TVR-s  $L^p$ . Tähendab,  $L^p$  on iga  $0 < p < 1$  puhul lokaalselt tökestatud TVR.

**Lause 14.1.** *Kui  $0 < p < 1$ , siis TVR-s  $L^p$  on lahtisteks kumerateks alamhulkadeks vaid  $L^p$  ja  $\emptyset$ .*

**Tõestus.** Olgu  $V \subset L^p$  suvaline mittetühi lahtine kumer hulk. Võime eeldada, et  $0 \in V$  (vajaduse korral nihutame hulka  $V$ ), s.t.  $V$  on nulliumbrus ruumis  $L^p$ . Seega  $B_r \subset V$  mingi  $r > 0$  puhul. Olgu  $x \in L^p$  suvaline, leiame  $n \in \mathbb{N}$  omadusega  $n^{p-1}N(x) < r$ . Vastavalt arvule  $n$  fikseerime punktid  $t_0, \dots, t_n$  nii, et

$$1) 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1 \text{ ja}$$

$$2) \int_{t_{i-1}}^{t_i} |x(t)|^p dt = \frac{1}{n} N(x).$$

Sellise valiku võimalikkus tuleneb funktsiooni

$$I: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad I(s) := \int_0^s |x(t)|^p dt$$

pidevusest: tegemist on monotoonselt kasvava pideva funktsiooniga, see saavutab kõik väär-tused minimaalse väärtsuse 0 ja maksimaalse väärtsuse  $N(x)$  vahel, seega ka väärtsused  $\frac{i}{n}N(x)$ , kus  $i = 1, \dots, n$ . Seetõttu saab arvud  $t_0, \dots, t_n$  (üheselt) määratada.

Tähistame

$$z_i(t) := \begin{cases} nx(t), & \text{kui } t_{i-1} < t \leq t_i, \\ 0, & \text{kui } t \notin (t_{i-1}, t_i], \end{cases}$$

ja paneme tähele, et

$$N(z_i) = n^p \int_{t_{i-1}}^{t_i} |x(t)|^p dt = n^{p-1} N(x) < r,$$

s.t.  $z_i \in B_r \subset V$  iga  $i = 1, \dots, n$  korral. Kuna  $V$  on kumer hulk, siis

$$x = \frac{1}{n} (z_1 + \dots + z_n) \in V.$$

Me näitasime, et  $V = L^p$ . ■

Lausest 14.1 tuleneb järgmine tähelepanek.

**Lause 14.2.** *Olgu ( $0 < p < 1$ ). Kui  $(Z, \tau_Z)$  on mingi eralduv LKR, siis  $L(L^p, Z) = \{0\}$ . Erijuhul  $Z = \mathbb{K}$  saame, et  $(L^p)' = \{0\}$ , s.t. TVR-s  $L^p$  ei ole määratud ühtki mittetrviaalset pidevat lineaarset funktsionaali.*

**Tõestus.** Olgu  $W$  lahtine kumer nulliumbrus LKR-s  $Z$ . Kui  $A \in L(L^p, Z)$ , siis  $A^{-1}(W)$  on kumer lahtine hulk ruumis  $L^p$ , mis lause 14.1 kohaselt saab olla  $\emptyset$  või  $L^p$ . Ilmselt ei ole  $A^{-1}(W)$  tühi hulk, sest  $A(0) = 0 \in W$ , järelikult

$$A^{-1}(W) = L^p \text{ iga } \tau_Z\text{-nulliumbruse } W \text{ korral.}$$

Seega

$$\{0\} \subset A(L^p) \subset \bigcap \{W \mid W \in \mathfrak{B}_Z\} = \{0\}$$

(siin  $\mathfrak{B}_Z$  on mingi  $\tau_Z$ -nulliumbruste baas ning viimane võrdus kehtib tänu eeldusele ruumi  $Z$  eralduvusest), s.t.  $A(x) = 0$  iga  $x \in L^p$  korral. ■

## 14.2 Pidevate funktsioonide ruumid

Olgu  $\Omega \subset \mathbb{R}^m$  mittetühi lahtine hulk. Siis saab leida loenduva arvu kompaktseid mittetühje alamhulki  $K_n \subset \Omega$ , et

$$\Omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} K_n \text{ ja } K_n \subset \overset{\circ}{K}_{n+1},$$

kus  $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$  ja  $\overset{\circ}{K}_{n+1}$  on hulga  $K_{n+1}$  sisemus, s.t. tema sisepunktide hulk. Defineerime iga  $n \in \mathbb{N}_0$  korral

$$C(K_n) := \{x = x(t) \mid x: K_n \rightarrow \mathbb{K} \text{ on pidev}\},$$

see on Banachi ruum normiga

$$p_n(x) := \max \{|x(t)| \mid t \in K_n\}.$$

Edasi moodustame vektorruumi

$$C(\Omega) := \{x = x(t) \mid x: \Omega \rightarrow \mathbb{K} \text{ on pidev}\}$$

ja paneme tähele, et  $C(\Omega) \subset \bigcap \{C(K_n) \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ . Defineerime vektorruumis  $C(\Omega)$  lokaalselt kumera topoloogia poolnormide süsteemiga  $\{p_n|_{\Omega}\}_{n \in \mathbb{N}_0}$  ja märgime, et see eraldab punktid ruumis  $C(\Omega)$ . Nimelt, kui  $x \in C(\Omega) \setminus \{0\}$ , siis mingi  $t_0 \in \Omega$  korral  $x(t_0) \neq 0$  ning  $p_n(x) \geq |x(t_0)| > 0$ , kui  $t_0 \in K_n$ . Niisiis on  $C(\Omega)$  metriseeruv LKR, näitame, et ta on F-ruum.

Olgu  $(x_k)$  Cauchy jada ruumis  $C(\Omega)$ , s.t.

$$\forall n \in \mathbb{N}_0: p_n(x_k - x_l) = \max_{t \in K_n} |x_k(t) - x_l(t)| \rightarrow 0 \quad (k, l \rightarrow \infty).$$

Kuna  $(x_k)$  on Cauchy jada igas Banachi ruumis  $C(K_n)$ , siis

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 \exists z^{(n)} \in C(K_n): p_n(x_k - z^{(n)}) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

s.t.  $x_k(t) \rightarrow z^{(n)}(t)$  ühtlaselt hulgas  $K_n$ . Ühtlastest koonduvusest järeldub punktiviisi koonduvus iga  $t \in K_n$  ja  $n \in \mathbb{N}_0$  korral, seega punktiviisi koonduvus hulgas  $\Omega$ , seejuures

$$z^{(n)}(t) = z^{(n+1)}(t) \quad (t \in K_n, n \in \mathbb{N}_0).$$

Nii saame sellise pideva funktsiooni  $x: \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ , et  $x(t) := z^{(n)}(t)$ , kui  $t \in K_n$  ( $n \in \mathbb{N}_0$ ). Kuna  $\lim_{k \rightarrow \infty} p_n(x_k - x) = 0$  iga  $n \in \mathbb{N}_0$  korral, siis  $x_k \rightarrow x$  LKR-s  $C(\Omega)$ . Kokkuvõttes on  $C(\Omega)$  F-ruum.

### 14.3 Analüütiliste funktsioonide ruum

Olgu  $\Omega \subset \mathbb{C}$  lahtine mittetühi hulk komplekstasandil tähistame

$$H(\Omega) := \{x \in C(\Omega) \mid x: \Omega \rightarrow \mathbb{K} \text{ on analüütiline funktsioon}\}.$$

Meenutame, et kompleksmuutuja funktsiooni  $x$  nimetame analüütiliseks (ehk holomorfseks) piirkonnas  $\Omega$ , kui ta on selles piirkonnas diferentseeruv ehk kui ta on selle piirkonna iga punkti ümbruses esitatav astmerea summana. Kompleksmuutuja funktsioonide teoriast teame, et kui analüütiliste funktsioonide jada koondub ühtlaselt kompakteks alamhulgaks, siis ka piirvääruseks olev funktsioon on analüütiline. Sellest faktist järeldub, et  $H(\Omega)$  on kinnine alamruum F-ruumis  $C(\Omega)$ , niisiis on ka  $H(\Omega)$  F-ruum.

Topoloogiliste vektorruumide teorias nimetatakse *Monteli ruumiks* sellist tünniruumi, milles iga kinnine tõkestatud alamhulk on kompaktne. Selle omaduse, mida mõnikord nimetatakse ka Heine-Boreli omaduseks, seostamine Monteli nimega on põhjendatud asjaoluga, et F-ruumis  $H(\Omega)$  järeldub nimetatud omadus klassikalisest Monteli teoreemist, mille kohaselt alamhulk  $D \subset H(\Omega)$  on suhteliselt kompaktne parajasti siis, kui iga kinnise alamhulga  $F \subset \Omega$  puhul leidub selline  $M > 0$ , et  $|x(t)| \leq M$  kõikide  $x \in D$  ja  $t \in F$  korral.

## 14.4 Diferentseeruvate funktsioonide ruume

Olgu  $\Omega \subset \mathbb{R}^m$  lahtine mittetühi hulk, olgu kompakteks alamhulgad  $K_n$  fikseeritud nii nagu artiklis 14.2 ruumi  $C(\Omega)$  defineerimisel. Olgu  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$  vektor, mille koordinaadid saavad väärusti  $0, 1, 2, \dots$ , sellist vektorit nimetatakse *multiindeksiks*. Fikseeritud  $\alpha$  korral defineerime *diferentseerimisoperaatori*

$$D^\alpha := \left( \frac{\partial}{\partial t_1} \right)^{\alpha_1} \cdots \left( \frac{\partial}{\partial t_m} \right)^{\alpha_m},$$

arvu

$$|\alpha| := \sum_{k=1}^m \alpha_k$$

nimetatakse selle operaatori *astmeksi*. Operaatori  $D^\alpha$  rakendamiseks  $m$  muutuja funktsioonile  $x = x(t) = x(t_1, \dots, t_m)$  tuleb muutuja  $t_k$  järgi võtta  $\alpha_k$ -järku osatuletis. Näiteks, kui  $m = 2$ , siis indeksi  $\alpha = (2, 3)$  korral  $D^\alpha x = \frac{\partial^5 x}{\partial(t_1)^2 \partial(t_2)^3}$ . Kui  $|\alpha| = 0$ , siis  $D^\alpha x = x$ .

Tähistame

$$C^\infty(\Omega) := \{x = x(t) \mid x: \Omega \rightarrow \mathbb{K}, D^\alpha x \in C(\Omega) \text{ iga } \alpha \text{ korral}\}$$

ja defineerime selles vektorruumis poolnormid

$$p_N(x) := \max \{|D^\alpha x(t)| \mid t \in K_N, |\alpha| \leq N\} \quad (N \in \mathbb{N}_0). \quad (14.1)$$

Märgime, et kuna funktsioonid  $D^\alpha x$  on kompakteks hulgates  $K_N$  pidevad, siis on nad tõkestatud ning maksimum eelnevas seoses (14.1) tõepoolest eksisteerib. Teiseks paneme tähele, et poolnormide süsteem  $\{p_N\}_{N \in \mathbb{N}_0}$  eraldab punktid ruumis  $C^\infty(\Omega)$ . Nimelt, kui  $x \in C^\infty(\Omega) \setminus \{0\}$ , siis  $x(t_0) \neq 0$  mingi  $t_0 \in \Omega$  korral, ja  $p_N(x) \geq |x(t_0)| > 0$  niisuguse  $N$  puhul, mil  $t_0 \in K_N$ . Niisiis, poolnormide süsteem  $\{p_N\}_{N \in \mathbb{N}_0}$  määrab vektorruumis  $C^\infty(\Omega)$

metriseeruva lokaalselt kumera topoloogia. Näitame, et see on täielik.

Olgu  $(x_k)$  Cauchy jada ruumis  $C^\infty(\Omega)$ , siis iga  $N \in \mathbb{N}_0$  puhul leidub selline  $M_N \in \mathbb{N}$ , et

$$k, l \geq M_N \Rightarrow p_N(x_k - x_l) < \frac{1}{N},$$

s.t.

$$|D^\alpha x_k(t) - D^\alpha x_l(t)| < \frac{1}{N} \quad (t \in K_N, |\alpha| \leq N).$$

Seega iga fikseeritud  $\alpha$  puhul on  $(D^\alpha x_k(t))_{k \in \mathbb{N}_0}$  Cauchy jada ühtlase koonduvuse mõttes kompakteks alamhulgates  $K_N$ . Teisisõnu,  $(D^\alpha x_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$  on Cauchy jada Banachi ruumis  $C(K_N)$ , järelikult eksisteerib  $\lim_{k \rightarrow \infty} D^\alpha x_k =: z_\alpha$  ruumis  $C(K_N)$  ehk

$$\lim_{k \rightarrow \infty} D^\alpha x_k(t) = z_\alpha(t) \text{ ühtlaselt hulgates } K_N.$$

Vaatleme erijuhtu  $|\alpha| = 0$ , siis  $x_k(t) \rightarrow z_0(t)$ . Kuna  $D^\alpha x_k \in C(K_N)$  ja  $D^\alpha x_k(t) \rightarrow z_\alpha(t)$  ühtlaselt hulgates  $K_N$ , siis saame, et

$$z_0 \in C^\infty(\Omega), D^\alpha z_0 = z_\alpha \text{ ning } x_k \rightarrow z_0 \text{ ruumis } C^\infty(\Omega).$$

Me oleme tõestanud, et  $C^\infty(\Omega)$  on F-ruum.

Osutub, et  $C^\infty(\Omega)$  on Monteli ruum. Selle väite tõestamiseks vajame me järgmist lemmat.

**Lemma 14.3.** Olgu  $F$ -ruumi  $(X, \tau)$  topoloogia määratud poolnormide süsteemiga  $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ , kus  $p_1(x) \leq p_2(x) \leq \dots$  iga  $x \in X$  korral, ja olgu  $(r_j)$  rangelt kasvav naturaalarvude jada. Kui iga hulgas  $A \subset X$ , mis on poolnormi  $p_{r_{j+1}}$  suhtes tõkestatud, leidub poolnormi  $p_{r_j}$  suhtes Cauchy jada, siis  $X$  on Monteli ruum.

**Tõestus.** Olgu  $A \subset X$   $\tau$ -tõkestatud alamhulk, näitame, et ta on suhteliselt kompaktne. Kuna  $A$  on iga poolnormi  $p_n$  suhtes tõkestatud, siis leidub temas eelduse kohaselt mingi jada  $(x_{1k})_{k \in \mathbb{N}}$ , mis poolnormi  $p_{r_2}$  suhtes on Cauchy jada. See jada on  $p_{r_3}$ -tõkestatud, seega saab temast eraldada osajada  $(x_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$ , mis  $p_{r_2}$  suhtes on Cauchy jada. Nii jätkates saame jadade süsteemi

$$\begin{aligned} & (x_{11}, x_{12}, x_{13}, \dots) \\ & (x_{21}, x_{22}, x_{23}, \dots) \\ & \quad \cdots \\ & (x_{n1}, x_{n2}, x_{n3}, \dots) \\ & \quad \cdots \end{aligned},$$

kus  $(x_{nk})_{k \in \mathbb{N}}$  on  $p_{r_n}$  suhtes Cauchy jada. Moodustame diagonaaljada  $(x_{nn})$ , see on Cauchy jada iga poolnormi  $p_{r_j}$  suhtes, seega kõikide poolnormide  $p_n$  suhtes, niisiis  $\tau$ -Cauchy jada ja seega koonduv. Kokkuvõttes on  $A$  suhteliselt kompaktne hulk. ■

**Lause 14.4.**  $F$ -ruum  $C^\infty(\Omega)$  on Monteli ruum.

**Tõestus.** Olgu  $A \subset C^\infty(\Omega)$  selline alamhulk, mis on poolnormi  $p_N$  suhtes tõkestatud, s.t. leidub selline  $M_N > 0$ , et  $p_N(x) \leq M_N$  iga  $x \in A$  korral. Näitame, et  $A$  on poolnormi  $p_{N-1}$  suhtes kompaktne. Suvalise  $\alpha$  puhul, mis rahuldab tingimust  $|\alpha| \leq N - 1$ , on  $D^\alpha x$  hulgas  $K_{N-1}$  pidevalt diferentseeruv funktsioon. Siis

$$|D^\alpha x(t) - D^\alpha x(t')| \leq M_N \|t - t'\|_{\mathbb{R}^m} \quad (t, t' \in K_{N-1} \subset \mathbb{R}^m),$$

siit tuleneb hulga  $\{D^\alpha x \mid x \in A\}$  võrdpidevus hulgas  $K_{N-1}$ : iga  $\varepsilon > 0$  korral valime  $\delta := \frac{\varepsilon}{M_N}$ , siis

$$\|t - t'\|_{\mathbb{R}^m} < \delta \Rightarrow |D^\alpha x(t) - D^\alpha x(t')| \leq M_N \delta = \varepsilon \text{ iga } x \in A \text{ puhul.}$$

Samal ajal on hulk  $\{D^\alpha x \mid x \in A\}$  hulgas  $K_{N-1}$  ühtlaselt tõkestatud, seega Arzela-Ascoli teoreemi kohaselt ruumis  $C(K_{N-1})$  suhteliselt kompaktne. Igast elementide jadast  $(D^\alpha x_k)$ , kus  $x_k \in A$  ( $k \in \mathbb{N}$ ), saab eraldada ruumis  $C(K_{N-1})$  koonduva osajada, poolnormi  $p_{N-1}$  suhtes on see Cauchy jada. Lemma 14.3 kohaselt on  $C^\infty(\Omega)$  Monteli ruum. ■

Tähistame antud kompaktse hulga  $K \subset \Omega$  puhul

$$\mathcal{D}_K := \{x \in C^\infty(\Omega) \mid \text{supp } x \subset K\}.$$

Osutub, et tegemist on  $F$ -ruumi  $C^\infty(\Omega)$  kinnise alamruumiga. Tõepoolest, kui defineerida lineaarsed funktsioonid

$$f_t: C^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{K}, \quad x \mapsto x(t) \quad (t \in \Omega),$$

siis seosest  $|x(t)| \leq p_N(x)$ , mis kehtib iga  $t \in K_N$  korral, tuleneb funktsiooni  $f_t$  pidevus. Pidevuse tõttu on  $f_t^{-1}(\{0\})$  kinnine hulk, seega on ka  $\mathcal{D}_K = \bigcap \{f_t^{-1}(\{0\}) \mid t \in \Omega \setminus K\}$  kinnine ruumis  $C^\infty(\Omega)$ .

## 14.5 Distributsioonid

Olgu  $\Omega \subset \mathbb{R}^m$  ja  $K_n \subset \Omega$  fikseeritud nii nagu eespool. Tähistame

$$\begin{aligned}\mathcal{D}(\Omega) &:= \{x \in C^\infty(\Omega) \mid \text{supp } x \text{ on kompaktne hulgas } \Omega\} \\ &= \bigcup \{\mathcal{D}_K \mid K \subset \Omega \text{ on kompaktne}\}\end{aligned}$$

ja defineerime selles vektorruumis poolnormide süsteemi  $(q_N)_{N \in \mathbb{N}_0}$  seostega

$$q_N(x) := \max \{|D^\alpha x(t)| \mid t \in \Omega, |\alpha| \leq N\}. \quad (14.2)$$

See süsteem eraldab punktid vektorruumis  $\mathcal{D}(\Omega)$  ja määrab metriseeruva lokaalselt kumera topoloogia, mille tähelepanuväärseks omaduseks on, et igas alamruumis  $\mathcal{D}_K$  indutseerib ta selle loomuliku F-topoloogia, mida me järgnevas tähistame  $\tau_K$ . Kontrollime seda.

Iga kompaktse alamhulga  $K \subset \Omega$  korral leidub niisugune  $N_0$ , et  $K \subset K_N$  suvalise  $N \geq N_0$  puhul, siis  $q_N(x) = p_N(x)$  iga  $x \in \mathcal{D}_K$  korral (vrd. (14.1)). Kuna  $q_N(x) \leq q_{N+1}(x)$  ja  $p_N(x) \leq p_{N+1}(x)$ , siis vastava topoloogia määramisks ruumis  $\mathcal{D}_K$  piisab poolnormidest  $q_{N_0}, q_{N_0+1}, \dots$  ning vastavalt  $p_{N_0}, p_{N_0+1}, \dots$  Siit on selge, et alamruumis  $\mathcal{D}_K$  langeb  $\mathcal{D}(\Omega)$  poole indutseeritud topoloogia kokku tema F-topoloogiaga  $\tau_K$ .

Poolnormidega (14.2) määratud topoloogias on  $\mathcal{D}(\Omega)$  küll metriseeruv, kuid ei ole täielik. Toome lihtsa kontranäite juhul  $m = 1$  ja  $\Omega = \mathbb{R}$ . Võtame sellise funktsiooni  $x \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , et  $\text{supp } x = [0, 1]$  ja  $x(t) > 0$ , kui  $t \in (0, 1)$ , ja defineerime

$$z_n(t) := x(t-1) + \frac{1}{2}x(t-2) + \dots + \frac{1}{n}x(t-n).$$

Jada  $(z_n)$  on poolnormide  $q_N$  suhtes Cauchy jada (kontrollida!)☒, kuid tema piirfunktsiooni kandja ei ole kompaktne.

Määrame vektorruumis  $\mathcal{D}(\Omega)$  uue topoloogia. Olgu  $\Gamma$  kõigi selliste absoluutsest kumerate alamhulkade  $W \subset \mathcal{D}(\Omega)$  süsteem, et  $W \cap \mathcal{D}_K$  on  $\tau_K$ -lahtine iga kompaktse alamhulga  $K \subset \Omega$  korral. See süsteem on teatava lokaalselt kumera topoloogia  $\tau$  nulliumbruste (pre)baas (lihtne on kontrollida, et iga  $W \in \Gamma$  on neelav). Saab näidata, et selles topoloogias on iga Cauchy jada koonduv. See ja mitmed teised topoloogia  $\tau$  tähelepanuväärsed omadused tulenevad asjaolust, et ta on alamruumide süsteemiga  $\{\mathcal{D}_K\}$  ja sisestuskujutustega  $i_K: \mathcal{D}_K \rightarrow \mathcal{D}(\Omega)$  defineeritud induktiivse piiri topoloogia.

**Definitsioon.** Pidevaid lineaarseid funktsionaale LKR-s  $(\mathcal{D}(\Omega), \tau)$  (s.t. kaasruumi  $(\mathcal{D}(\Omega), \tau)'$  elemente) nimetatakse *distributsioonideks* ehk *üldistatud funktsioonideks*.

Distributsioonide teooria on oluliselt avardanud funktsiooni mõistet. Idee ja motiivid paremaks mõistmiseks vaatleme jälle juhtu  $m = 1$  ja  $\Omega = \mathbb{R}$ . Funktsiooni  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$  nimetaakse lokaalselt integreeruvaks, kui ta on (Lebesgue'i mõttes) mõõtuv ja  $\int_K |f(t)| dt < \infty$  iga kompaktse alamhulga  $K \subset \mathbb{R}$  korral. Iga lokaalselt integreeruva funktsiooni  $f$  ja  $x \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  korral eksisteerib  $\int_{\mathbb{R}} f(t) x(t) dt$ , seejuures määrab see integraal funktsiooni  $f$  üheselt peaaegu kõikjal. Kui  $f$  on pidevalt diferentseeruv funktsioon, siis (tänu ositi integreerimise reeglile) kehtib võrdus

$$\int_{\mathbb{R}} f'(t) x(t) dt = - \int_{\mathbb{R}} f(t) x'(t) dt \text{ iga } x \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \text{ korral.} \quad (14.3)$$

Veelgi enam, kui  $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ , siis

$$\int_{\mathbb{R}} f^{(k)}(t) x(t) dt = (-1)^k \int_{\mathbb{R}} f(t) x^{(k)}(t) dt \quad (x \in \mathcal{D}(\mathbb{R})). \quad (14.4)$$

Integraalid paremal pool võrdusmärki seostes (14.3) ja (14.4) eksisteerivad teataavad lineaarsed funktsionaalid ruumis  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$  ka sel juhul, kui  $f$  ei ole diferentseeruv. Teisisõnu, me võime suvalisele lokaalselt integreeruvale funktsioonile  $f$  seada vastavusse ruumis  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$  määratud lineaarse funktsionaali  $\varphi^{(k)}$ , kus  $\varphi^{(k)}(x) := (-1)^k \int_{\mathbb{R}} f(t) x^{(k)}(t) dt$  iga  $k = 1, 2, \dots$  puhul. Seda funktsionaali võib interpreteerida funktsiooni  $f$   $k$ -ndat järku tuletisena teatavas üldisemas tähenduses. Seejuures funktsioonile  $f$  endale (s.o. 0-ndat järku tuletisele) vastab funktsionaal  $\varphi$ , kus  $\varphi(x) := \int_{\mathbb{R}} f(t) x(t) dt$ . Distributsionideks on eelpool toodud definitsiooni põhjal need funktsionaalid  $\varphi$ , mis on pidevad. Valem (14.3) sisaldab ka ideed, kuidas defineerida distributsioonide diferentseeruvus, ilmselt on mõistlik defineerida distributsiooni  $\varphi$  tuletis seosega  $\varphi'(x) := -\varphi(x')$ , kus  $x \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ .

## 14.6 Jadaruumid

Nagu eespool, tähistame tähega  $\omega$  kõigi arvjadade  $x = (x_k)$  vektorruumi, tähega  $\varphi$  tema alamruumi, mis koosneb kõigist lõplikest jadadest, täpselt:

$$x \in \varphi \Leftrightarrow [\exists k_0 \in \mathbb{N}: k \geq k_0 \Rightarrow x_k = 0].$$

Lihtne on näha, et  $\varphi = \text{span}\{e^k \mid k \in \mathbb{N}\}$ , kus  $e^k := (\delta_{ki})_{i \in \mathbb{N}}$ . Eespool (vt. näide 4.3) me veendusime, et  $(\omega, \tau_\omega)$  on F-ruum, kui temas topoloogia  $\tau_\omega$  määratakse poolnormide süsteemiga  $\{r_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ , kus  $r_k(x) := |x_k|$ . Me teame ka (vt. ülesanne 8.1), et bilineaarne funktsionaal

$$\langle x, u \rangle := \sum_{k=1}^{\infty} u_k x_k \quad (x \in \omega, u \in \varphi)$$

korraldab vektorruumide  $\omega$  ning  $\varphi$  vahel duaalsuse. Kuna rida  $\sum_{k=1}^{\infty} u_k x_k$  sisaldab antud juhul lõpliku arvu nullist erinevaid liikmeid, siis

$$\begin{aligned} x^{(\alpha)} \rightarrow x \quad (\tau_\omega) &\Leftrightarrow x_k^{(\alpha)} \rightarrow x_k \quad (k \in \mathbb{N}) \Leftrightarrow \forall u \in \varphi : \sum_k u_{k=1}^{\infty} x_k^{(\alpha)} \rightarrow \sum_k u_{k=1}^{\infty} u_k x_k \\ &\Leftrightarrow x^{(\alpha)} \rightarrow x \quad (\sigma(\omega, \varphi)), \end{aligned}$$

s.t. elementide pere  $(x^{(\alpha)})$  koondub topoloogias  $\tau_\omega$  parajasti siis, kui ta on  $\sigma(\omega, \varphi)$ -koonduv. Niisiis,  $\tau_\omega = \sigma(\omega, \varphi)$ . Pidades silmas lauset 8.1, mille kohaselt nõrgas topoloogias on kõik tõkestatud alamhulgad täielikult tõkestatud, saame tähelepanuväärse fakti:  $(\omega, \tau_\omega)$  on Monteli ruum.

Jadaruumideks nimetatakse vektorruumi  $\omega$  vektoralamruume. Jadaruumi  $E$  nimetatakse soliidseks ehk normaalseks, kui  $ux := (u_k x_k) \in E$  suvaliste  $x \in E$  ja  $u \in \ell^\infty$  korral (meenutame, et  $\ell^\infty$  on kõigi tõkestatud arvjadade Banachi ruum). Jadaruumide duaalsete paaride defineerimiseks vaatleme antud jadaruumi  $E \subset \omega$  puhul tema  $\alpha$ -kaasruumi

$$E^\alpha := \left\{ u \in \omega \mid \forall x \in E : \sum_{k=1}^{\infty} |u_k x_k| < \infty \right\}.$$

Selge, et  $\varphi \subset E^\alpha$  ja  $\langle E, \varphi \rangle$  ning  $\langle E, E^\alpha \rangle$  on duaalsed paarid bilineaarse funktsionaaliga  $\langle x, u \rangle := \sum_{k=1}^{\infty} u_k x_k$ . Jadaruumi  $E$  omadusega  $E = E^{\alpha\alpha} := (E^\alpha)^\alpha$  nimetatakse *perfektseks*. Lihtne on kontrollida, et perfektne jadaruum on soliidne.

Duaalse paariga  $\langle E, E^\alpha \rangle$  on seotud nn. soliidne topoloogia. Tähistame iga  $u \in E^\alpha$  korral

$$p_{|u|}(x) := \sum_{k=1}^{\infty} |u_k x_k| \quad (x \in E),$$

siis  $p_{|u|}: E \rightarrow \mathbb{R}$  on poolnorm ja süsteem  $\{p_{|u|}\}_{u \in E^\alpha}$  eraldab punktid jadaruumis  $E$ . Selle süsteemiga määratud lokaalselt kumerat topoloogiat  $\nu(E, E^\alpha)$  nimetataksegi *soliidseks topoloogiaks* jadaruumis  $E$ . Kuna  $p_u(x) := \left| \sum_{k=1}^{\infty} u_k x_k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |u_k x_k| = p_{|u|}(x)$  suvaliste  $u \in E^\alpha$  ning  $x \in E$  puhul, siis  $\sigma(E, E^\alpha) \subset \nu(E, E^\alpha)$  (peame silmas, et süsteem  $\{p_u\}_{u \in E^\alpha}$  määrab nõrga topoloogia  $\sigma(E, E^\alpha)$ ). Näitame, et soliidne topoloogia  $\nu(E, E^\alpha)$  on duaalsusega  $\langle E, E^\alpha \rangle$  kooskõlas, s.t. (vrd. teoreem 9.7)  $\sigma(E, E^\alpha) \subset \nu(E, E^\alpha) \subset \tau(E, E^\alpha)$ .

Tähistame  $\Phi := \{\mathcal{F} \subset \mathbb{N} \mid \mathcal{F} \text{ on lõplik}\}$  ja moodustame antud  $x \in E$  korral summad

$$\sum_{k \in \mathcal{F}} x_k e^k \quad (\mathcal{F} \in \Phi).$$

Need moodustavad suunatud pere  $\left( \sum_{k \in \mathcal{F}} x_k e^k \right)_{\mathcal{F} \in \Phi}$ , kus hulk  $\Phi$  on suunatud sisalduvuse järgi. Kuna

$$\lim_{\mathcal{F} \in \Phi} p_{|u|} \left( x - \sum_{k \in \mathcal{F}} x_k e^k \right) = \lim_{\mathcal{F} \in \Phi} \sum_{k \in \mathbb{N} \setminus \mathcal{F}} |u_k x_k| = 0,$$

siis  $\lim_{\mathcal{F} \in \Phi} \sum_{k \in \mathcal{F}} x_k e^k = x$  topoloogias  $\nu(E, E^\alpha)$ . Iga  $f \in (E, \nu(E, E^\alpha))'$  korral

$$f(x) = \lim_{\mathcal{F} \in \Phi} \sum_{k \in \mathcal{F}} u_k x_k = \sum_{k=1}^{\infty} u_k x_k \quad (x \in E, u \in E^\beta),$$

s.t.  $(E, \nu(E, E^\alpha))' \subset E^\alpha$ . Vastupidine sisalduvus tuleneb sellest, et  $\sigma(E, E^\alpha) \subset \nu(E, E^\alpha)$  ja  $(E, \sigma(E, E^\alpha))' = E^\alpha$ , kokkuvõttes  $(E, \nu(E, E^\alpha))' = E^\alpha$ .

Olgu  $u = (u_k) \in E^\alpha$  selline jada, et  $u_k \neq 0$  iga  $k \in \mathbb{N}$  korral. Paneme tähele, et

$$\{u\}^\alpha = \left\{ x \in \omega \mid \sum_k |u_k x_k| < \infty \right\} = \left\{ \left( \frac{1}{u_k} z_k \right) \mid z \in \ell \right\} =: \frac{1}{u} \ell.$$

Defineerides kujutuse

$$I: \{u\}^\alpha \rightarrow \ell, \quad x \mapsto (u_k x_k),$$

saaame bijektsiooni vektorruumide  $\{u\}^\alpha$  ja  $\ell$  vahel. Kui varustada  $\{u\}^\alpha$  normiga  $p$ , kus

$$p(x) := \|(u_k x_k)\|_1 = \sum_k |u_k x_k| \quad (x \in \{u\}^\alpha),$$

siis  $I$  on isomeetriline isomorfism.

Kui loobuda nõudest, et  $u_k \neq 0$  kõikide  $k \in \mathbb{N}$  korral, siis  $\{u\}^\alpha$  ei pruugi olla Banachi ruum, kuid ta on F-ruum, mille topoloogia määrratakse poolnormide süsteemiga  $\{p, r_j \mid j \in \mathbb{N}\}$ .

Olgu  $A = (a^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} = (a_k^{(n)})_{n, k \in \mathbb{N}}$  jadade jada (ehk lõpmatu maatriks), mis rahuldab tingimusi

- 1)  $a_k^{(n+1)} \geq a_k^{(n)} \geq 0 \quad (n, k \in \mathbb{N}),$
- 2)  $\sup \left\{ a_k^{(n)} \mid n \in \mathbb{N} \right\} > 0 \quad (k \in \mathbb{N}).$

Tähistame

$$\lambda(A) := \left\{ x \in \omega \mid \forall n \in \mathbb{N} : \sum_k |a_k^{(n)} x_k| < \infty \right\} = \bigcap \left\{ \{a^{(n)}\}^\alpha \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$

ja varustame selle jadaruumi poolnormide süsteemiga  $\{p^{(n)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ , kus

$$p^{(n)}(x) := \sum_k a_k^{(n)} |x_k| < \infty \quad (x \in \lambda(A)).$$

Saadud jadaruum  $\lambda(A)$  on loenduva arvu F-ruumide  $\{a^{(n)}\}^\alpha$  ühisosaks, seejuures on ruumi  $\{a^{(n)}\}^\alpha$  F-topoloogia määratud poolnormide süsteemiga  $\{p^{(n)}, r_j \mid j \in \mathbb{N}\}$ . Tänu eeldusele 2) on poolnormide süsteemid  $\{p^{(n)}\}_{n \in \mathbb{N}}$  ja  $\{p^{(n)}, r_j \mid j, n \in \mathbb{N}\}$  jadaruumis  $\lambda(A)$  samaväärsed, seega määrratakse F-topoloogia poolnormide süsteemiga  $\{p^{(n)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ . Nii defineeritud F-ruumi nimetatakse *Köthe jadaruumiks*.

Lihtne on veenduda, et  $\lambda(A)$  on perfektne, s.t.  $\lambda(A) = \lambda(A)^{\alpha\alpha}$ . Saadud F-topoloogia on soliidne topoloogia. Veelgi enam, saab näidata, et iga perfektne jadaruum, mille soliidne topoloogia, on F-topoloogia on esitatav Köthe jadaruumina.