

## Seminar 6: Ruumigeomeetria. Sirged ja tasandid

MTMM.00.142 Geomeetria süvendusseminar

20.03.2019

## Sirged ruumis

Kaks sirget ruumis võivad olla

- 1) lõikuvad,
- 2) ühtivad,
- 3) paralleelsed,
- 4) kiivsad.

**Kahe lõikuva sirge vaheliseks nurgaks** nimetatakse nurka (tavaliselt vähimat), mille moodustavad kaks lõikepunktist väljuvat kiirt.

**Kahe kiivsirge vaheliseks nurgaks** nimetatakse nurka ühe antud sirge ja niisuguse temaga lõikuva sirge vahel, mis on paralleelne teisega antud sirgetest.

## Sirge ja tasand ruumis

Sirgel ja tasandil võib olla kolm erinevat vastastikust asendit:

- 1) sirge ja tasand lõikuvad (lõikepunkt nimetatakse **sirge aluspunktiks** tasandil),
- 2) sirge asub tasandil,
- 3) sirge ja tasand on paralleelsed.

Sirge on **risti tasandiga**, kui ta on risti kõigi selle tasandi sirgetega. Tasandi ristsirget nimetatakse ka tasandi **normaaliks**. Tasandi **kaldsirgeks** nimetatakse tasandit lõikavat, kuid tasandiga mitte ristuvat sirget. Kui väljaspool tasandit asuvast punktist on tasandini tõmmatud ristlõik ja kaldlõik, siis **kaldlõigu ristprojektsiooniks tasandil** nimetatakse lõiku, mis ühendab ristlõigu ja kaldlõigu aluspunkte.

## Sirge ja tasand ruumis

**Kolme ristsirge teoreem:** Tasandil asuv sirge, mis läbib kaldsirge aluspunkti ja on risti kaldsirge projektsiooniga, on risti ka kaldsirge endaga.

**Sirge ja tasandi vaheliseks nurgaks** nimetatakse teravnurka selle sirge ja tema projektsiooni vahel. See nurk on vähim, mis sirge moodustab tasandil sirge aluspunkti läbivate kõikvõimalike sirgetega.

## Tasand riuumis

Tasandi asendit ruumis saab üheselt määrata viiel erineval viisil:

- 1) kolm mitte ühel sirgel asuvat punkti;
- 2) üks sirge ja väljaspool seda sirget asuv punkt;
- 3) kaks lõikuvat sirget;
- 4) kaks paralleelset sirget;
- 5) tasandi normaal ja mingi punkt tasandil.

## Tasandid ruumis. Kahetahuline nurk

Kaks tasandit ruumis võivad olla

- 1) lõikuvad (tasandite ühised punktid moodustavad sirge – **tasandite lõikesirge**),
- 2) paralleelsed,
- 3) ühtivad.

**Kahetahuliseks nurgaks** nimetatakse ruumi osa, mille moodustavad kaks ühest sirgest väljuvat erinevat pooltasandit. Sirget nimetatakse kahetahulise nurga **servaks**, pooltasandeid kahetahulise nurga **tahkudeks**.

## Mitmetahuline nurk

**Mitmetahuliseks nurgaks** nimetatakse ruumi osa, mis jääb üksteisega lõikuvate ja ühist punkti omavate tasandite vahele. Seda ühist punkti nimetatakse mitmetahulise nurga **tipuks**. Sirgeid, mida mööda tasandid lõikuvad, nimetatakse mitmetahulise nurga **servadeks**. Naaberservade vahelisi tasandite osi nimetatakse mitmetahulise nurga **tahkudeks**. Nurka, mille moodustavad kaks naaberserva, nimetatakse mitmetahulise nurga **tasanurgaks**.

Mitmetahulist nurka nimetatakse **kumeraks**, kui selle lõikamisel tasandiga, mis lõikab nurga kõiki tahke, tekib kumer hulknurk.

Mitmetahulist nurka tähistatakse tähtedega, milles esikohal on tipu tähis, seejärel järjestikustel servadel olevate punktide tähisid.


## Mitmetahuline nurk

Mitmetahuliste nurkade korral kehtivad järgmised laused.

- ▶ Kolmetahulise nurga iga tasanurk on väiksem kahe ülejäänud tasanurga summast.
- ▶ Mitmetahulise nurga tasanurkade summa on väiksem kui  $2\pi$ .



## Pythagorase teoreemi ruumiline üldistus

Olgu risttahuka servad  $x, y, z$ , siis risttahuka diaonaal  $s$  avaldub kui  $s^2 = x^2 + y^2 + z^2$  ehk  $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ .



## Pythagorase teoreemi ruumiline üldistus

Olgu tetraeedri  $OXYZ$  tipu  $O$  juures asuvad tasanurgad kõik täisnurgad, siis külgtahkude pindalade ruutude summa on võrdne põhitahu pindala ruuduga, st  $S_{OXY}^2 + S_{OYZ}^2 + S_{OXZ}^2 = S_{XYZ}^2$ .



Tõestus?

## Ülesannete temaatiline jaotus (konspekt lk 12-13)

Kiivsirgete vaheline nurk: 1

Kaldlõigu projektsioon: 2–5

Kolmetahuline nurk tasanurkade kaudu, tetraeeder: 6–9

Kahetahuline nurk: 10–15

Mitmetahulise nurga võimalikkus: 16–18

Kolmetahuline nurk: 19–23

Varia: 24–25

Nurkade märkimine: 26–28

## Kodutöö kuuendast seminarist puudujatele

Tutvuge mõistetega kahetahuline nurk ja mitmetahuline nurk. Missuguseid nurki nende juures saab mõõta? Kuidas on need nurgad määratud?

- ▶ Kas on võimalik selline kolmetahuline nurk, mille tasanurgad on  $27^\circ$ ,  $79^\circ$  ja  $52^\circ$ ? Põhjendada.
- ▶ Kas on võimalik selline kumer neljatahuline nurk, mille tasanurgad on a)  $30^\circ$ ,  $40^\circ$ ,  $50^\circ$  ja  $130^\circ$ ; b)  $80^\circ$ ,  $40^\circ$ ,  $120^\circ$  ja  $130^\circ$ ? Põhjendada.
- ▶ Mitu tahku saab olla kumeral mitmetahulisel nurgal, kui tema iga tasanurk on  $50^\circ$ ?

Järgneb...

## Kodutöö kuuendast seminarist puudujatele

8. Täisnurkse kolmnurga  $ABC$  kaatetid on 15 m ja 20 m. Täisnurga tipust  $C$  väljub kolmnurga tasandi ristlõik  $CD = 35$  m. Arvutada punkti  $D$  kaugus hüpotenuusist.
10. Kahetahulise nurga ühel tahul asub punkt  $P$ , mille kaugus teisest tahust on 16 cm. Arvutada punkti  $P$  kaugus kahetahulise nurga servast, kui kahetahulise nurga suurus on  $30^\circ$ .
22. Kolmetahulise nurga kaks tasanurka on kumbki  $45^\circ$ , kolmas tasanurk  $60^\circ$ . Arvutada kolmanda tasanurga vastas olev kahetahuline nurk.